



Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  
Servicio de Conservación de Recursos Naturales



# Claves para la Taxonomía de Suelos

Décima Edición, 2006





---

# Claves para la Taxonomía de Suelos

## Soil Survey Staff

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos  
Servicio de Conservación de Recursos Naturales

Décima Edición, 2006

*Traducción de:*

**Carlos A. Ortiz – Solorio y Ma. del Carmen Gutiérrez – Castorena**

*Con la colaboración de:*

**Edgar V. Gutiérrez – Castorena**

*Miembros del:*

**Área de Génesis, Morfología y Clasificación de Suelos**

**Programa de Edafología**

**Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas**

Campus Montecillo, México

Montecillo, Texcoco, Estado de México, 56230

*Traducción coordinada por:*

**Luis A. Hernández, Científico de Suelos, USDA-NRCS, USA**

2007

---

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) prohíbe la discriminación en todos sus programas y actividades en relación a la raza, color, origen, género, religión, edad, invalidez, creencias políticas, orientación sexual, y estado matrimonial o familiar (No todas las bases de prohibición se aplican a todos los programas). Personas con capacidades diferentes que requieran medios alternativos de comunicación por parte del Programa de Información (Braille, Impresión Grande, Cassette, etc.) deben contactarse al USDA al 202-720-2600 (voz y TDD).

Para registrar quejas de discriminación, comuníquese con el Director del USDA, Oficina de Derechos Civiles, Departamento 326W, Edificio Whitten, en Avenidas 14 e Independencia, SW, Washington, DC 20250-9410 o llame al 202-720-5964 (voz y TDD). El USDA provee igualdad de oportunidades y de empleo.

**Cubierta: Perfil de un Udipsamment somero con un límite abrupto y ondulado entre el horizonte C y el lecho rocoso. La profundidad al contacto paralítico es de 14 a 20 pulgadas. Foto de John Kelley, Científico de Suelos, Raleigh, Carolina del Norte.**

## *Contenido*

---

Prólogo.....	v
Capítulo 1: Los Suelos que Clasificamos .....	1
Capítulo 2: Diferenciación de Suelos Minerales y Suelos Orgánicos .....	3
Capítulo 3: Horizontes y Características de Diagnóstico para las Categorías Superiores .....	5
Capítulo 4: Identificación de la Clase Taxonómica de un Suelo .....	31
Capítulo 5: Alfisols .....	35
Capítulo 6: Andisols .....	77
Capítulo 7: Aridisols .....	97
Capítulo 8: Entisols .....	123
Capítulo 9: Gelisols .....	143
Capítulo 10: Histosols .....	153
Capítulo 11: Inceptisols .....	159
Capítulo 12: Mollisols .....	191
Capítulo 13: Oxisols .....	235
Capítulo 14: Spodosols .....	251
Capítulo 15: Ultisols .....	261
Capítulo 16: Vertisols .....	283
Capítulo 17: Familias y Series, Diferenciación y Nombres .....	295
Capítulo 18: Designaciones de Horizontes y Capas .....	311
Apéndice.....	317
Índice.....	325



## Prólogo

---

La publicación de esta edición sobre las *Claves para la Taxonomía de Suelos* (10ª edición), coincide con la celebración del 18º Congreso Mundial de la Ciencia del Suelo, a efectuarse en Filadelfia, Pennsylvania, en julio del 2006. La última ocasión en la que un Congreso Mundial se celebró en los Estados Unidos fue en 1960 en Madison, Wisconsin. En ese tiempo, se dio a conocer la *Clasificación de Suelos: Un Sistema Comprensivo, 7ª. Aproximación*, para su revisión y prueba. Tal sistema de clasificación en 1965, fue adoptado oficialmente para su uso en el Programa de Levantamientos de Suelos de los Estados Unidos. La primera edición de la *Taxonomía de Suelos: Un Sistema Básico para hacer e interpretar Levantamientos de Suelos*, fue publicada en 1975. Por años, la *Taxonomía de Suelos* se ha modificado y expandido, para reflejar el conocimiento creciente sobre el mundo de los suelos. Después de las primeras ocho ediciones de las *Claves para la Taxonomía de Suelos*, se publicó la segunda edición de la *Taxonomía de Suelos* en 1998. Posteriormente, en el 2003 fue publicada la 9ª edición de las claves y ahora en 2006 la 10ª edición.

La publicación de las *Claves para la Taxonomía de Suelos* sirve para dos propósitos. Proporcionar las claves taxonómicas necesarias para la clasificación de suelos en una forma tal que se pueda usar fácilmente en el campo. Dar a conocer a los usuarios del sistema taxonómico los cambios más recientes del sistema. Esta edición de las *Claves para la Taxonomía de Suelos* incorpora todos los cambios aprobados desde la novena edición del 2003. Se planea continuar generando ediciones actualizadas de las *Claves para la Taxonomía de Suelos* en la medida que los cambios que ocurran garanticen nuevas ediciones.

Los autores de las *Claves para la Taxonomía de Suelos* son identificados como el “Soil Survey Staff”. Este término trata de incluir a todos los clasificadores de suelos del Programa Nacional Cooperativo de Levantamientos de Suelos y de la Comunidad Internacional que han hecho contribuciones significativas para el mejoramiento del sistema taxonómico.

Micheal L. Golden  
Director, División de Levantamientos de Suelos,  
Servicio de Conservación de Recursos Naturales



# CAPÍTULO 1

## *Los Suelos que Clasificamos*

La palabra “suelo”, como muchas otras, tiene varios significados. En su significado tradicional, el suelo es el medio natural para el desarrollo de plantas terrestres, ya sea que tenga o no horizontes discernibles. Esta acepción es todavía la forma más común como se comprende la palabra, y es el interés principal en el que el suelo centra su significado. Las personas consideran al suelo importante porque sostiene a las plantas que nos proporcionan comida, fibras, drogas, y otras necesidades humanas, y porque filtra el agua y recicla desechos. El suelo cubre a la superficie terrestre de modo continuo, excepto en las áreas con afloramientos rocosos, de congelamiento perpetuo o de aguas profundas, o sobre los hielos de los glaciares. En ese sentido, el suelo tiene un espesor que está determinado por la profundidad de enraizamiento de las plantas.

Suelo, en este texto, es un cuerpo natural que comprende a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la superficie de la tierra, que ocupa un espacio, y que se caracteriza por uno o ambos de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como resultado de las adiciones, pérdidas, transferencias y transformaciones de energía y materia o por la habilidad de soportar plantas enraizadas en un ambiente natural. Esta definición es una ampliación de la versión de *Taxonomía de Suelos* publicada en el año 1975, para incluir a los suelos de las áreas de la Antártica donde la pedogénesis ocurre pero el clima es demasiado agresivo para permitir el desarrollo de plantas superiores.

El límite superior del suelo es el límite entre el suelo y el aire, aguas poco profundas, plantas vivas o materiales de plantas que no han empezado a descomponerse. Se considera que las áreas no tienen suelo si la superficie está cubierta en forma permanente por agua muy profunda (típicamente a más de 2.5 m) para no permitir el desarrollo de plantas enraizadas. Los límites horizontales del suelo son cuando el suelo cambia a aguas profundas, áreas estériles, rocas o hielo. En algunos lugares la separación entre suelo y no suelo es tan gradual que no se pueden hacer claras distinciones.

El límite inferior que separa al suelo del no suelo subyacente es el más difícil de definir. El suelo consiste de horizontes cercanos a la superficie terrestre, que, en contraste con el material parental subyacente, han sido alterados por las interacciones del clima, relieve, y organismos vivos a través del tiempo. Comúnmente, el suelo en su límite inferior cambia a roca dura o materiales terrestres virtualmente desprovistos de animales, raíces, u otras marcas de actividad biológica. Sin embargo, la profundidad inferior de la actividad biológica es difícil de establecer y con frecuencia es gradual. Para

propósitos de clasificación, el límite inferior del suelo se fija arbitrariamente a 200 cm. En suelos donde la actividad biológica o los procesos pedogenéticos actuales se extiendan a profundidades mayores de 200 cm, el límite inferior del suelo con propósitos de clasificación se mantiene a 200 cm. En algunos casos, los lechos rocosos más débilmente cementados (materiales paralíticos, definidos posteriormente) han sido descritos y usados para diferenciar a series de suelos (en la sección de control de series, definida posteriormente), a pesar de que en un sentido estricto, los materiales por debajo de un contacto paralítico no sean considerados como verdaderos suelos. En áreas donde el suelo tiene horizontes delgados cementados que impiden el crecimiento de las raíces, la profundidad del suelo es hasta donde se localice el horizonte cementado más profundo, pero no hasta los 200 cm. Para ciertos propósitos de manejo, las capas más profundas que el límite inferior del suelo que es clasificado (200 cm), también podrían ser descritas si afectan el contenido y el movimiento del agua, del aire o a otras interpretaciones realizadas.

En los trópicos húmedos, los materiales terrestres se pueden extender a varios metros de profundidad con cambios no obvios por debajo de los primeros 1 ó 2 m superiores, excepto por líneas ocasionales de piedras. En muchos suelos saturados, los materiales de suelo gleyzado pueden localizarse a pocos centímetros de la superficie y en algunas áreas pueden extenderse hasta varios metros sin cambios aparentes con el incremento de la profundidad. La última condición puede surgir a través del relleno gradual de una cuenca saturada donde se permita que el horizonte A se añada gradualmente agregado y convierta el en material de abajo gleyzado en la parte baja. Finalmente, el horizonte A descansará sobre una masa espesa de material gleyzado que puede ser relativamente uniforme. En las dos condiciones mencionadas, no hay alternativas pero el límite inferior del suelo se establece arbitrariamente a los 200 cm.

El suelo, como se ha definido en este texto, no necesita presentar horizontes bien diferenciados, aún cuando la presencia o ausencia de horizontes y su naturaleza son de extrema importancia para la clasificación del suelo. Las plantas pueden desarrollarse dentro de frascos llenos con materiales terrestres, tales como turba, o arena o incluso dentro de agua. Bajo condiciones apropiadas, todos estos medios son adecuados para producir plantas, pero son considerados como no suelos en el sentido que ellos no pueden ser clasificados dentro del mismo sistema que se emplea para los suelos de un área, condado o nación. Las plantas pueden desarrollarse sobre árboles, pero los árboles no se consideran suelos.

Los suelos tienen muchas propiedades que fluctúan con las estaciones del año. Pueden presentar condiciones frías y calientes o secas y húmedas en forma alternada. La actividad biológica puede ser disminuida o parada si el suelo se vuelve muy frío o muy seco. El suelo recibe flujos de materia orgánica cuando las hojas caen o las hierbas mueren. El suelo no es estático. El pH, las sales solubles, el contenido de materia orgánica y la relación carbono-nitrógeno, número de microorganismos, la fauna, temperatura y la humedad del suelo, todos cambian durante las estaciones del año como en períodos más extensos. El suelo deberá entenderse desde dos perspectivas, a corto y a largo plazo.

### **Suelos Enterrados**

Un suelo enterrado está cubierto por un manto superficial de material de suelo nuevo de un espesor de 50 cm o más o que tiene un espesor de 30 a 50 cm y es igual o al menos la mitad del espesor total de los horizontes de diagnóstico

preservados en el suelo enterrado. Un manto superficial de material nuevo enterrados, puede usarse para el establecimiento de fases de suelos cubiertos o incluso para otras series de suelo, si el manto afecta el uso del suelo.

Cualquier horizonte o capa que subyace a un epipedón plaggen se considera que está enterrado.

Un manto superficial de nuevos materiales, como aquí se define, está inalterado en gran medida al menos en su parte inferior. Puede tener un horizonte de diagnóstico superficial (epipedón) y/o un horizonte cámbico pero no tiene otros horizontes de diagnóstico subsuperficiales, como se definen posteriormente. Sin embargo, cuando permanece una capa de 7.5 cm o más de espesor que no cumple con los requisitos para todos los horizontes de diagnóstico, como se definen posteriormente, que sobreyace a una secuencia de horizontes que puede ser identificada claramente como el solum de un suelo enterrado en al menos la mitad de cada pedon. El reconocimiento de un manto superficial no deberá basarse sólo en estudios de suelos asociados.

## CAPÍTULO 2

### *Diferenciación entre Suelos Minerales<sup>1</sup> y Suelos Orgánicos*

En la Taxonomía de Suelos se hace una diferenciación entre los suelos minerales y los suelos orgánicos. Para ello, primero, se requiere distinguir lo que es un material mineral de suelo de lo que es un material orgánico de suelo. En segundo lugar, se necesita definir la condición mínima mineral para que un suelo se clasifique como suelo mineral y la condición mínima orgánica para que un suelo se clasifique como suelo orgánico.

Casi todos los suelos contienen cantidades mayores a trazas de los componentes minerales y orgánicos en algún horizonte, pero la mayoría de los suelos están dominados por uno u otro. Los horizontes con menos de 20 a 35 por ciento de materia orgánica, por peso, tienen propiedades que son más parecidas a las de los suelos minerales que a las de los orgánicos. Incluso con esta separación, el volumen de la materia orgánica excede al volumen del material mineral de la fracción de tierra-fina.

#### **Material Mineral de Suelo**

El material mineral de suelo (menor de 2.0 mm de diámetro), corresponde a cualquiera de los siguientes:

1. Está saturado con agua por menos de 30 días (acumulativos) al año en años normales y contiene menos de 20 por ciento (por peso) de carbono orgánico; *o*
2. Está saturado con agua por 30 días acumulativos o más en años normales (o está artificialmente drenado) y excluyendo a las raíces vivas, presenta un contenido de carbono orgánico (por peso) de:
  - a. Menos de 18 por ciento, si la fracción mineral contiene 60 por ciento o más de arcilla; *o*
  - b. Menos de 12 por ciento, si la fracción mineral no contiene arcilla; *o*
  - c. Menos de 12 + (porcentaje de arcilla por 0.1) por ciento, si la fracción mineral contiene menos de 60 por ciento de arcilla.

#### **Material Orgánico de Suelo**

El material de suelo que contiene cantidades mayores de carbono orgánico a las descritas anteriormente para el material de suelo mineral, se considera como material orgánico de suelo.

Con base a la definición de material mineral de suelo, el material que tiene más carbono orgánico que el punto 1, se

propone para que incluya a lo que se llama hojarasca u horizonte O. Mientras que, al material con más carbono orgánico que el punto 2, se le denomina “peat” o “muck”. No todos los materiales orgánicos de suelo se acumulan en o dentro del agua. La hojarasca puede descansar sobre un contacto lítico y soportar vegetación forestal. El suelo en la situación anterior es orgánico sólo cuando la fracción mineral es apreciablemente menor a la mitad del peso y un pequeño porcentaje del volumen del suelo.

#### **Distinción entre Suelos Minerales y Suelos Orgánicos**

La mayoría de los suelos están dominados por material mineral, pero muchos suelos minerales presentan horizontes con materiales orgánicos. Para simplificar las definiciones escritas para los taxa, es útil hacer una distinción entre lo que se entiende por un suelo mineral y por un suelo orgánico. Para aplicar las definiciones de muchos taxa, uno debe decidir primero si el suelo es mineral u orgánico. Los Andisols (definidos posteriormente) son una excepción. Se consideran en general que forman parte de los suelos minerales, aún cuando algunos pueden ser orgánicos si reúnen otros criterios para los Andisols. Aquellos que rebasan los límites de carbono orgánico definidos para suelos minerales tienen una fracción coloidal dominada por minerales de rango corto o por complejos de aluminio – humus. La fracción mineral de estos suelos se cree que tienen más control sobre las propiedades de los suelos que sobre la fracción orgánica. Por ello, estos suelos se incluyen en los Andisols más que en los suelos orgánicos definidos posteriormente como Histosols.

Si un suelo tiene tanto horizontes orgánicos como minerales, se deberá considerar el espesor relativo de los materiales minerales y orgánicos del suelo. En algún punto uno deberá decidir cuáles horizontes minerales son más importantes. Ese punto es arbitrario y depende en parte de la naturaleza de los materiales. Una capa espesa de “sphagnum” tiene una densidad aparente muy baja y contiene menos materia orgánica que una capa muy delgada de “muck” bien descompuesta. Es mucho más sencillo determinar el espesor de las capas en campo que la obtención de las toneladas de materia orgánica por hectárea. Por lo tanto, la definición de un suelo mineral esta basada en el espesor de los horizontes o capas, pero los límites de los espesores pueden variar con la clase de material. La definición que se da más adelante intenta clasificar como suelos minerales a aquellos que tienen tanto capas espesas de suelos minerales como a los que no

<sup>1</sup> Los suelos minerales incluyen a todos los suelos excepto a los del Suborden Histels y a los del Orden Histosols.

tienen cantidades mayores de materia orgánica permitidas para un epipedon hístico, definido en el capítulo 3.

En la determinación si un suelo es orgánico o mineral, el espesor de los horizontes se mide desde la superficie del suelo, esto es, desde la superficie del horizonte mineral u orgánico, a menos que el suelo este enterrado como se definió en el capítulo 1. Así, cualquier horizonte O en la superficie es considerado como horizonte orgánico si reúne los requisitos de material orgánico de suelo definidos posteriormente y su espesor es adicionado al de cualquier otro horizonte orgánico para determinar el espesor total de los materiales orgánicos de suelo.

## Definición de Suelos Minerales

Los suelos minerales son los que tienen *cualquiera* de las siguientes:

1. Materiales minerales de suelo que satisfacen *una o más* de las siguientes:
  - a. Sobreyace a materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos y/o tienen poros<sup>2</sup> que están rellenos en 10 por ciento o menos con materiales orgánicos y directamente abajo de estos materiales tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico; *o*
  - b. Cuando se adicionan con los materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos subyacentes, tienen un espesor total de más de 10 cm entre la superficie del suelo y la profundidad de 50 cm; *o*
  - c. Constituyen más de una tercera parte del espesor total del suelo a un contacto dénsico, lítico o paralítico o tienen un espesor total de más de 10 cm; *o*
  - d. Si están saturados con agua por 30 días o más por año en años normales (o están artificialmente drenados) y tienen materiales orgánicos con un límite superior dentro de los 40 cm de la superficie del suelo, tienen un espesor total de *ya sea*:
    - (1) Menos de 60 cm si tres-cuartas partes de su volumen o más está constituido por fibras de musgos y su densidad aparente, en húmedo, es menor de 0.1 g/cm<sup>3</sup>; *o*
    - (2) Menos de 40 cm si consisten de materiales sápricos o hémicos o materiales fibricos con menos de las tres-cuartas partes (por volumen) de fibras de musgos y una densidad aparente, en húmedo, de 0.1 g/cm<sup>3</sup> o más; *o*
2. Más de 20 por ciento, por volumen, de materiales de suelo mineral desde la superficie del suelo hasta una

<sup>2</sup> Los materiales que satisfacen la definición de cenizas, fragmentales o pomáceos, pero tienen más de 10 por ciento, por volumen, de poros rellenos con material de suelo orgánico se consideran como materiales de suelo orgánico.

profundidad de 50 cm o a una capa glácica o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero; y

- a. Permafrost dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
- b. Materiales gélicos dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y permafrost dentro de los 200 cm de la superficie del suelo.

## Definición de Suelos Orgánicos

Los suelos orgánicos tienen materiales de suelos orgánicos que:

1. No tienen propiedades ándicas de suelo en el 60 por ciento o más del espesor comprendido entre el suelo superficial y ya sea una profundidad de 60 cm o un contacto dénsico, lítico o paralítico o un duripán si está mas somero; y
2. Cumplen *una o más* de las siguientes:
  - a. Sobreyace a materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos y/o rellenan sus intersticios<sup>2</sup> y directamente abajo tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico; *o*
  - b. Cuando se adicionan con los materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos, tienen un espesor total de 40 cm o más entre la superficie del suelo y la profundidad de 50 cm; *o*
  - c. Constituyen dos terceras partes o más del espesor total del suelo a un contacto dénsico, lítico o paralítico y no tienen horizontes minerales o tienen horizontes minerales con un espesor total de 10 cm o menos; *o*
  - d. Están saturados con agua por 30 días o más por año en años normales (o están artificialmente drenados) y tienen un límite superior dentro de los 40 cm de la superficie del suelo, con un espesor total de:
    - (1) 60 cm o más si tres-cuartas partes de su volumen o más está constituido por fibras de musgos y su densidad aparente, en húmedo, es menor de 0.1 g/cm<sup>3</sup>; *o*
    - (2) 40 cm o más si consisten de materiales sápricos o hémicos o materiales fibricos con menos de tres-cuartas partes (por volumen) de fibras de musgos y una densidad aparente, en húmedo, de 0.1 g/cm<sup>3</sup> o más; *o*
  - e. Están 80 por ciento o más, por volumen, desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 cm o a una capa glácica o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

Es una regla general que un suelo se clasifique como suelo orgánico (Histosol) si más de la mitad de los 80 cm superiores (32 in) del suelo es orgánico o si el material de suelo orgánico descansa sobre una roca o material fragmental que tiene intersticios rellenos con materiales orgánicos.

## CAPÍTULO 3

### *Horizontes y Características de Diagnóstico para las Categorías Superiores*

En este capítulo se definen los horizontes y las características de los suelos minerales y de los suelos orgánicos. Está dividido en tres partes: horizontes y características de diagnóstico para suelos minerales, características de diagnóstico para suelos orgánicos y horizontes y características de diagnóstico para ambos tipos de suelos.

Los horizontes y características definidas más adelante no están en formato de clave. Algunos horizontes de diagnóstico son exclusivos y otros no. Por ejemplo, un epipedón úmbrico, nunca podrá ser un epipedón mólico, pero un horizonte kándico con revestimientos arcillosos, podrá satisfacer la definición de un horizonte argílico.

#### **Horizontes y Características de Diagnóstico para Suelos Minerales**

Los criterios para algunos de los siguientes horizontes y características, tales como los epipedones hístico y folístico, pueden cumplir con los requisitos de los suelos orgánicos. Sin embargo, son de diagnóstico sólo para suelos minerales.

#### **Horizontes Superficiales de Diagnóstico: El Epipedón**

El epipedón (*Gr. epi, sobre y pedón, suelo*) es un horizonte que se forma en o cerca de la superficie del suelo y en el cual, la mayor parte de la estructura de la roca ha sido destruida. Está oscurecido por la materia orgánica o muestra evidencias de eluviación o ambas. El término estructura de roca, como se usa aquí y en otros lugares de la taxonomía, incluye a la estratificación fina (menor de 5 mm) de sedimentos no consolidados (eólicos, aluviales, lacustres o marinos) y a la saprolita que se deriva de roca consolidada, en donde los minerales no intemperizados conservan su posición relativa.

Cualquier horizonte puede estar en la superficie de un suelo truncado. Sin embargo, la siguiente sección, está relacionada con ocho horizontes de diagnóstico que se han formado en o cerca de la superficie del suelo. Estos horizontes pueden estar cubiertos por un manto superficial de material nuevo de suelo. Si el manto superficial presenta estructura de roca, la parte superior del epipedón se considera como la superficie del suelo a menos que el manto cumpla con la definición de suelos enterrados dada en el capítulo 1. Si el suelo incluye a un suelo enterrado, el epipedón, si existe, está en la superficie del suelo y el epipedón del suelo enterrado es considerado como un epipedón enterrado y no se considera en la selección de la taxa, a menos que las claves indiquen en forma específica sobre horizontes enterrados, tal como sucede con los subgrupos Thapto-Hístic. Un suelo con un manto lo bastante grueso para presentar un suelo enterrado

no tiene epipedón si el suelo tiene estructura de roca en la superficie o tiene un horizonte Ap de menos de 25 cm de espesor que está subyaciendo a un material de suelo con estructura de roca. El epipedón melánico (definido posteriormente) es único entre los epipedones; se forma comúnmente en depósitos volcánicos y puede recibir aportes continuos de ceniza. Por lo tanto, está permitido que este horizonte tenga capas dentro y sobre el epipedón que no sean parte del epipedón melánico.

Un depósito aluvial o eólico reciente que conserva sus estratificaciones (de 5 mm o menos de espesor) o un horizonte Ap que se presenta directamente sobre ese material estratificado no se incluye dentro del concepto de epipedón, porque el tiempo no ha sido suficiente para que los procesos de formación de suelos borren esas marcas transitorias de los depósitos y para que las propiedades de diagnóstico y accesorias se desarrollen.

Un epipedón no es lo mismo que un horizonte A; puede incluir parte o todo el horizonte B iluvial, si el oscurecimiento por materia orgánica se extiende desde la superficie del suelo hasta dentro o a través de todo el horizonte B.

#### **Epipedón Antrópico**

##### **Características Requeridas**

El epipedón antrópico consiste de material de suelo mineral que muestra algunas evidencias de alteración por actividad humana. Después de mezclar los 18 cm superiores del suelo mineral o de todo el suelo mineral si su profundidad, a un contacto dénsico, lítico o paralítico o a un horizonte petrocálcico o a un duripán (todos definidos posteriormente) es menor de 18 cm, el epipedón antrópico tiene las siguientes propiedades:

1. Cuando está seco, *una u otra o ambas*:
  - a. Unidades estructurales con un diámetro de 30 cm o menos o estructura secundaria con un diámetro de 30 cm o menos; *o*
  - b. Una clase de resistencia a la ruptura suelta o moderadamente dura; *y*
2. Estructura de roca, incluyendo estratificaciones finas (menores de 5 mm), en menos de la mitad del volumen en todas partes; *y*
3. *Una* de las siguientes:
  - a. *Ambas* de las siguientes:
    - (1) Colores dominantes con un value de 3 o menos, en húmedo, y de 5 o menos en seco; *y*
    - (2) Colores dominantes con un chroma de 3 o menos, en húmedo; *o*

- b. Una fracción de tierra-fina que contiene carbonato de calcio equivalente de 15 a 40 por ciento y colores con un value y un chroma de 3 o menos en húmedo; *o*
- c. Una fracción de tierra-fina que contiene carbonato de calcio equivalente de 40 por ciento o más y un color del value en húmedo, de 5 o menos; *y*
4. Un contenido de carbono-orgánico de:
- a. 2.5 por ciento o más, si el epipedón tiene un color del value, en húmedo, de 4 ó 5; *o*
- b. 0.6 por ciento o más (absoluto) que en el horizonte C (si está presente), si el epipedón antrópico tiene un color del value menor que 1 unidad Munsell más baja o un chroma con 2 unidades más bajas (ambas en húmedo y en seco) que el horizonte C; *o*
- c. 0.6 por ciento o más y el epipedón no satisface los requisitos de 4-a y 4-b anteriores; *y*
5. El espesor mínimo del epipedón es como sigue:
- a. 25 cm si:
- (1) La textura del epipedón es arena francosa fina o más gruesa en todo su espesor; *o*
- (2) No existen horizontes de diagnóstico subyacentes (definidos posteriormente), y el contenido de carbono-orgánico de los materiales subyacentes disminuye irregularmente con el incremento de la profundidad; *o*
- (3) *Ambos* de los siguientes están 75 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral:
- (a) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico (definidos posteriormente); *y*
- (b) El límite superior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más somero: cálcico, petrocálcico, duripán, fragipán o carbonatos secundarios identificables; *o*
- b. 10 cm, si el epipedón es más fino que la arena francosa fina (cuando mezclado) y está directamente encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico o un duripán; *o*
- c. 18 a 25 cm y el espesor es un tercio o más del espesor total entre la superficie del suelo; *y*
- (1) El límite superior del más somero de cualquiera de los siguientes: carbonatos de calcio secundarios identificables, horizonte cálcico, horizonte petrocálcico, duripán o fragipán; *o*
- (2) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico, *o*
- d. 18 cm, si ninguna de las condiciones anteriores es aplicable.

6. *Una o ambas* de las siguientes:
- a. Tienen un contenido de fosfato de 1500 o más miligramos por kilogramo extraído con ácido cítrico; *y*
- (1) El contenido de fósforo disminuye regularmente con el incremento de la profundidad abajo del epipedón; *y*
- (2) El fósforo no está en forma de nódulos; *o*
- b. Todas las partes del epipedón están húmedas por menos de 90 días (acumulativos) en años normales durante el tiempo en el que la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm es de 5 °C ó más alta, si el suelo no está irrigado; *y*
7. El valor de *n* (definido posteriormente) es menor de 0.7.

## Epipedón Folístico

### Características Requeridas

El epipedón folístico se define como una capa (uno o más horizontes) que está saturada por menos de 30 días (acumulativos) en años normales (y no está drenado artificialmente) y *ya sea que*:

- Consiste de material de suelo orgánico que:
  - Tiene un espesor de 20 cm o más y contiene 75 por ciento o más (por volumen) de fibras de *Sphagnum* o presenta una densidad aparente, en húmedo, de menos de 0.1; *o*
  - Tiene un espesor de 15 cm o más; *o*
- Es un horizonte Ap, que después de mezclado a una profundidad de 25 cm, tiene un contenido de carbono-orgánico (por peso) de:
  - 16 por ciento o más si la fracción mineral contiene 60 por ciento o más de arcilla; *o*
  - 8 por ciento o más, si la fracción mineral no contiene arcilla; *o*
  - 8 + (porcentaje de arcilla dividido por 7.5) por ciento o más, si la fracción mineral contiene menos de 60 por ciento de arcilla.

La mayoría de los epipedones folísticos consisten de material orgánico de suelo (definido en el capítulo 2). El punto 2 establece que el epipedón folístico es un horizonte Ap formado por materiales minerales de suelo.

## Epipedón Hístico

### Características Requeridas

El epipedón hístico es una capa (uno o más horizontes) que se caracteriza por saturación (por 30 días o más, acumulativos) y reducción por algún tiempo durante años normales (o está drenado artificialmente) y *ya sea que*:

- Consiste de material de suelo orgánico que:
  - Tiene un espesor de 20 a 60 cm y ya sea que contiene 75 por ciento o más (por volumen) de fibras de

*Sphagnum* o presente una densidad aparente, en húmedo, de menos de 0.1; *o*

b. Tiene un espesor de 20 a 40 cm; *o*

2. Es un horizonte Ap, que después de mezclado a una profundidad de 25 cm, tiene un contenido de carbono-orgánico (por peso) de:

a. 16 por ciento o más, si la fracción mineral contiene 60 por ciento o más de arcilla; *o*

b. 8 por ciento o más, si la fracción mineral no contiene arcilla; *o*

c.  $8 +$  (porcentaje de arcilla dividido por 7.5) por ciento o más, si la fracción mineral contiene menos de 60 por ciento de arcilla.

La mayoría de los epipedones hísticos consisten de material orgánico de suelo (definido en el capítulo 2). El punto 2 establece que el epipedón hístico es un horizonte Ap que consiste de material mineral de suelo. Un epipedón hístico que consiste de material mineral de suelo también puede ser parte de un epipedón úmbrico o de un mólico.

## Epipedón Melánico

### Características Requeridas

El epipedón melánico tiene *ambas* de las siguientes:

1. Un límite superior a, o dentro de los 30 cm, ya sea desde la superficie del suelo mineral o del límite superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo (definidas posteriormente), cualquiera que sea más somera; *y*

2. En capas con un espesor acumulativo de 30 cm o más dentro de un espesor total de 40 cm, *todas* las siguientes:

a. Propiedades ándicas de suelo en todo su espesor; *y*

b. Un color del value, en húmedo, y un chroma (designaciones Munsell) de 2 o menos en todo su espesor y un índice melánico de 1.70 o menos en todo su espesor; *y*

c. 6 por ciento o más de carbono-orgánico como promedio ponderado y 4 por ciento o más en todas las capas.

## Epipedón Mólico

### Características Requeridas

El epipedón mólico consiste de materiales minerales de suelo mezclados en los 18 cm superiores del suelo mineral o de todo su espesor si su profundidad, a un contacto dénsico, lítico o paralítico o a un horizonte petrocálcico o a un duripán (todos definidos posteriormente), es menor de 18 cm. El epipedón mólico tiene las siguientes propiedades:

1. Cuando está seco, *una u otra o ambas*:

a. Unidades estructurales con un diámetro de 30 cm o menos o una estructura secundaria con un diámetro de 30 cm o menos; *o*

b. Una clase de resistencia a la ruptura de suave a moderadamente dura; *y*

2. Estructura de roca, incluyendo estratificaciones finas (menores de 5 mm), en menos de la mitad del volumen en todas partes; *y*

3. *Una* de las siguientes:

a. *Ambas* de las siguientes:

(1) Colores dominantes con un value de 3 o menos, en húmedo, y de 5 o menos, en seco; *y*

(2) Colores dominantes con un chroma de 3 o menos, en húmedo; *o*

b. Una fracción de tierra-fina que tiene carbonato de calcio equivalente de 15 a 40 por ciento y colores con un value y un chroma de 3 o menos, en húmedo; *o*

c. Una fracción de tierra-fina que tiene carbonato de calcio equivalente de 40 por ciento o más y un color del value, en húmedo, de 5 o menos; *y*

4. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 50 por ciento o más en todo su espesor; *y*

5. Un contenido de carbono-orgánico de:

a. 2.5 por ciento o más, si el epipedón tiene un color del value, en húmedo, de 4 ó 5; *o*

b. 0.6 por ciento o más (absoluto) que en el horizonte C (si está presente), si el epipedón mólico tiene un color del value menor que 1 unidad Munsell o un chroma con 2 unidades más bajas (ambas en húmedo y en seco) que el horizonte C; *o*

c. 0.6 por ciento o más y el epipedón no satisface los requisitos de 5-a y 5-b anteriores; *y*

6. El espesor mínimo del epipedón es como sigue:

a. 25 cm si:

(1) La textura del epipedón es arena francosa fina o más gruesa en todo su espesor; *o*

(2) No existen horizontes de diagnóstico subyacentes (definidos posteriormente), y el contenido de carbono-orgánico de los materiales subyacentes decrece irregularmente con el incremento de la profundidad; *o*

(3) *Ambos* de los siguientes están a 75 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral:

(a) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que esté más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico (definidos posteriormente); *y*

- (b) El límite superior de cualquiera de los siguientes que esté más somero: horizonte petrocálcico, duripán, fragipán o carbonatos secundarios identificables; *o*
- b. 10 cm, si el epipedón es más fino que la arena francosa fina (cuando mezclado) y está directamente encima de un contacto denso, lítico o paralítico, un horizonte petrocálcico o un duripán; *o*
- c. 18 a 25 cm y el espesor es un tercio o más del espesor total entre la superficie del suelo; *y*
- (1) El límite superior del más somero de cualquiera de los siguientes: carbonatos de calcio secundarios identificables, horizonte cálcico, horizonte petrocálcico, duripán o fragipán; *o*
- (2) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico, *o*
- d. 18 cm, si ninguna de las condiciones anteriores es aplicable; *y*
7. Fosfatos:
- a. Un contenido menor de 1500 miligramos por kilogramo extraído con ácido cítrico; *o*
- b. El contenido decrece irregularmente con el incremento de la profundidad abajo del epipedón; *o*
- c. Está en forma de nódulos dentro del epipedón; *y*
8. Alguna parte el epipedón está húmeda por 90 días o más (acumulativos) en años normales durante el tiempo cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C ó más alta, si el suelo no está irrigado; *y*
9. El valor de *n* (definido posteriormente) es menor de 0.7.

### Epipedón Ócrico

El epipedón ócrico no cumple con las definiciones de cualquiera de los otros siete epipedones, debido a que es muy delgado o muy seco, tiene colores del value o del chroma muy altos, contiene muy poco carbono-orgánico, tiene valores de *n* o del índice melánico muy altos o es masivo y duro o durísimo cuando seco. Muchos epipedones ócricos tienen un color del value en la escala de Munsell de 4 o más, en húmedo, y de 6 o más, en seco, o un chroma de 4 o más, o están incluidos en un horizonte A o un Ap con los colores bajos tanto para el value como para el chroma pero es muy delgado para poder reconocerlo como un epipedón mólico o úmbrico (y tiene menos de 15 por ciento de carbonato de calcio equivalente en la fracción de tierra - fina). Los epipedones ócricos también incluyen a horizontes de materiales orgánicos que son muy delgados para cumplir con los requisitos de un epipedón folístico o hístico.

El epipedón ócrico incluye horizontes eluviales que están en o cerca de la superficie del suelo y se extiende hacia el primer horizonte iluvial de diagnóstico (definidos

posteriormente como horizonte argílico, kándico, nátrico o espódico). Si el horizonte subyacente es un horizonte B de alteración (definido posteriormente como un horizonte cámbico u óxico) y no existe un horizonte superficial que este oscurecido apreciablemente por el humus, el límite inferior del epipedón ócrico, es el límite inferior de la capa arable o a una profundidad equivalente (18 cm) en un suelo que no haya sido arado. Actualmente, el mismo horizonte en un suelo que no ha sido arado, puede ser parte tanto de un epipedón ócrico como de un horizonte cámbico; el epipedón ócrico y el horizonte de diagnóstico subsuperficial no son del todo mutuamente excluyentes. El epipedón ócrico no presenta una estructura de roca y no incluye sedimentos recientes finamente estratificados ni puede ser un horizonte Ap que esté directamente encima de tales depósitos.

### Epipedón Plaggen

El epipedón plaggen es una capa superficial hecha por el hombre de 50 cm o más de espesor que se ha originado por estercolamientos prolongados y continuos.

Un epipedón plaggen, se puede identificar de varias formas. Es común que contenga artefactos, tales como pedazos de ladrillo o vasijas en todo su espesor. También puede tener trozos de diversos materiales como arena negra o arena gris clara, tan grandes como el tamaño que sostiene una pala. El epipedón plaggen muestra normalmente marcas de pala en toda su profundidad y también conserva capas de arena estratificada, que probablemente se produjeron en la superficie del suelo por el golpeteo de las lluvias y posteriormente fueron enterradas con la pala. La delimitación de una unidad de mapeo de suelos con epipedones plaggen puede tener cuerpos rectangulares con lados de formas rectas y estar más elevada que los suelos adyacentes por el mayor espesor del epipedón plaggen.

### Características Requeridas

El epipedón plaggen consiste de materiales minerales de suelo y presenta las siguientes:

1. Superficies de tierras localmente elevadas; y una o ambas de las siguientes:
  - a. Artefactos; *o*
  - b. Marcas de pala por debajo de una profundidad de 30 cm; *y*
2. Colores del value de 4 o menos, en húmedo, de 5 o menos, en seco, y un chroma, de 2 o menos; *y*
3. Un contenido de carbono-orgánico de 0.6 por ciento o más; *y*
4. Un espesor de 50 cm o más; *y*
5. Alguna parte del epipedón está húmeda por 90 días o más (acumulativos) en años normales durante el tiempo cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más elevada, si el suelo no está irrigado.

## Epipedón Úmbrico

### Características Requeridas

El epipedón úmbrico consiste de materiales minerales de suelo y mezclados en los 18 cm superiores del suelo mineral o en todo su espesor si su profundidad, a un contacto denso, lítico o paralítico o a un horizonte petrocálcico o a un duripán (todos definidos posteriormente), es menor de 18 cm. El epipedón úmbrico tiene las siguientes propiedades:

1. Cuando está seco, *una u otra o ambas*:
  - a. Unidades estructurales con un diámetro de 30 cm o menos o una estructura secundaria con un diámetro de 30 cm o menos; *o*
  - b. Una clase de resistencia a la ruptura de suave o moderadamente dura; *y*
2. Estructura de roca, incluyendo estratificaciones finas (menores de 5 mm), en menos de la mitad del volumen en todas partes; *y*
3. *Ambas* de las siguientes:
  - a. Colores dominantes con un value de 3 o menos, en húmedo, y de 5 o menos, en seco; *y*
  - b. Colores dominantes con un chroma de 3 o menos, en húmedo; *o*
4. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) menor de 50 por ciento en todo su espesor; *y*
5. Un contenido de carbono-orgánico de:
  - a. 0.6 por ciento o más (absoluto) que en el horizonte C (si está presente), si el epipedón úmbrico tiene un color del value menor que 1 unidad Munsell o un chroma con 2 unidades más bajas (ambas en húmedo y en seco) que el horizonte C; *o*
  - b. 0.6 por ciento o más y el epipedón no satisface los requisitos de 5-a; *y*
6. El espesor mínimo del epipedón es como sigue:
  - a. 25 cm, si:
    - (1) La textura del epipedón es arena francosa fina o más gruesa en todo su espesor; *o*
    - (2) No existen horizontes de diagnóstico subyacentes (definidos posteriormente) y el contenido de carbono-orgánico de los materiales subyacentes decrece irregularmente con el incremento de la profundidad; *o*
    - (3) *Ambos* de los siguientes están a 75 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral:
      - (a) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico (definidos posteriormente); *y*

(b) El límite superior de cualquiera de los siguientes que este más somero: horizonte petrocálcico, duripán, fragipán o carbonatos secundarios identificables; *o*

b. 10 cm, si el epipedón es más fino que la arena francosa fina (cuando mezclado) y está directamente encima de un contacto denso, lítico o paralítico, un horizonte petrocálcico o un duripán; *o*

c. 18 a 25 cm y el espesor es un tercio o más del espesor total entre la superficie del suelo *y*:

(1) El límite superior del más somero de cualquiera de los siguientes: carbonatos de calcio secundarios identificables, horizonte cálcico, horizonte petrocálcico, duripán o fragipán; *o*

(2) El límite inferior de cualquiera de los siguientes horizontes que este más profundo: argílico, cámbico, nátrico, óxico o espódico, *o*

d. 18 cm, si ninguna de las condiciones anteriores es aplicable; *y*

7. Fosfatos:

a. Con un contenido menor de 1500 miligramos por kilogramo extraído con ácido cítrico; *o*

b. Su contenido decrece irregularmente con el incremento de la profundidad abajo del epipedón; *o*

c. Está en forma de nódulos dentro del epipedón; *y*

8. En alguna parte el epipedón está húmedo por 90 días o más (acumulativos) en años normales durante el tiempo cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C ó más alta, si el suelo no está irrigado; *y*

9. El valor de *n* (definido posteriormente) es menor de 0.7; *y*

10. El epipedón úmbrico no presenta artefactos, ni marcas de pala, ni superficies elevadas que son característicos de un epipedón plaggen.

### Horizontes de Diagnóstico Subsuperficiales

Los horizontes descritos en esta sección se forman debajo de la superficie del suelo, aunque en algunas áreas se forman directamente abajo de una capa de hojarasca. También pueden estar expuestos en la superficie por truncación del suelo. Algunos de esos horizontes son considerados como horizontes B; otros, se pueden o no considerarse, como horizontes B y otros más, como parte del horizonte A.

### Horizonte Ágrico

El horizonte ágrico es un horizonte iluvial que se ha formado bajo cultivo y contiene cantidades significativas de limo, arcilla y humus iluvial.

### Características Requeridas

El horizonte ágrico está directamente abajo del horizonte Ap y tiene las siguientes propiedades:

1. Un espesor de 10 cm o más y *ya sea*:
  - a. 5 por ciento o más (por volumen) de canales de lombrices, incluyendo revestimientos con un espesor de 2 mm o más y un value, en húmedo, de 4 o menos y un chroma de 2 o menos; *o*
  - b. 5 por ciento o más (por volumen) de lamelas que tienen un espesor de 5 mm o más y un value, en húmedo, de 4 o menos y un chroma de 2 o menos.

### Horizonte Álbico

El horizonte álbico es un horizonte eluvial de 1.0 cm o más de espesor, que contiene 85 por ciento o más (por volumen) de materiales álbicos (definidos posteriormente). En general, ocurre debajo de un horizonte A, pero puede estar en la superficie de un suelo mineral. Por lo general, abajo del horizonte álbico existe un horizonte argílico, cámbico, kándico, nátrico o espódico o un fragipán (definidos posteriormente). El horizonte álbico puede yacer entre un horizonte espódico y un fragipán o un horizonte argílico, o puede estar entre un horizonte argílico o un horizonte kándico y un fragipán. Puede estar entre un epipedón mólico y un horizonte argílico o nátrico o entre un horizonte cámbico y un horizonte argílico, kándico o nátrico o un fragipán. El horizonte álbico puede separar horizontes, los cuales si estuvieran juntos, podrían reunir los requisitos para un epipedón mólico; o separar lamelas que en su conjunto pudieran satisfacer los requisitos de un horizonte argílico. Las lamelas no se consideran como parte del horizonte álbico.

### Horizonte Argílico

Un horizonte argílico normalmente es un horizonte subsuperficial con un porcentaje mayor de arcillas filossilicadas que el material de suelo subyacente. Muestra evidencias de iluviación de arcilla. El horizonte argílico se forma debajo de la superficie del suelo, pero puede estar expuesto en la superficie por erosión.

### Características Requeridas

1. Todos los horizontes argílicos deben cumplir *ambos* requisitos siguientes:
  - a. *Uno* de los siguientes:
    - (1) Si el horizonte argílico es francoso-grueso, francoso-fino, limoso-grueso, limoso-fino, fino o muy fino o es francoso o arcilloso, incluyendo su contraparte esquelético, deberá tener por lo menos 7.5 cm de espesor o al menos un décimo del espesor de la suma de los espesores de todos los horizontes suprayacentes, cualquiera que sea más grande; *o*
    - (2) Si el horizonte argílico es arenoso o esquelético-arenoso, debe tener al menos 15 cm de espesor; *o*

(3) Si el horizonte argílico está compuesto en su totalidad por lamelas, el espesor combinado de ellas, cada una con un espesor de 0.5 cm o más, deberá ser de 15 cm o más; *y*

b. Evidencias de iluviación de arcilla en al menos *una* de las siguientes formas:

- (1) Arcilla orientada uniendo granos de arenas; *o*
- (2) Películas de arcilla revistiendo poros; *o*
- (3) Películas de arcilla sobre la superficie de los agregados, tanto en forma horizontal como vertical; *o*
- (4) Secciones delgadas con cuerpos de arcilla orientada que constituyen más de 1 por ciento de la sección; *o*

(5) Si el coeficiente de extensibilidad lineal es 0.04 o más alto y el suelo tiene estaciones húmedas y secas contrastantes, entonces la relación arcilla fina con la arcilla total en el horizonte iluvial es 1.2 veces o más alta que la relación en el horizonte eluvial; *y*

2. Si se conserva el horizonte eluvial y no existe una discontinuidad litológica entre él y el horizonte iluvial y no hay una capa arable directamente encima de la capa iluvial, entonces, el horizonte iluvial deberá contener más arcilla total que el horizonte eluvial dentro de una distancia vertical de 30 cm o menos como sigue:

- a. Si en cualquier parte del horizonte eluvial tiene menos de 15 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina, el horizonte argílico deberá contener al menos 3 por ciento (absoluto) más arcilla (por ejemplo: 10 por ciento contra 13 por ciento); *o*
- b. Si el horizonte eluvial tiene de 15 a 40 por ciento de arcilla total en la fracción de tierra-fina, el horizonte argílico deberá tener al menos 1.2 veces más arcilla que el horizonte eluvial; *o*
- c. Si el horizonte eluvial tiene 40 por ciento o más de arcilla total en la fracción de tierra-fina, el horizonte argílico deberá contener al menos 8 por ciento (absoluto) más arcilla (por ejemplo: 42 por ciento contra 50 por ciento).

### Horizonte Cálcico

El horizonte cálcico es un horizonte iluvial en el cual el carbonato de calcio secundario u otros carbonatos se han acumulado en cantidades significativas.

### Características Requeridas

El horizonte cálcico:

1. Tiene 15 cm o más de espesor; *y*
2. Tiene *una o más* de las siguientes:
  - a. 15 por ciento o más (por peso) de  $\text{CaCO}_3$  equivalente (ver abajo) y 5 por ciento o más (absoluto), más alto que el horizonte subyacente; *o*

- b. 15 por ciento o más (por peso) de  $\text{CaCO}_3$  equivalente y 5 por ciento o más (por volumen), de carbonatos secundarios identificables; *y*
- c. 5 por ciento o más (por peso) de carbonato de calcio equivalente y tienen:
- (1) Menos de 18 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina; *y*
  - (2) Una clase de tamaño de partícula arenosa, esquelética-arenosa, francosa-gruesa o esquelética-francosa; *y*
  - (3) 5 por ciento o más (por volumen) de carbonatos secundarios identificables o 5 por ciento o más (absoluto) de carbonato de calcio equivalente (por peso) más alto que un horizonte subyacente; *y*
3. No está cementado o endurecido en ninguna parte por carbonato, u otros agentes cementantes, o está cementado en alguna parte y la parte cementada satisface *una* de las siguientes:
- a. Se caracteriza por muchas discontinuidades laterales donde las raíces pueden penetrar a través de las zonas no cementadas o a lo largo de fracturas verticales con un espaciamiento horizontal de menos de 10 cm; *o*
  - b. La capa cementada es menor de 1 cm de espesor y consiste de un casquete laminar que le subyace un contacto lítico o paralítico; *o*
  - c. La capa cementada es menor de 10 cm de espesor.

### Horizonte Cámbico

Un horizonte cámbico es el resultado de alteraciones físicas, transformaciones químicas o remociones o combinaciones de dos o más de esos procesos.

#### Características Requeridas

El horizonte cámbico es un horizonte alterado de 15 cm o más de espesor. Si está compuesto por lamelas, el espesor combinado deberá ser de 15 cm o más. Además, el horizonte cámbico deberá satisfacer *todas* las siguientes:

1. Presenta una textura de arena muy fina, arena francosa muy fina o más fina; *y*
2. Muestra evidencias de alteración en *una* de las siguientes formas:
  - a. Condiciones ácuicas dentro de los 50 cm de la superficie del suelo o están drenados artificialmente y *todas* las siguientes:
    - (1) Estructura de suelo o ausencia de estructura de roca en más de la mitad del volumen; *y*
    - (2) Colores que no cambian al exponerlos al aire; *y*
    - (3) Colores dominantes, en húmedo, sobre las caras de los agregados o en la matriz como sigue:
      - (a) Un value de 3 o menos y un chroma de 0; *o*

- (b) Un value de 4 o más y un chroma de 1 o menos; *o*
- (c) Cualquier value y un chroma de 2 o menos y concentraciones redox; *o*

b. No tiene la combinación de condiciones ácuicas dentro de los 50 cm de la superficie del suelo o drenado artificialmente y los colores, en húmedo, como los definidos en el punto 2-a-(3) anterior, y tiene estructura de suelo o ausencia de estructura de roca en más de la mitad de su volumen y *una o más* de las siguientes propiedades:

- (1) Mayor chroma, mayor value, hue rojizo o mayores contenidos de arcilla que el horizonte subyacente o un horizonte suprayacente; *o*
- (2) Evidencias de remoción de carbonatos o yeso; *y*

3. Tiene propiedades que no satisfacen los requisitos de un epipedón antrópico, hístico, folístico, melánico, mólico, plaggen o úmbrico, un duripán o fragipán o un horizonte argílico, cálcico, gypsico, nátrico, óxico, petrocálcico, petrogypsico, plácico o espódico; *y*

4. No es parte del horizonte Ap y no es quebradizo en más de 60 por ciento de la matriz.

### Duripán

#### Características Requeridas

Un duripán es un horizonte subsuperficial cementado con sílice con o sin agentes cementantes auxiliares. Puede ocurrir en conjunción con un horizonte petrocálcico.

Un duripán debe reunir *todos* los requisitos siguientes:

1. El pan o capa está cementado o endurecido en más de 50 por ciento del volumen de algún horizonte; *y*
2. El pan o capa muestra evidencias de acumulación de ópalo u otras formas de sílice, tales como casquetes laminares, revestimientos o lenticulares, intersticios rellenos parcialmente, formando puentes entre granos de tamaño de arena o revistiendo fragmentos de rocas o para-rocas; *y*
3. Menos de 50 por ciento del volumen de fragmentos secados al aire se desmoronan en HCl 1N, aún durante agitaciones prolongadas, y se desmorona en más de 50 por ciento en KOH o NaOH concentrados o en alternaciones de ácido – álcali; *y*
4. Debido a su continuidad lateral, las raíces solo penetran al pan a lo largo de fracturas verticales que tienen un espaciamiento horizontal de 10 cm o más.

### Fragipán

#### Características Requeridas

Para que una capa pueda ser identificada como fragipán debe tener *todas* las siguientes características:

1. 15 cm o más de espesor; *y*

2. Muestra evidencias de pedogénesis dentro del horizonte, o al menos, sobre las caras de las unidades estructurales; *y*
3. Tiene una estructura prismática gruesa, columnar o blocosa de cualquier grado, una estructura débil de cualquier tamaño o es masiva. Con separaciones entre unidades estructurales que permiten a las raíces su entrada y tienen un espaciamento horizontal promedio de 10 cm o más; *y*
4. Fragmentos secados al aire del suelo natural, de 5 a 10 cm de diámetro, se desmoronan en más de 50 por ciento de la capa cuando son sumergidos en agua; *y*
5. 60 por ciento o más del volumen, una clase de resistencia a la ruptura de firme a muy firme, una fractura quebradiza en o cerca de la capacidad de campo y virtualmente no tiene raíces; *y*
6. La capa no efervece (en HCl diluido).

### Horizonte Glóssico

El horizonte glóssico (Gr. *glossa*, lengua) se desarrolla como resultado de la degradación de un horizonte argílico, kándico o nátrico, en los cuales la arcilla y los óxidos de hierro libre han sido removidos.

#### Características Requeridas

Un horizonte glóssico tiene un espesor de 5 cm o más y consiste de:

1. Una parte eluvial, es decir, materiales álbicos (definidos posteriormente), los cuales constituyen de 15 a 85 por ciento (por volumen) del horizonte glóssico; *y*
2. Una parte iluvial, es decir, residuos (o partes) de un horizonte argílico, kándico o nátrico.

### Horizonte Gypsico

El horizonte gypsico es un horizonte iluvial en el cual el yeso secundario se ha acumulado de manera significativa.

#### Características Requeridas

Un horizonte gypsico tiene *todas* las propiedades siguientes:

1. Un espesor de 15 cm o más; *y*
2. No está cementado o endurecido por yeso, con o sin otros agentes cementantes; si está cementado y las partes cementadas tienen un espesor menor de 10 cm; o debido a la discontinuidad lateral, las raíces pueden penetrar a lo largo de fracturas verticales con espaciamentos horizontales de menos de 10 cm; *y*
3. 5 por ciento o más (por peso) de yeso y 1 por ciento o más (por volumen) de yeso secundario visible; *y*
4. Tiene un valor del producto del espesor, en cm, por el contenido de yeso (en por ciento del peso) de 150 o más. De esta manera, un horizonte de 30 cm de espesor con 5 por ciento de yeso, puede calificar como horizonte gypsico si el 1 por ciento o más (por volumen) es yeso visible y cualquier

cementación es como se describió en el punto 2 anterior. El contenido de yeso (por ciento por peso) se calcula como el producto del contenido de yeso, expresado en  $\text{cmol}_c \text{ kg}^{-1}$  de suelo (de la fracción de tierra-fina) y el peso equivalente del yeso (86), expresado como porcentaje.

### Horizonte Kándico

#### Características Requeridas

El horizonte kándico:

1. Es un horizonte subsuperficial verticalmente continuo que subyace a un horizonte superficial de textura gruesa. El espesor mínimo del horizonte superficial es de 18 cm después de mezclado o de 5 cm si la transición textural al horizonte kándico es abrupta y no existe un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico (definidos posteriormente), dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Tiene su límite superior:
  - a. En el punto donde el porcentaje de arcilla de la fracción de tierra-fina se incrementa con la profundidad dentro de una distancia vertical de 15 cm o menos, en *ya sea*:
    - (1) 4 por ciento o más alto (absoluto) que en el horizonte superficial, si el horizonte tiene menos de 20 por ciento de arcilla total en la fracción de tierra-fina; *o*
    - (2) 20 por ciento o más alto (relativo) que en el horizonte superficial, si el horizonte tiene de 20 a 40 por ciento de arcilla total en la fracción de tierra-fina; *o*
    - (3) 8 por ciento o más alto (absoluto) que en el horizonte superficial, si el horizonte tiene más de 40 por ciento de arcilla total en la fracción de tierra-fina; *y*
  - b. A una profundidad de:
    - (1) Entre 100 cm y 200 cm a partir de la superficie del suelo mineral, si la clase de tamaño de partícula es arenosa o esquelético arenosa en todo el espesor de los 100 cm superiores; *o*
    - (2) Dentro de los 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral, si el contenido de arcilla en la fracción de tierra-fina del horizonte superficial es 20 por ciento o más; *o*
    - (3) Dentro de los 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral para los demás suelos; *y*
3. Tiene un espesor de *ya sea*:
  - a. 30 cm o más; *o*
  - b. 15 cm o más si existe un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral y el horizonte kándico constituye 60 por ciento o más de la distancia vertical entre la profundidad de 18 cm y el contacto; *y*
4. Tiene una textura arena francosa muy fina o más fina; *y*

5. Tiene una CIC aparente de 16 cmol(+) o menos por kg de arcilla (con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7) y una CICE aparente de 12 cmol(+) o menos por kg de arcilla (suma de bases extractables con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7 más Al extractable con KCl 1N) en 50 por ciento o más de su espesor, entre el punto donde el requisito de incremento de arcilla se satisface y a una profundidad de 100 cm debajo de ese punto o a un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico si está más somero (El porcentaje de arcilla se establece midiéndolo con el método de la pipeta o estimándolo con la fórmula 2.5 [porcentaje de agua a una tensión de 1500 kPa menos el porcentaje de carbono-orgánico], cualquiera que sea más alto, pero no mayor de 100); y

6. El contenido de carbono-orgánico tiene un decrecimiento regular con el incremento de la profundidad, sin estratificaciones finas y sin capas suprayacentes de más de 30 cm de espesor que tengan estratificaciones finas y/o un contenido de carbono-orgánico que decrece irregularmente con el incremento de la profundidad.

### Horizonte Nátrico

#### Características Requeridas

El horizonte nátrico tiene, además de las propiedades del horizonte argílico:

1. *Ya sea:*
  - a. Columnas o prismas en alguna parte (usualmente en la parte superior), las cuales se pueden romper en bloques; *o*
  - b. Tanto la estructura blocosa como los materiales eluviales, contienen granos de limo y arena no revestidos y se extienden por más de 2.5 cm dentro del horizonte; y
2. *Ya sea:*
  - a. Un porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 15 por ciento o más ó una relación de adsorción de sodio (RAS), de 13 o más, en uno o más horizontes dentro de los 40 cm de su límite superior; *o*
  - b. Mayor contenido de magnesio y sodio intercambiables que de calcio y acidez intercambiables (a pH 8.2) en uno o más horizontes dentro de los 40 cm de su límite superior, si la PSI es 15 o más (o el RAS es de 13 o más) en uno o más horizontes dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

### Orstein

#### Características Requeridas

El orstein tiene *todas* las siguientes:

1. Está formado por materiales espódicos; y
2. Es una capa cementada en 50 por ciento o más; y
3. Tiene un espesor de 25 mm o más.

### Horizonte Óxico

#### Características Requeridas

El horizonte óxico es un horizonte subsuperficial que no tiene propiedades ándicas de suelo (definidas posteriormente) y tiene *todas* las siguientes características:

1. Un espesor de 30 cm o más; y
2. Una textura franco arenosa o más fina en la fracción de tierra-fina; y
3. Menos de 10 por ciento de minerales intemperizables en la fracción de 50 a 200 micrones; y
4. Estructura de roca en menos de 5 por ciento de su volumen, a menos que los litorelictos con minerales intemperizables estén revestidos con sesquióxidos; y
5. Un límite superior difuso, es decir, dentro de una distancia vertical de 15 cm y un incremento de arcilla con el incremento de la profundidad de:
  - a. Menos de 4 por ciento (absoluto) en su fracción de tierra-fina si en la fracción de tierra-fina del horizonte superficial contiene menos de 20 por ciento de arcilla; *o*
  - b. Menos de 20 por ciento (relativo) en su fracción de tierra-fina, si la fracción de tierra-fina del horizonte superficial contiene de 20 a 40 por ciento de arcilla; *o*
  - c. Menos de 8 por ciento (absoluto) en su fracción de tierra-fina, si la fracción de tierra-fina del horizonte superficial contiene más de 40 por ciento de arcilla; y
6. Tiene una CIC aparente de 16 cmol(+) o menos por kg de arcilla (con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7) y una CICE aparente de 12 cmol(+) o menos por kg de arcilla (suma de bases extractables con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7 más Al extractable con KCl 1N) (El porcentaje de arcilla se establece midiéndolo con el método de la pipeta o estimándolo con 3 veces [el porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos el porcentaje de carbono orgánico], cualquiera que sea más alto, pero no mayor de 100).

### Horizonte Petrocálcico

El horizonte petrocálcico es un horizonte iluvial en el cual el carbonato de calcio secundario u otros carbonatos se han acumulado a tal grado que el horizonte está cementado o endurecido.

#### Características Requeridas

Un horizonte petrocálcico deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. El horizonte está cementado o endurecido por carbonatos, con o sin sílice u otros agentes cementantes; y
2. Debido a su continuidad lateral, las raíces pueden penetrar sólo a lo largo de fracturas verticales con un espaciado horizontal de 10 cm o más; y

3. El horizonte tiene un espesor de:
  - a. 10 cm o más; *o*
  - b. 1 cm o más, si está constituido por un casquete laminar que sobreyace directamente a un lecho rocoso.

### Horizonte Petrogypsico

El horizonte petrogypsico es un horizonte iluvial, de 10 cm o más de espesor, en el cual el yeso secundario se ha acumulado en una cantidad tal, que el horizonte está cementado o endurecido.

#### Características Requeridas

Un horizonte petrogypsico deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. El horizonte está cementado o endurecido por yeso, con o sin otros agentes cementantes; *y*
2. Debido a su continuidad lateral, las raíces pueden penetrar sólo a lo largo de fracturas verticales con un espaciamiento horizontal de 10 cm o más; *y*
3. El horizonte tiene un espesor de 10 cm o más; *y*
4. El horizonte tiene 5 por ciento o más de yeso, y el producto de su espesor, en cm, por el contenido de yeso, en por ciento, es de 150 o más.

### Horizonte Plácico

El horizonte plácico (Gr. basado en *plax*; piedra plana; significa capa delgada cementada) es un *pan* (o capa) delgado, negro o rojizo oscuro que está cementado por hierro (o hierro y manganeso) y materia orgánica.

#### Características Requeridas

Un horizonte plácico deberá satisfacer los siguientes requisitos:

1. El horizonte está cementado o endurecido con hierro o hierro y manganeso y materia orgánica, con o sin otros agentes cementantes; *y*
2. Debido a su continuidad lateral, las raíces pueden penetrar sólo a lo largo de fracturas verticales con un espaciamiento horizontal de 10 cm o más; *y*
3. El horizonte tiene un espesor mínimo de 1 mm y cuando está asociado con materiales espódicos, es menor de 25 mm de espesor.

### Horizonte Sáfico

El horizonte sáfico es un horizonte de acumulación de sales más solubles que el yeso en agua fría.

#### Características Requeridas

Un horizonte sáfico tiene 15 cm o más de espesor y tiene por 90 días consecutivos o más en años normales:

1. Una conductividad eléctrica (CE) igual o mayor de 30 dS/m en el extracto de agua de la pasta de saturación; *y*
2. Un producto de la CE, en dS/m, por el espesor, en cm, igual a 900 o mayor.

### Horizonte Sómbrico

El horizonte sómbrico (F. *sombre*, oscuro) es un horizonte subsuperficial en suelos minerales que se ha formado bajo condiciones de drenaje libre. Contiene humus iluvial que ni está asociado con el aluminio, como sucede en el horizonte espódico, ni está disperso por el sodio, como en el horizonte nátrico. En consecuencia, el horizonte sómbrico no tiene una capacidad de intercambio catiónico alta en su arcilla como ocurre en el horizonte espódico y tampoco tiene una saturación de bases alta como sucede en el horizonte nátrico. No subyace, además, a un horizonte álbico.

Se considera, que los horizontes sómbricos están restringidos a suelos de áreas frías, húmedas, de planicies elevadas y a montañas de regiones tropicales o subtropicales. Debido a la fuerte lixiviación que les ocurre, su saturación de bases es baja (menos de 50 por ciento con  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ).

El horizonte sómbrico tiene colores más bajos en el value o en el chroma o en ambos, que el horizonte suprayacente y contiene más materia orgánica. Se puede formar en un horizonte argílico, cámbico u óxico. Si los agregados están presentes, los colores oscuros están más pronunciados sobre las caras de los agregados.

En el campo, el horizonte sómbrico se confunde fácilmente con un horizonte A enterrado. Se puede distinguir de los epipedones enterrados utilizando otros métodos. En secciones delgadas, la materia orgánica de un horizonte sómbrico está más concentrada sobre los agregados y en los poros, que dispersa uniformemente en toda la matriz.

### Horizonte Espódico

Un horizonte espódico es una capa iluvial con 85 por ciento o más de materiales espódicos (definidos posteriormente).

#### Características Requeridas

Un horizonte espódico normalmente es un horizonte subsuperficial que subyace a un horizonte O, A, Ap o E. Sin embargo, puede satisfacer la definición de un epipedón úmbrico.

Un horizonte espódico deberá tener 85 por ciento o más de materiales espódicos en una capa de 2.5 cm o más de espesor que no forma parte de ningún horizonte Ap.

### Otras Características de Diagnóstico de Suelos (Suelos Minerales)

Las características de diagnóstico son rasgos del suelo utilizados en las claves o en la definición de horizontes de diagnóstico.

## Cambio Textural Abrupto

Un cambio textural abrupto es un tipo específico de cambio que puede ocurrir entre un epipedón ócrico o un horizonte álbico y un horizonte argílico. Se caracteriza por un incremento considerable en el contenido de arcilla dentro de una distancia vertical muy corta en la zona de contacto. Si el contenido de arcilla en la fracción de tierra-fina del epipedón ócrico o del horizonte álbico es menor de 20 por ciento, este se duplica dentro de una distancia vertical 7.5 cm o menos. Si el contenido de arcilla en la fracción de tierra-fina del epipedón ócrico o del horizonte álbico es de 20 por ciento o más, existe un incremento de 20 por ciento (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o menos (por ejemplo: de 22 a 42 por ciento) y el contenido de arcilla, en alguna parte del horizonte argílico, es dos veces ó más la cantidad del horizonte suprayacente.

Normalmente, no existe un horizonte transicional entre un epipedón ócrico o un horizonte álbico y un horizonte argílico o el horizonte transicional es muy delgado para poderlo muestrear. Algunos suelos, sin embargo, tienen un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos (definidos posteriormente) en partes del horizonte argílico. El límite superior de tales horizontes es irregular o más aún discontinuo. El muestreo de esta mezcla como un solo horizonte puede dar la impresión de un horizonte transicional relativamente grueso, mientras que el verdadero espesor de la transición en la zona de contacto puede ser no mayor de 1 mm.

## Materiales Álbicos

Los materiales álbicos (*L. albus*, blanco) son materiales de suelo cuyo color está determinado por el color de las partículas primarias de arena y limo, más que por el color de sus revestimientos. La definición implica que la arcilla y/o los óxidos de hierro libres han sido removidos de los materiales o que los óxidos han sido segregados a tal grado que el color de los materiales está determinado en gran medida por el color de las partículas primarias.

## Características Requeridas

Los materiales álbicos tienen *uno* de los siguientes colores:

1. Un chroma de 2 o menos; *y*
  - a. Un color del value, en húmedo, de 3 y un color del value, en seco, de 6 o más, *o*
  - b. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y un color del value, en seco, de 5 o más, *o*
2. Un chroma de 3 o menos; *y*
  - a. Un color del value, en húmedo, de 6 o más; *o*
  - b. Un color del value, en seco, de 7 o más; *o*
3. Un chroma que está controlado por el color de los granos no revestidos de limo o arena, un hue de 5YR o más rojizo y el color del value como los listados en 1-a y en 1-b.

No se consideran como materiales álbicos, las capas relativamente inalteradas de arenas de colores claros, cenizas volcánicas u otros materiales depositados por el agua o por el viento, aún cuando puedan tener el mismo color y morfología aparente. Esos depósitos son materiales parentales que no han sufrido una remoción de arcilla y/o hierro libre y no están sobrepuestos a un horizonte iluvial u otro horizonte del suelo, excepto un suelo enterrado. Las crotovinas de colores claros o canales de raíces rellenos, se pueden considerar como materiales álbicos sólo si no tienen estratificaciones finas o lamelas, si cualquier sellamiento a lo largo de las paredes de la crotoquina han sido destruidos, y si estas intrusiones han sido, después de la depositación, lixiviadas de óxidos de hierro libre y/o arcilla.

## Propiedades Ándicas de Suelo

Las propiedades ándicas de suelo se forman comúnmente durante el intemperismo de tefras u otros materiales parentales que contienen cantidades significativas de vidrio volcánico. Suelos que están en climas fríos húmedos y que contienen abundante carbono orgánico, pueden desarrollar propiedades ándicas sin la influencia del vidrio volcánico. En esta taxonomía, al grupo de minerales vítreos y vítreos-recubiertos ricos en sílice se le denomina vidrio volcánico. Estos materiales son relativamente solubles y sufren una transformación rápida cuando los suelos están húmedos. Las propiedades ándicas de suelo representan una etapa de transición donde el intemperismo y la transformación de aluminosilicatos primarios (por ej. vidrio volcánico) han llegado al punto de formar materiales de rango-corto, tales como alofano, imogolita, ferrihidrita o complejos metal-humus. El concepto de propiedades ándicas de suelo incluye a materiales de suelo moderadamente intemperizados, ricos en materiales de rango-corto o complejos metal-humus, o ambos, con o sin vidrio volcánico (característica requerida 2) y suelo débilmente intemperizados, menos rico en materiales de rango-corto pero con vidrio volcánico (característica requerida 3).

Las cantidades relativas de alofano, imogolita, ferrihidrita o complejos metal-humus en la fracción coloidal son inferidas a partir de análisis de laboratorio de aluminio, hierro y sílice extraídos con oxalato de amonio, y a partir de la retención de fosfato. Los científicos de suelo pueden usar la untuosidad o el pH en fluoruro de sodio (NaF) 1 N, como indicadores de campo de las propiedades ándicas de suelo. El *contenido de vidrio volcánico* es el porcentaje de vidrio volcánico (por conteo de granos) en la fracción de arena y limo grueso (0.02 a 2.0 mm). La mayoría de los materiales de suelo con propiedades ándicas consisten de materiales minerales de suelo, pero algunos son materiales orgánicos de suelo con menos de 25 por ciento de carbono orgánico.

## Características Requeridas

Los materiales de suelo con propiedades ándicas deberán tener una fracción de tierra-fina que cumpla con los siguientes requisitos:

1. Menos de 25 por ciento de carbono orgánico (por peso) y una o ambas de las siguientes:
  - a. Una densidad aparente, medida a una retención de agua de 33 kPa, de 0.90 g/cm<sup>3</sup> o menos; y
  - b. Una retención de fósforo de 85 por ciento o más; y
  - c. Un contenido de Al + ½ Fe (por oxalato de amonio) igual a 2.0 por ciento o más; o
3. Todas las siguientes:
  - a. 30 por ciento o más de la fracción de tierra-fina es de un tamaño entre 0.02 y 2.0 mm; y
  - b. Una retención de fósforo de 25 por ciento o más; y
  - c. Un contenido de Al + ½ Fe (por oxalato de amonio) igual a 0.4 por ciento o más; y
  - d. Un contenido de vidrio volcánico de 5 por ciento o más; y
  - e. El contenido de Al + ½ Fe, en porcentaje por (15.625) + [contenido de vidrio volcánico, en porcentaje] = 36.25 o más.

El área sombreada de la Figura 1 ilustra los criterios 3c, 3d y 3e.

### Condiciones Anhídras

Las condiciones anhídras (Gr. *anydros*, sin agua) se refieren a las condiciones de humedad de los suelos en desiertos muy fríos y en otras áreas con permafrost (más común, permafrost seco). Estos suelos típicamente tienen una baja precipitación (usualmente menor de 50 mm de agua equivalente por año) y un contenido de humedad menor a 3 por ciento por peso. Las condiciones anhídras de suelo son similares a los regímenes de humedad áridos (tórridos) (definidos posteriormente), excepto porque la temperatura del suelo a 50 cm es menor de 5 °C a través del año en las capas de suelo que tienen esta condición.

### Características Requeridas

Los suelos con condiciones anhídras tienen una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría. La capa de 10 a 70 cm abajo de la superficie del suelo tiene una temperatura del suelo menor de 5 °C durante todo el año y esta capa:

1. No incluye un permafrost cementado por hielo; y
2. Está seca (con agua retenida a 1500 kPa o más) en la mitad o más del suelo durante la mitad o más del tiempo en donde la capa tiene una temperatura del suelo por arriba de 0 °C; o
3. Tiene una clase de resistencia a la ruptura de suelta a ligeramente dura en todo su espesor cuando la temperatura del suelo es de 0 °C o más fría, excepto cuando ocurre un horizonte pedogenético cementado.




Figura 1.- Los suelos ubicados en el área más oscura satisfacen los criterios de las propiedades ándicas de suelo del punto 3 e incisos c, d y e. Para calificar como suelos con propiedades ándicas, los suelos deberán satisfacer también la lista de requisitos para el contenido de carbono-orgánico, retención de fósforo y distribución del tamaño de partículas.

### Coefficiente de Extensibilidad Lineal (COEL)

El coeficiente de extensibilidad lineal (COEL) es la relación de la diferencia entre la longitud en húmedo y la longitud en seco de un terrón respecto a su longitud en seco. Esto es  $(L_h - L_s)/L_s$ , donde  $L_h$  es la longitud a una tensión de 33 kPa y  $L_s$  es la longitud en seco. Se puede calcular el COEL a partir de las diferencias entre la densidad aparente de un terrón cuando húmedo y cuando seco. También se puede estimar el COEL en campo midiendo la distancia entre dos alfileres de un terrón de suelo no alterado a capacidad de campo y posteriormente midiéndola en el terrón seco. El COEL no se aplica si la contracción es irreversible.

### Durinoides

Los durinoides (*L. durus*, duro y *nodus*, nudo) son nódulos de ligeramente cementados a endurecidos, con 1 cm o más de diámetro. El cementante es SiO<sub>2</sub>, presumiblemente ópalo y formas microcristalinas de sílice. Se desmoronan en KOH concentrado, después de un tratamiento con HCl para remover carbonatos, pero no se desmoronan solo con HCl concentrado. Los durinoides secos no se desmoronan en agua, pero una agitación prolongada puede originar un astillamiento en plaquetas muy finas. Los durinoides son firmes o muy firmes y quebradizos en húmedo, tanto antes como después de tratarlos con ácido. La mayoría de los durinoides son más o menos concéntricos cuando se observan en secciones transversales y son acumulaciones concéntricas de ópalo visibles con una lupa.

## Propiedades Frágicas de Suelo

Las propiedades frágicas de suelo son esencialmente las propiedades de un fragipán, pero no tienen los requisitos de espesor de la capa, ni el volumen para ser un fragipán. Las propiedades frágicas de suelo están en horizontes subsuperficiales, aunque pueden estar en o cerca de la superficie en suelos truncados. Los agregados con propiedades frágicas de suelo tienen una clase de resistencia a la ruptura de firme a muy firme y son quebradizos cuando el suelo está en o cerca de la capacidad de campo. Los fragmentos de fábrica natural, secados al aire, de 5 a 10 cm de diámetro, se desmoronan cuando son sumergidos en agua. Los agregados con propiedades frágicas de suelo muestran evidencias de pedogénesis, que incluyen una o más de las siguientes: arcillas orientadas dentro de la matriz o sobre las caras de los agregados, rasgos redoximórficos dentro de la matriz o sobre las caras de los agregados, estructura del suelo de fuerte a moderada y revestimientos de materiales álbicos o granos de limo y arena sin revestimientos sobre las caras de los agregados o en vetas. Los agregados con estas propiedades se consideran que tienen propiedades frágicas de suelo a menos que su densidad o ruptura no sean pedogenéticas.

Los agregados del suelo con propiedades frágicas deberán:

1. Mostrar evidencias de pedogénesis dentro de los agregados o, por lo menos, sobre las caras de los agregados; y
2. Desmoronarse los fragmentos de fábrica natural secados al aire, de 5 a 10 cm de diámetro, cuando sean sumergidos en agua; y
3. Tener una clase de resistencia a la ruptura de firme a muy firme y quebradizo cuando el agua del suelo está en o cerca de la capacidad de campo; y
4. Restringir la entrada de raíces dentro de la matriz cuando el agua del suelo está en o cerca de la capacidad de campo.

## Carbonatos Secundarios Identificables

El término “carbonatos secundarios identificables” se usa en las definiciones de numerosas taxa. Se refiere al carbonato de calcio autógeno en movimiento, que se ha precipitado en un lugar a partir de la solución del suelo más que heredado del material parental, tal como en los loess o glaciales calcáreos.

Los carbonatos secundarios identificables pueden destruir la estructura del suelo para formar masas, nódulos, concreciones o agregados esféricos (ojos blancos) que son suaves y pulverulentos cuando secos; o pueden estar presentes como revestimientos en poros, sobre caras estructurales o sobre los lados internos de fragmentos de rocas o para-rocas. Si se presentan como revestimientos, los carbonatos secundarios cubren una parte significativa de las superficies. Es común que revistan toda la superficie con un espesor total de 1 mm o más, pero si existe una pequeña cantidad de carbonatos de calcio en el suelo, las superficies

pueden estar sólo parcialmente cubiertas. Los revestimientos deberán ser lo suficientemente espesos para ser visibles cuando húmedos. Algunos horizontes están completamente absorbidos por carbonatos. El color de estos horizontes está determinado en gran medida, por los carbonatos. Los carbonatos en estos horizontes están dentro del concepto de carbonatos secundarios identificables.

Es común que los filamentos observados en horizontes calcáreos secos estén dentro del significado de carbonatos secundarios identificables, si son lo suficientemente gruesos para ser visibles cuando el suelo está húmedo. Los filamentos comúnmente son ramificaciones sobre las caras estructurales.

## Interdigitaciones de Materiales Álbicos

El término “interdigitaciones de materiales álbicos” se refiere a materiales álbicos que penetran 5 cm o más dentro de un horizonte argílico, kándico o nátrico subyacente a lo largo de las caras verticales de los agregados, y en menor grado en las caras horizontales. No se requiere que exista un horizonte álbico continuo suprayacente. Los materiales álbicos constituyen menos de 15 por ciento de las capas que ellos penetran, pero forman esqueletanos continuos (agregados con revestimientos limpios de limo o arena, definidos por Brewer, 1976) de 1 mm o más de espesor en las caras verticales de los agregados, lo que significa una anchura total de 2 mm o más entre agregados colindantes. Debido a que el cuarzo es un constituyente común del limo y la arena, estos esqueletanos usualmente son grises claros cuando húmedos y casi blancos cuando secos, pero su color está determinado en gran parte por el color de la fracción de limo o arena.

### Características Requeridas

Se reconocen a las interdigitaciones de materiales álbicos, si los materiales álbicos:

1. Penetran 5 cm o más dentro de un horizonte argílico o nátrico subyacente; y
2. Tienen un espesor de 2 mm o más entre las caras verticales de los agregados colindantes; y
3. Constituyen menos de 15 por ciento (por volumen) de la capa que penetran.

## Lamelas

Una lamela es un horizonte iluvial menor de 7.5 cm de espesor. Cada lamela contiene una acumulación de arcilla silicatada orientada sobre o uniendo granos de arena y limo (y fragmentos de roca si cualquiera está presente). Una lamela tiene más arcilla silicatada que el horizonte eluvial suprayacente.

### Características Requeridas

Una lamela es un horizonte iluvial menor de 7.5 cm de espesor formada en regolita no consolidada de más de 50 cm de espesor. Cada lamela contiene una acumulación de arcilla

silicatada orientada sobre o uniendo granos de arena y limo (y fragmentos gruesos si están presentes). Se requiere que cada lamela tenga más arcilla silicatada que el horizonte eluvial suprayacente.

Las lamelas ocurren en series verticales de dos o más y cada grupo debe tener un horizonte eluvial suprayacente (no se requiere un horizonte eluvial para el grupo de lamelas más superiores, si el suelo ha sido truncado).

Las lamelas pueden satisfacer los requisitos de un horizonte cámbico o de un argílico. Puede ser un horizonte cámbico la combinación de dos o más grupos de lamelas de 15 cm o más de espesor, si la textura es arena muy fina, arena francosa muy fina o más fina. Puede ser un horizonte argílico la combinación de dos o más grupos de lamelas si reúne los requisitos de un espesor acumulativo de 15 cm o más, con un espesor de 0.5 cm o más y tienen un contenido de arcilla de ya sea:

1. 3 por ciento o más alto (absoluto) que el horizonte eluvial suprayacente (por ejemplo: 13 por ciento contra 10), si cualquier parte del horizonte eluvial tiene menos de 15 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina; o
2. 20 por ciento o más alto (relativo) que el horizonte eluvial suprayacente (por ejemplo: 24 por ciento contra 20), si en todas partes del horizonte eluvial tiene más de 15 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina.

### Extensibilidad Lineal (EL)

La extensibilidad lineal (EL) ayuda a predecir el potencial de expansión y contracción de un suelo. La EL de una capa de suelo es el producto del espesor, en cm, multiplicado por el COEL de la capa en cuestión. La EL de un suelo es la suma de esos productos para todos los horizontes.

### Discontinuidades Litológicas

Las discontinuidades litológicas son cambios significativos en la distribución del tamaño de partículas o en la mineralogía que representan diferencias en la litología dentro de un suelo. Una discontinuidad litológica también puede denotar una diferencia de edades. Una información más completa en el uso de designaciones de horizontes con discontinuidades litológicas, se puede ver en el Soil Survey Manual (USDA, SCS, 1993).

No existe un acuerdo generalizado sobre el grado de cambio que se requiere para definir a las discontinuidades litológicas, ni tampoco se han realizado intentos para cuantificar a las discontinuidades litológicas. La siguiente discusión intenta servir como guía.

Varias evidencias de campo se pueden usar para evaluar a las discontinuidades litológicas, además, de las diferencias texturales y mineralógicas que requieren estudios de laboratorio. Ellas incluyen a las siguientes, aunque es conveniente mencionar que no son las únicas:

**1. Contactos texturales abruptos.**--Un cambio abrupto en la distribución del tamaño de partículas se puede observar con

frecuencia. Este no siempre es un cambio en el contenido de arcilla como resultado de la pedogénesis.

**2. Tamaños contrastantes de arenas.**--Se pueden detectar cambios significativos en el tamaño de las arenas. Por ejemplo, si el material contiene principalmente arena media o arena fina y abruptamente esta sobrepuesto un material que contiene arena gruesa o arena muy gruesa, se puede asumir que existen dos materiales diferentes. Aún cuando, los materiales puedan tener una mineralogía similar, el tamaño contrastante de las arenas es el resultado de una diferencia en las energías en el momento de su depositación por agua y/o por viento.

**3. Litología del lecho rocoso v.s. litología de fragmentos rocosos en el suelo.**--Si un suelo con fragmentos rocosos sobreyace a un contacto lítico, se puede esperar que los fragmentos rocosos tengan una litología similar a la del material de abajo del contacto lítico. Pero, si muchos de los fragmentos rocosos no tienen la misma litología como la del lecho rocoso subyacente, el suelo no se derivó completamente del lecho rocoso subyacente.

**4. Líneas de piedras.**--La ocurrencia de una línea horizontal de fragmentos rocosos en la secuencia vertical de un suelo indica que este se pudo haber desarrollado en más de una clase de material parental. El material por encima de la línea de piedras es probable que haya sido transportado y que el material de abajo tenga un origen diferente.

**5. Distribución inversa de fragmentos rocosos.**--Una discontinuidad litológica es con frecuencia, indicada por una distribución aleatoria de los fragmentos rocosos. El porcentaje de fragmentos rocosos decrece con el incremento de la profundidad. Esas evidencias son útiles en áreas de suelos que tienen fragmentos rocosos relativamente no intemperizados.

**6. Fragmentos de roca con corteza intemperizada.**--Horizontes que contienen fragmentos de roca sin corteza, sobrepuestos a horizontes con corteza, sugiere que el material más superficial es depositado y no relacionado con la parte inferior en tiempo y tal vez en litología.

**7. Forma de los fragmentos rocosos.**--Un suelo con horizontes que contienen fragmentos rocosos angulares sobrepuestos a horizontes que presentan fragmentos rocosos redondeados pueden indicar una discontinuidad. Estas evidencias representan a diferentes mecanismos de transporte (coluvial v.s. aluvial) o más aún a diferentes distancias de transporte.

**8. Color del suelo.**--Cambios abruptos en el color, que no son resultado de procesos pedogenéticos, se pueden usar como indicadores de discontinuidades.

**9. Rasgos micromorfológicos.**--Diferencias marcadas en tamaño y forma de minerales resistentes en un horizonte y no en otro, indican materiales diferentes.

### Uso de Datos de Laboratorio

Las discontinuidades no siempre son fáciles de detectar en el campo. En tales casos los datos de laboratorio son necesarios; aunque aún con ellos la detección de discontinuidades puede resultar difícil. La decisión es un juicio cualitativo o tal vez, parcialmente cuantitativo.

Algunos conceptos generales de litología como una función de la profundidad pueden incluir:

**1. Datos de laboratorio–evaluación visual.**--El orden de los datos de laboratorio se evalúa con el fin de determinar si la discontinuidad designada en campo está presente y si algunos datos muestran evidencias de una discontinuidad no observada en campo. Uno puede detectar cambios en la litología a partir de modificaciones causadas por procesos pedogenéticos. En la mayoría de los casos, la arena de las fracciones más gruesas no está alterada significativamente por los procesos de formación de suelos. Por lo tanto, un cambio abrupto en el tamaño de las arenas o en su mineralogía es un indicio de un cambio litológico. La mineralogía general de un suelo y los minerales resistentes son otros indicadores adecuados.

**2. Datos de arcillas libres de bases.**--Una forma común en la evaluación de cambios litológicos, es el cálculo de los separados de arena y de limo, libres de carbonatos y de arcilla, libre de bases (fracción porcentual, es decir, arena fina y arena muy fina, divididas por el porcentaje de arena más limo, multiplicados por 100). La distribución de la arcilla está sujeta a cambios pedogenéticos y puede enmascarar diferencias litológicas heredadas o producir diferencias que no son heredadas de la litología. En la computadora, el arreglo numérico sobre la arcilla libre de bases puede ser inspeccionado visualmente o graficado como una función de la profundidad.

Otra ayuda para evaluar cambios litológicos es el cálculo de las relaciones entre un separado de arena con otros. Las relaciones pueden ser capturadas en una computadora y examinadas como arreglos numéricos o pueden ser graficadas. Las relaciones son adecuadas si están disponibles cantidades suficientes de las dos fracciones. Cantidades pequeñas magnifican cambios en las relaciones, especialmente si el denominador es bajo.

## Valor $n$

El valor  $n$  (Pons y Zonneveld, 1965) caracteriza la relación entre el porcentaje de agua en el suelo bajo condiciones de campo y sus porcentajes de arcilla inorgánica y humus. El valor de  $n$  es útil para predecir si un suelo puede ser pastoreado por el ganado o puede soportar otras cargas y para predecir el grado de subsidencia que puede ocurrir después del drenaje.

Para materiales minerales de suelo que no sean tixotrópicos, el valor de  $n$  se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$n = (A - 0.2 R)/(L+3H)$$

En esta fórmula, A es el porcentaje de agua en el suelo en condiciones de campo, calculado en base al peso del suelo seco; R es el porcentaje de limo más arena; L es el porcentaje de arcilla; y H es el porcentaje de materia orgánica (carbono orgánico x 1.724).

Se dispone de pocos datos en Estados Unidos para calcular el valor de  $n$ , pero el valor crítico de  $n$  de 0.7 se puede aproximar en campo a través de una prueba simple: exprimiendo una masa de suelo con la mano. Si el suelo fluye

con dificultad entre los dedos, el valor de  $n$  está entre 0.7 y 1.0; si el suelo fluye fácilmente entre los dedos, el valor de  $n$  es de 1 o mayor (moderadamente fluida o muy fluida son sus clases de falla).

## Contacto Petroférico

Un contacto petroférico (Gr. *petra*, piedra y *L. ferrum*, hierro, implica piedra de hierro) es un límite entre un suelo y una capa continua de material endurecido en el cual el hierro es un cementante importante, mientras que la materia orgánica no existe o sólo se presenta en trazas. La capa endurecida puede ser continua dentro de los límites de cada pedón, pero puede estar fracturada si la distancia lateral promedio entre las fracturas es de 10 cm o más. De hecho, esta capa petroférica contiene poca o nada de materia orgánica lo que la distingue del horizonte plácico y del horizonte espódico endurecido (orstein) que sí la contienen.

Varias rasgos pueden ayudar para distinguir entre un contacto lítico y un contacto petroférico. Primero, un contacto petroférico está más o menos horizontal. Segundo, el contenido de hierro en el material que está inmediatamente abajo del contacto petroférico es alto (normalmente 30 por ciento o más de  $Fe_2O_3$ ). Tercero, las láminas de piedra de hierro abajo del contacto petroférico son delgadas y su espesor varía de unos pocos cm a muy pocos metros. La arenisca, por otro lado, puede ser muy delgada o muy espesa, puede estar nivelada o inclinada, y puede contener un pequeño porcentaje de  $Fe_2O_3$ . En los trópicos la piedra de hierro es más o menos vesicular.

## Plintita

La plintita (Gr. *plinthos*, ladrillo) es una mezcla de arcilla con cuarzo y otros diluyentes, rica en hierro y pobre en humus. Comúnmente, ocurre como concentraciones redox rojo oscuras, que usualmente forman patrones laminares, poligonales o reticulares. La plintita cambia irreversiblemente a un pan endurecido férrico o a agregados irregulares al exponerla a humedecimientos y secados repetidos, en especial si se le expone al calor del sol. El límite inferior de una zona en la cual la plintita ocurre generalmente es difuso y gradual, pero puede ser abrupta en una discontinuidad litológica.

En general, la plintita se forma en un horizonte que está saturado con agua en algún período del año. La segregación original del hierro normalmente está en forma de concentraciones redox rojas o rojas oscuras blandas, más o menos arcillosas. Estas concentraciones redox no son consideradas como plintita a menos que exista suficiente segregación de hierro para permitir el endurecimiento irreversible, al exponerlo al humedecimiento y secado. La plintita es firme o muy firme cuando el contenido de humedad del suelo está cerca de la capacidad de campo y dura cuando el contenido de humedad está abajo del punto de marchitamiento. La plintita no se endurece irreversiblemente como resultado de un ciclo simple de secado y rehmedecimiento. Después de un secado simple y su posterior rehmedecimiento, esta puede ser dispersada en

gran proporción por agitación en agua con un agente dispersante.

En un suelo húmedo, la plintita es lo suficientemente suave para ser cortada con una pala. Después del endurecimiento irreversible, ya no es considerada como plintita pero puede ser denominada como piedra de hierro. Los materiales endurecidos de piedra de hierro pueden romperse con la pala, pero no pueden ser dispersados con la agitación en agua con un agente dispersante.

### Minerales Resistentes

En esta taxonomía se hacen varias referencias a minerales resistentes. Obviamente, la estabilidad de un mineral en el suelo es una función parcial del régimen de humedad del suelo. Cuando en las definiciones de horizontes de diagnóstico y en varios taxa se hace referencia a minerales resistentes, siempre se asume un clima húmedo, pasado o presente.

Los minerales resistentes son minerales durables de la fracción de 0.02 a 2.0 mm. Ejemplos son: cuarzo, zircón, turmalina, berilio, anatasa, rutilo, óxidos e hidróxidos de hierro, filosilicatos dioctahédricos 1:1 (kanditas), gibbsita e hidróxi-aluminos interlaminados 2:1 (Burt, 2004).

### Caras de Deslizamiento o Superficies de Fricción

Las caras de deslizamiento son superficies pulidas y en general tienen dimensiones que exceden a 5 cm. Se producen cuando una masa de suelo se desliza sobre otra. Algunas caras de deslizamiento ocurren en el límite inferior de una superficie resbaladiza donde la masa de suelo se mueve hacia abajo sobre una pendiente relativamente fuerte. Las caras de deslizamiento resultan directamente de la expansión de minerales arcillosos y el corte de la falla. Son muy comunes en arcillas expandibles que sufren cambios marcados en el contenido de humedad.

### Materiales Espódicos

Los materiales espódicos se forman en un horizonte iluvial que normalmente subyace a un epipedón hístico, ócrico o úmbrico o un horizonte álbico. En la mayoría de las áreas no alteradas, los materiales espódicos subyacen a un horizonte álbico; pueden ocurrir dentro de un epipedón úmbrico o un horizonte Ap.

Un horizonte que contiene materiales espódicos normalmente tiene un valor de densidad óptica del extracto con oxalato (DOEO) de 0.25 o mayor y ese valor es al menos 2 veces más alto que el valor de la DOEO para el horizonte eluvial subyacente. Este incremento en el valor de la DOEO indica una acumulación de materiales orgánicos transportados en un horizonte iluvial. Los suelos con materiales espódicos muestran evidencias de materiales orgánicos y aluminio con o sin hierro, que se han removido de un horizonte eluvial a un horizonte iluvial.

### Definición de Materiales Espódicos

Los materiales espódicos son materiales minerales de suelo que no tienen todas las propiedades de un horizonte argílico o de un kándico; están dominados por materiales amorfos activos que son iluviales y que están compuestos por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro y tienen *ambas* de las siguientes:

1. Un valor de pH en agua (1:1) de 5.9 o menos y un contenido de carbono-orgánico de 0.6 o más; y
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Un horizonte álbico suprayacente que se extiende horizontalmente en 50 por ciento o más de cada pedón y tiene directamente abajo del horizonte álbico, colores en húmedo (en una muestra molida y homogeneizada), como sigue:
    - (1) Un hue de 5YR o más rojizo; *o*
    - (2) Un hue de 7.5 YR, un value de 5 o menos y un chroma de 4 o menos; *o*
    - (3) Un hue de 10YR o neutro y un value y un chroma de 2 o menos; *o*
    - (4) Un color de 10YR3/1; *o*
  - b. Con o sin horizonte álbico y uno de los colores listados anteriormente o un hue de 7.5YR, un value, en húmedo, de 5 o menos y un chroma de 5 o 6 (en una muestra molida y homogeneizada) y *una o más* de las siguientes propiedades morfológicas o químicas:
    - (1) Una cementación por materia orgánica y aluminio con o sin hierro, en 50 por ciento o más de cada pedón y una clase de resistencia a la ruptura muy firme o extremadamente firme en la parte cementada; *o*
    - (2) 10 por ciento o más de revestimientos agrietados sobre los granos de arena; *o*
    - (3) Porcentajes de Al + 1/2 Fe (por oxalato de amonio) de 0.50 o más y la mitad o menos de esa cantidad en un epipedón úmbrico suprayacente (o en un subhorizonte del epipedón úmbrico) o en un epipedón ócrico o en un horizonte álbico; *o*
    - (4) Un valor de la densidad óptica del extracto con oxalato (DOEO) de 0.25 o más y la mitad o menos del valor cuando mucho o menos en un epipedón úmbrico suprayacente (o en un subhorizonte del epipedón úmbrico) o en un epipedón ócrico o en un horizonte álbico.

### Vidrio Volcánico

El vidrio volcánico se define aquí como un vidrio translucido ópticamente isotrópico o pomez de cualquier color. Incluye vidrio, pomez, minerales cristalinos revestidos de vidrio, agregados vítreos y materiales vidriosos.

El vidrio volcánico es típicamente un componente dominante en tefras relativamente no intemperizadas. El intemperismo y la transformación mineral del vidrio volcánico pueden producir minerales de orden de rango corto, tales como alofano, imogolita y ferrihídrita.

El *contenido de vidrio volcánico* es el porcentaje (por conteo de granos) de vidrio, granos minerales revestidos de vidrio, agregados vítreos y materiales vidriosos en la fracción de 0.02 a 2.0 mm. Típicamente, el contenido está determinado por una fracción de un tamaño de partícula (es decir, limo grueso, arena muy fina y arena fina) y se usa como una estimación del contenido de vidrio de la fracción de 0.02 a 2.0 mm.

El contenido de vidrio volcánico es un criterio en la clasificación de las propiedades ándicas de suelo, subgrupos con el elemento formativo "vitr(i)" y familias con la clase sustituta de tamaño de partículas "ceniza" y la clase mineralógica vidriosa.

### Minerales Intemperizables

En esta taxonomía se hacen varias referencias a minerales intemperizables. Obviamente, la estabilidad de un mineral en el suelo es una función parcial del régimen de humedad del mismo. Cuando en las definiciones de horizontes de diagnóstico y en varios taxa, se hace referencia a minerales resistentes siempre se asume un clima húmedo, pasado o presente. Ejemplos de minerales que están incluidos en el significado de minerales intemperizables son: todos los filosilicatos 2:1, clorita, sepiolita, paligorskita, alofano, filosilicatos trioctahédricos 1:1 (serpentininas), feldespatos, feldespatoides, ferromagnesianos, vidrios, zeolitas, dolomitas y apatita, en la fracción de 0.02 a 2.0 mm.

Obviamente, esta definición de "minerales intemperizables" es restrictiva. La intención es incluir, en la definición de horizontes de diagnóstico y en varios taxa, solo aquellos minerales intemperizables que son inestables en un clima húmedo comparados con otros minerales, como el cuarzo y las arcillas con látices 1:1, que son más resistentes al intemperismo que la calcita. La calcita, agregados carbonatados, yeso y halita no se consideran minerales intemperizables porque son móviles en el suelo. Ellos pueden ser abundantes en suelos de otro modo fuertemente intemperizados.

### Características de Diagnóstico para Suelos Orgánicos

La siguiente es una descripción de las características que se usan solamente con suelos orgánicos.

### Clases de Materiales Orgánicos de Suelo

En esta taxonomía se distinguen tres diferentes clases de materiales orgánicos que se basan en el grado de descomposición de los materiales vegetales que se derivan. Las tres clases son: (1) Fábrico, (2) Hémico, y (3) Sáprico. Debido a la importancia del contenido de fibras en las definiciones de estos materiales, se define primero lo que se

entiende por fibras antes de las clases de materiales orgánicos de suelo.

### Fibras

Las Fibras son partes de los tejidos vegetales en los materiales orgánicos de suelo (excluyendo a las raíces vivas) que:

1. Son lo suficientemente grandes para ser retenidas sobre un tamiz de malla-100 (apertura de 0.15 mm de diámetro) cuando son cribados; y
2. Muestran evidencias de la estructura celular de las plantas de las cuales se derivan; y
3. Son de 2 cm o menos en su dimensión más pequeña, o están lo suficientemente descompuestas para ser molidas o desmenuzadas con los dedos.

Pedazos de madera mayores de 2 cm en su sección transversal y poco descompuestos que no pueden ser molidos y desmenuzados con los dedos, tales como, ramas grandes, troncos y tocones, no se les considera como fibras, pero sí como fragmentos orgánicos gruesos (comparables con las gravas, piedras y guijarros en los suelos minerales).

### Materiales Fábricos de Suelo

Los materiales fábricos de suelo son materiales orgánicos de suelo que:

1. Contienen tres cuartas partes o más (por volumen) de fibras después de molidos, excluyendo los fragmentos gruesos; o
2. Contienen dos quintas partes o más (por volumen) de fibras después de molidos, excluyendo los fragmentos gruesos, con colores de valores y chromas de 7/1, 7/2, 8/1, 8/2 o 8/3 (fig.2), sobre papel cromatográfico blanco o papel filtro, que se inserta dentro de la pasta hecha con los materiales del suelo en una solución de pirofosfato de sodio.

### Materiales Hémicos de Suelo

Los materiales hémicos de suelo (Gr. *hemi*, medio, implica una descomposición intermedia), son intermedios en su grado de descomposición entre los materiales fábricos menos descompuestos y los materiales sápricos más descompuestos. Sus rasgos morfológicos dan valores intermedios para el contenido de fibras, densidad aparente y contenido de agua. Los materiales hémicos de suelo están parcialmente alterados, tanto física como bioquímicamente.

### Materiales Sápricos de Suelo

Los materiales sápricos de suelo (Gr. *sapros*, podrido), son los de mayor grado de descomposición de las tres clases de materiales orgánicos de suelo. Tienen la cantidad más pequeña de fibras vegetales, la densidad aparente más alta y el menor contenido de agua a saturación en base a peso seco. Los materiales sápricos de suelos comúnmente son grises

muy oscuros a negros. Son relativamente estables, es decir, cambian muy poco física y químicamente con el tiempo en comparación con otros materiales orgánicos de suelo.

Los materiales sápricos tienen las siguientes características:

1. El contenido de fibra, después de ser molidos, es menor de un sexto (por volumen), excluyendo los fragmentos gruesos; y




Figura 2.- Value y chroma de la solución de pirofosfato de los materiales fibrícos y sápricos.

2. El color del extracto con pirofosfato de sodio sobre papel cromatográfico blanco o papel filtro está abajo o a la derecha de la línea dibujada que excluye a los cuadros 5/1, 6/2 y 7/3 (designaciones Munsell, fig. 2). Si no se detectan fibras o son muy pocas y el color del extracto con pirofosfato está a la izquierda o sobre esa línea, se puede considerar la posibilidad de que se trate de un material límnic.

### Material Humilúvico

El material humilúvico, es decir, humus iluvial, se acumula en las partes inferiores de algunos suelos orgánicos, que son ácidos y que han sido drenados y cultivados. Los materiales humilúvicos tienen una edad en  $C^{14}$  que no es

mayor a la de los materiales orgánicos suprayacentes. Tienen una alta solubilidad en pirofosfato de sodio y se rehúmedecen muy lentamente después de secarse; más comúnmente, se acumulan cerca de un contacto con un horizonte mineral arenoso.

Para reconocer al material humilúvico como una característica diferenciadora en clasificación, el material humilúvico deberá constituir la mitad o más (por volumen) de una capa de 2 cm o más de espesor.

### Materiales Límnicos

La presencia o ausencia de depósitos límnicos se considera en las categorías superiores de los Histosols, pero no de los Histels. La naturaleza de tales depósitos es considerada en las categorías inferiores de los Histosols. Los materiales límnicos incluyen tanto a materiales orgánicos como inorgánicos que fueron, ya sea: (1) depositados en agua por precipitación o a través de la acción de organismos acuáticos, tales como algas o diatomeas, o (2) derivados a partir de plantas bajo el agua y de plantas acuáticas flotantes y subsecuentemente modificadas por organismos acuáticos. Incluyen a la tierra coprogénica (turba sedimentaria), tierra de diatomeas y margas.

#### Tierra Coprogénica

Una capa de tierra coprogénica (turba sedimentaria) es una capa límnic que:

1. Contiene muchas bolitas fecales con diámetros entre unos centésimos y unos décimos de milímetro; y
2. Tiene un color del value, en húmedo, de 4 o menos; y
3. Forma con agua una suspensión ligeramente viscosa, que no es plástica o ligeramente plástica pero no pegajosa, o se contrae cuando se seca para formar terrones que son difíciles de rehúmedecer y con frecuencia tienden a agrietarse a lo largo de planos horizontales; y
4. Produce, en un extracto saturado de pirofosfato de sodio que sobre un papel cromatográfico blanco o un papel filtro, un value de 4 o más alto y un chroma de 2 o más bajo (fig. 2), o tiene una capacidad de intercambio catiónico menor de 240  $cmol(+)$  por kg de materia orgánica (medida por pérdida en ignición), o ambas.

#### Tierra de Diatomeas

Una capa de tierra de diatomeas es una capa límnic que:

1. Si no ha sido previamente secada, tiene una matriz con un color del value de 3, 4 o 5, el cual cambia irreversiblemente con el secado como resultado de la contracción irreversible de los revestimientos de materia orgánica sobre las diatomeas (identificables al microscopio a 440X, sobre muestras secas); y
2. Produce, en un extracto saturado de pirofosfato de sodio que sobre un papel cromatográfico blanco o un papel filtro tiene, un value de 8 o más alto y un chroma de 2 o menos, o tiene una capacidad de intercambio catiónico menor de 240

cmol(+) por kg de materia orgánica (por pérdida en ignición), o ambas.

### Marga

Una capa de marga es una capa límnic que:

1. Tiene un color del value, en húmedo, de 5 o más; y
2. Reacciona con HCl diluido y libera CO<sub>2</sub>.

Por lo general, la marga no cambia su color con el secado irreversible porque contiene muy poca materia orgánica, aún si antes se ha contraído por el secado, para cubrir las partículas de carbonato.

### Espesor de los Materiales Orgánicos de Suelo (Sección de Control de Histosols e Histels)

El espesor de los materiales orgánicos sobre materiales límnicos, materiales minerales, agua o permafrost se usa para definir a los Histosols e Histels.

Por razones prácticas, se ha establecido una sección de control arbitraria para la clasificación de Histosols e Histels. Dependiendo de las clases de materiales del suelo que se presentan en la capa superficial, la sección de control tiene un espesor que varía entre 130 cm a 160 cm de la superficie del suelo, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, una capa gruesa de agua o permafrost dentro de los límites respectivos. El espesor de la sección de control se usa si la capa superficial del suelo a la profundidad de 60 cm contiene tres cuartas partes o más de fibras derivadas de *Sphagnum*, *Hypnum* u otros musgos, o tiene una densidad aparente de menos de 0.1. Las capas de agua, que pueden ser de pocos centímetros a varios metros de espesor, se consideran como el límite inferior de la sección de control solamente si el agua se extiende debajo de una profundidad de 130 o 160 cm respectivamente. Un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero de 130 o 160 cm, constituyen el límite inferior de la sección de control. En algunos suelos el límite inferior de la sección de control está a 25 cm abajo del límite superior del permafrost. Un substrato mineral no consolidado más somero de esos límites no cambia el límite inferior de la sección de control.

La sección de control ha sido dividida arbitrariamente en tres franjas: superficial, subsuperficial e inferior.

### Franja Superficial

La franja superficial de un Histosol o Histel se extiende desde la superficie del suelo hasta 60 cm de profundidad, si: (1) los materiales dentro de esa profundidad son fibricos y tres cuartas partes o más del volumen de las fibras se derivan de *Sphagnum* u otros musgos, o (2) los materiales tienen una densidad aparente menor de 0.1; de otra manera, la franja superficial se extiende a la profundidad de 30 cm.

En algunos suelos orgánicos, se presenta una capa mineral en la superficie con un espesor inferior de 40 cm, como resultado de inundaciones, erupciones volcánicas, adiciones de materiales minerales para aumentar la dureza del suelo o para reducir el riesgo a las heladas o por otras causas.

Si tal capa mineral es menor de 30 cm de espesor, constituye la parte superior de la franja superficial, si es de 30 a 40 cm de espesor, constituye toda la franja superficial y parte de la franja subsuperficial.

### Franja Subsuperficial

La franja subsuperficial es normalmente de un espesor de 60 cm. Sin embargo, si la sección de control termina a una profundidad menor (en un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa de agua o en permafrost), la franja subsuperficial se extiende desde el límite inferior de la franja superficial hasta el límite inferior de la sección de control. Incluyen cualquier capa mineral no consolidada que pueda estar presente dentro de esas profundidades.

### Franja Inferior

La franja inferior es de un espesor de 40 cm a menos que la sección de control tenga su límite inferior a una menor profundidad (en un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa de agua o en permafrost)

Así, si los materiales orgánicos son espesos, existen dos posibles espesores de la sección de control, dependiendo de la presencia o ausencia y el espesor de un musgo fibrico u otro material orgánico que tenga una densidad aparente baja (menor a 0.1). Si el musgo fibrico se extiende a una profundidad de 60 cm y es el material dominante dentro de esa profundidad (tres cuartas partes o más del volumen), la sección de control será de 160 cm de espesor. Si los musgos fibricos están ausentes o son muy delgados, la sección de control se extenderá hasta la profundidad de 130 cm.

### Horizontes y Características de Diagnóstico tanto para Suelos Minerales como para Suelos Orgánicos

Las siguientes son descripciones de horizontes y características que son de diagnóstico tanto para suelos minerales como orgánicos.

### Condiciones Ácicas

Los suelos con condiciones ácidas (*L. aqua*, agua) son aquellos que actualmente presentan una saturación y reducción continua o periódica. La presencia de tales condiciones es indicada por rasgos redoximórficos, excepto en los Histosols e Histels y pueden verificarse, por la medición de la saturación y la reducción, excepto en suelos drenados artificialmente. El drenaje artificial se define aquí como la remoción del agua libre de suelos que tienen condiciones ácidas por bordos superficiales, diques, o baldosas subsuperficiales para provocar que el nivel freático del agua cambie significativamente en relación con tipos específicos de uso de la tierra. En las claves, los suelos artificialmente drenados se incluyen dentro de los suelos que tienen condiciones ácidas.

Elementos de condiciones ácidas son los siguientes:

1. Saturación caracterizada por una presión de cero o positiva en el agua del suelo y puede ser determinada, en

general, observando el agua libre en un hoyo de barrena no alineado. Sin embargo, pueden surgir problemas en suelos arcillosos agregados, donde el hoyo de la barrena no alineado puede llenarse con agua que fluye a lo largo de las caras de los agregados mientras que la matriz del suelo está y permanece no saturada (flujo de paso). Tal agua libre puede sugerir incorrectamente la presencia de un nivel de agua, aunque el verdadero nivel de agua se encuentre a una mayor profundidad. Por lo que se recomienda el uso de piezómetros o tensiómetros bien sellados para medir la saturación. Sin embargo y a pesar de ello, se pueden presentar problemas, si el agua corre dentro de los cortes del piezómetro cerca de la parte inferior del hoyo del piezómetro o si se usan tensiómetros con manómetros que reaccionan lentamente. El primer problema puede ser resuelto por el uso de piezómetros con cortes muy pequeños y el segundo, por el uso de tensiometría transductora, los cuales reaccionan más rápidamente que los manómetros. Los suelos se consideran mojados, si tienen una presión principal mayor a -1 kPa. Solamente los macroporos tales como las grietas, los agregados o los canales están llenos de aire y la matriz del suelo está usualmente saturada. Obviamente, la medición exacta del estado de humedecimiento se puede obtener sólo con tensiómetros. Para propósitos operacionales, el uso de piezómetros se recomienda como un método estándar.

La duración de la saturación que se requiere para crear condiciones ácuicas es variable, depende del ambiente del suelo y no está especificado.

Se han definido tres tipos de saturación:

- a. *Endosaturación.*--El suelo está saturado con agua en todas las capas a partir del límite superior de saturación hasta una profundidad de 200 cm o más de la superficie del suelo mineral.
- b. *Episaturación.*--El suelo está saturado con agua en una o más capas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral y también tiene una o más capas no saturadas, con un límite superior arriba de los 200 cm de profundidad, y por abajo de la capa saturada, es decir, el nivel freático está localizado sobre una capa relativamente impermeable.
- c. *Saturación Antrica.*--Este término se refiere a un tipo especial de condiciones ácuicas que ocurren en suelos que están cultivados e irrigados (riego por inundación). Los suelos con condiciones antrácuicas deberán cumplir los requisitos para condiciones ácuicas y en adición tienen *ambas* de las siguientes:

(1) Una capa superficial cultivada e inmediatamente subyace una capa con permeabilidad lenta que tiene, para 3 meses o más en años normales, *ambas*:

- (a) Saturación y reducción; y
- (b) Un chroma en la matriz de 2 o menos; y

(2) Un horizonte subsuperficial con *una o ambas* de las siguientes:

- (a) Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos en macroporos; o
- (b) Concentraciones redox de hierro; o
- (c) 2 veces o más cantidad de hierro (por ditionito citrato) que la contenida en la capa superficial cultivada.

2. El grado de reducción en un suelo se puede caracterizar por la medición directa de los potenciales redox. Las mediciones directas deberán tomar en cuenta los equilibrios químicos como se expresan en los diagramas de estabilidad en los libros de texto de suelos. Los procesos de oxidación y reducción también son una función del pH del suelo. Medidas exactas del grado de reducción en los suelos son difíciles de obtener. En el contexto de esta taxonomía, sin embargo, se considera solamente el grado de reducción que resulte del hierro reducido, ya que produce rasgos visibles redoximórficos que se identifican en las claves. Se dispone de una prueba de campo simple para determinar si se presentan iones de hierro reducido. Una muestra fresca de suelo saturada en condiciones de campo es quebrada y sobre una de las superficies recientemente expuesta se le aplica una solución de dipiridil- alfa, alfa neutral, con acetato de amonio 1-normal. El surgimiento de un color rojo intenso sobre la superficie recientemente expuesta, indica la presencia de iones de hierro reducidos. Una reacción positiva a la prueba de campo para hierro ferroso con dipiridil-alfa, alfa (Childs, 1981), se puede usar para confirmar la existencia de condiciones de reducción y es especialmente útil en situaciones en donde, a pesar de la saturación, los indicadores morfológicos normales de tales condiciones estén ausentes o enmascarados (como por los colores oscuros característicos de los grandes grupos melánicos). Una reacción negativa, no implica sin embargo, que las condiciones de reducción estén siempre ausentes. Lo anterior puede significar que el nivel de hierro libre en el suelo este por abajo del límite de la sensibilidad de la prueba o que el suelo esté en una fase de oxidación en el momento de la prueba. El uso del dipiridil-alfa, alfa en una solución de ácido acético al 10 por ciento, no se recomienda porque es común que el ácido cambie las condiciones del suelo; por ejemplo, puede disolver al  $\text{CaCO}_3$ .

No se ha especificado aún la duración requerida de reducción para crear las condiciones ácuicas.

3. Los rasgos redoximórficos asociados con el humedecimiento, resultan de períodos alternos de reducción y oxidación de los compuestos de hierro y manganeso en el suelo. La reducción ocurre durante la saturación con agua y la oxidación cuando el suelo no esta saturado. Los iones de hierro y manganeso en forma reducida son móviles y se pueden transportar por el agua, que es la forma como se mueven en el suelo. Ciertos patrones redox ocurren como una función de los patrones de acarreo por el agua de los iones a través del suelo y como una función de la localización de las zonas aireadas del suelo. Los patrones redox también están afectados por el hecho de que el ión manganeso se reduce

más rápidamente que el Hierro; mientras que el hierro se oxida más rápidamente al airearse. Estos procesos originan patrones de colores característicos. Los iones reducidos de hierro y manganeso se pueden remover de los suelos, si ocurren flujos de agua verticales o laterales; en tales casos no existe precipitación de hierro y manganeso en esos suelos. Cuando el hierro y el manganeso están oxidados y precipitados, formarán masas suaves o concreciones duras o nódulos. El movimiento del hierro y manganeso como resultado de procesos redox en un suelo puede originar rasgos redoximórficos que se definen a continuación:

a. *Concentraciones redox.*--Son zonas de acumulación aparente de óxidos de Fe-Mn, que incluyen:

- (1) Nódulos y concreciones, que son cuerpos cementados que pueden removerse en forma intacta del suelo. Las concreciones se distinguen de los nódulos con base en su organización interna. Una concreción típicamente tiene capas concéntricas visibles a simple vista. Es común que los nódulos no tengan una estructura con organización interna visible. Los límites son difusos si se forman *in situ* y son abruptos después de la pedoturbación. Los límites abruptos pueden ser rasgos de relictos en algunos suelos; y
- (2) Masas que son concentraciones de sustancias no cementadas dentro de la matriz; y
- (3) Revestimientos de poros, es decir, zonas de acumulación a lo largo de los poros que pueden estar revistiendo a las superficies o impregnando a la matriz adyacente a los poros.

b. *Empobrecimientos redox.*--Son zonas de bajo chroma (chromas menores a los de la matriz) donde los óxidos de Fe-Mn solos o en combinación con la arcilla han sido eliminados incluyendo:

- (1) Empobrecimientos de hierro, es decir, zonas con bajos contenidos de óxidos de Fe y Mn, pero tienen un contenido de arcilla similar al de la matriz adyacente (con frecuencia son referidos como albanes o neoalbanes); y
- (2) Empobrecimientos de arcilla, es decir, zonas que contienen bajas cantidades de Fe, Mn, y arcilla (con frecuencia son referidos: como revestimientos o esqueletanes de limo).

c. *Matriz reducida.*--Esta es una matriz de suelo que tiene bajo chroma *in situ*, pero que al menos cambia en el hue o en el chroma dentro de los primeros 30 minutos después de que ha sido expuesto el material del suelo al aire.

d. En suelos que no tienen rasgos redoximórficos visibles, pero la reacción a la solución dipiridil- alfa, alfa satisface los requisitos de rasgos redoximórficos.

La experiencia de campo indica que no es posible definir un conjunto específico de rasgos redoximórficos que sean la única característica de todo el taxa en una categoría

particular. Por lo tanto, los patrones de colores que sean únicos para taxa específicos se mencionan en las claves.

Las condiciones antrópicas son una variante de la episaturación y están asociadas con inundaciones controladas (para cultivos tales como el arroz y el arándano agrio), las cuales causan procesos de reducción en la parte saturada, en la superficie encharcada del suelo y oxidación de las formas reducidas de hierro y manganeso y su movilización del subsuelo no saturado.

### **Crioturbación**

La crioturbación (esmerilado con frío) es el mezclado de la matriz del suelo dentro del pedón que da por resultado horizontes irregulares o interrumpidos, involuciones, acumulaciones de materia orgánica sobre el permafrost, fragmentos de roca orientados y limos cubiertos sobre fragmentos de roca.

### **Contacto Dénstico**

Un contacto dénstico (*L. densus*, grueso) es un contacto entre el suelo y materiales dénsticos (definidos posteriormente). No tiene grietas o el espaciamiento entre las grietas en las que las raíces pueden penetrar es de 10 cm o más.

### **Materiales Dénsticos**

Los materiales dénsticos son materiales relativamente no alterados (no reúnen los requisitos de ningún horizonte de diagnóstico nominado o cualquier otra característica de diagnóstico del suelo), con una clase de resistencia a la ruptura no cementada. La densidad aparente o su organización es tal que las raíces no pueden penetrar, excepto por las grietas.

Existen principalmente materiales terrestres, como si estuvieran labrados de flujos de lodo volcánico y algunos materiales compactados mecánicamente, por ejemplo en los cortes de minas. Algunas rocas no cementadas pueden ser materiales dénsticos si son lo suficientemente densos o resistentes para no permitir que las raíces penetren, excepto por las grietas.

Los materiales dénsticos no están cementados y así difieren de los materiales paralíticos y de los materiales que se ubican debajo de un contacto lítico, que están cementados.

Los materiales dénsticos tienen, en su límite superior, un contacto dénstico si no tienen grietas o el espaciamiento entre grietas por las que las raíces penetran es de 10 cm o más. Estos materiales pueden ser usados para la diferenciación de series de suelos, si los materiales están dentro de la sección de control de las series.

### **Materiales Gélicos**

Los materiales gélicos son materiales minerales u orgánicos del suelo que muestran evidencias de crioturbación (esmerilado con frío) y/o segregación de hielo en la capa activa (capa de deshielo estacional) y/o la parte superior del permafrost. La crioturbación se manifiesta por horizontes

irregulares e interrumpidos, involuciones, acumulación de materia orgánica sobre la superficie y dentro del permafrost, fragmentos de roca orientados y capas de limo-enriquecido. Las estructuras características asociadas con materiales gélidos incluyen a las macroestructuras: laminar, blocosa o granular; resultados estructurales de todo tipo; y fabricas orbiculares, conglomeradas, bandeadas o vesiculares. La segregación por hielo se manifiesta por la presencia de lentes de hielo, venas de hielo, cristales segregados de hielo y cuñas de hielo. Los procesos criopedogenéticos que les ocurren a los materiales gélidos están dirigidos por los cambios físicos de volumen al convertirse el agua en hielo, por la migración de la humedad a lo largo de gradientes térmicos en el sistema de congelamiento o por las contracciones térmicas del material congelado por un enfriamiento rápido y continuo.

### Capa Glácica

Una capa glácica es hielo masivo o hielo basal en forma de lentes o cuñas de hielo. La capa tiene un espesor de 30 cm o más y contiene 75 por ciento o más de hielo visible.

### Contacto Lítico

Un contacto lítico es un límite entre el suelo y un material subyacente coherente. Excepto en los subgrupos Ruptic-Lithic, el material subyacente deberá ser virtualmente continuo dentro de los límites de un pedón. Las grietas que pueden ser penetradas por las raíces son pocas y su espaciamiento horizontal deberá ser de 10 cm o más. El material subyacente debe ser lo suficientemente coherente, en húmedo, para que sea impracticable excavarlo manualmente con una pala, aunque el material puede ser astillado o raspado con la pala. El material que está abajo del contacto lítico deberá tener una clase de resistencia a la ruptura de fuertemente cementado o extremadamente cementado. Es común que, el material este endurecido. El material subyacente considerado aquí, no incluye a horizontes de diagnóstico de suelos, tales como un duripán o un horizonte petrocálcico.

Un contacto lítico es un diagnóstico a nivel de subgrupo si se encuentra dentro de los 125 cm de la superficie en los Oxisols y dentro de los 50 cm superficiales de los otros suelos minerales. En suelos orgánicos el contacto lítico deberá estar dentro de la sección de control para ser reconocido a nivel de subgrupo.

### Contacto Paralítico

Un contacto paralítico (parecido a lítico) es un contacto entre el suelo y materiales paralíticos (definidos posteriormente) donde los materiales paralíticos no tienen grietas o el espaciamiento entre grietas donde pueden penetrar raíces es de 10 cm o más.

### Materiales Paralíticos

Los materiales paralíticos son materiales relativamente inalterados (no reúnen los requisitos para cualquier otro horizonte de diagnóstico nombrado o alguna de las otras

características de diagnóstico del suelo), con una clase de resistencia a la ruptura de débil a moderadamente cementados. La cementación, densidad aparente y organización, son tales que las raíces no pueden penetrar excepto por las grietas. Los materiales paralíticos tienen, en su límite superior, un contacto paralítico, si no tienen grietas o si el espaciamiento entre grietas por las que las raíces penetran es 10 cm o más. Es común que, estos materiales sean lechos rocosos parcialmente intemperizados o lechos rocosos débilmente consolidados, tales como areniscas, pizarras o esquistos. Los materiales paralíticos se pueden usar en la diferenciación de series de suelos, si los materiales están dentro de la sección de control de las series. Los fragmentos de materiales paralíticos de 2.0 mm o más de diámetro están referidos como fragmentos de para-rocas.

### Permafrost

El permafrost está definido como una condición térmica en la cual un material (incluyendo material del suelo) se mantiene por debajo de 0 °C por 2 o más años en sucesión. Aquellos materiales gélidos que tienen permafrost contienen una solución del suelo no congelada que conduce a los procesos criopedogenéticos. El permafrost puede estar cementado por hielo o en el caso de agua intersticial insuficiente, puede estar seco. La capa congelada tiene una variedad de lentes de hielo, venas de hielo, cristales de hielo segregados y cuñas de hielo. El nivel del permafrost está en equilibrio dinámico con el ambiente.

### Regímenes de Humedad del Suelo

El término “régimen de humedad del suelo”, se refiere a la presencia o ausencia, ya sea de un manto freático o al agua retenida a una tensión menor de 1500 kPa en el suelo o en horizontes específicos por períodos del año. El agua retenida a una tensión de 1500 kPa o mayor no está disponible para la mayoría de las plantas mesófilas vivas. La disponibilidad del agua está también afectada por las sales disueltas. Si un suelo está saturado con agua demasiado salina para ser aprovechable por la mayoría de las plantas, se deberá considerar como suelo salino más que seco. En consecuencia, se considera un horizonte seco cuando la tensión de humedad es de 1500 kPa o más y como húmedo si el agua está retenida a una tensión menor a 1500 kPa pero mayor que cero. Un suelo puede estar continuamente húmedo en alguno o en todos los horizontes a través del año o en alguna época del año. Puede estar húmedo en invierno y seco en verano o al revés. En el Hemisferio Norte, el verano se refiere a los meses de Junio, Julio y Agosto y el invierno a Diciembre, Enero y Febrero.

### Años Normales

En la discusión que sigue y a través de las claves se emplea el término “años normales”. Un año normal se define como un año que tiene más o menos una desviación estandar de la precipitación promedio anual de una estadística de larga duración (larga duración se refiere a 30 años o más). También la precipitación media mensual durante un año normal,

deberá ser más o menos una desviación estandar de la precipitación a largo plazo, para 8 de los 12 meses. Para la mayoría de los sitios, los años normales pueden ser calculados a partir de la precipitación anual. Cuando ocurren eventos catastróficos durante un año, la desviación estandar de las medias mensuales también se deberá calcular. El término “años normales” reemplaza a los términos “mayoría de los años” o “6 de cada 10 años”, los cuales fueron usados en la edición de 1975 de la Taxonomía de Suelos (USDA, SCS, 1975).

### Sección de Control de Humedad del Suelo

El intento de definir la sección de control de humedad del suelo es con el fin de facilitar la estimación de los regímenes de humedad de los suelos a partir de datos climáticos. El límite superior de esta sección de control es la profundidad a la cual un suelo seco (tensión mayor de 1500 kPa, pero no seco al aire) será humedecido por 2.5 cm de agua en 24 horas. El límite inferior es la profundidad a la cual un suelo seco será humedecido por 7.5 cm de agua en 48 horas. Estas profundidades excluyen al humedecimiento que se produzca a lo largo de grietas o madrigueras de animales abiertas hasta la superficie.

Si 7.5 cm de agua humedecen el suelo hasta un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico o a un horizonte petrocálcico o petrogypico o duripán, el contacto o el límite superior del horizonte cementado es el límite inferior de la sección de control de la humedad del suelo. Si 2.5 cm de agua humedecen al suelo hasta uno de esos contactos u horizontes, la sección de control de la humedad del suelo es el límite o el propio contacto. En este caso la sección de control del suelo está mojada, si el contacto o el límite superior del horizonte cementado tiene una delgada capa de agua. Si el límite superior está seco, la sección de control se considera seca. La sección de control se encuentra aproximadamente: (1) entre 10 y 30 cm debajo de la superficie del suelo, si la clase de tamaño de partícula es francosa-fina, limosa-gruesa, limosa-fina o arcillosa; (2) entre 20 y 60 cm, si la clase de tamaño de partícula es francosa-gruesa; y (3) entre 30 a 90 cm, si la clase de tamaño de partícula es arenosa.

Si el suelo contiene fragmentos de rocas o para-rocas que no absorben ni liberan agua, los límites de la sección de control de humedad son más profundos. Los límites de la sección de control de humedad están afectados no sólo por la clase de tamaño de partícula sino también por diferencias en la estructura del suelo o la distribución del tamaño de poros o por otros factores que influyen sobre el movimiento y retención de agua en el suelo.

### Clases de Regímenes de Humedad del Suelo

Los regímenes de humedad del suelo están definidos en términos del nivel del manto freático y por la presencia o ausencia de agua retenida a una tensión menor de 1500 kPa en la sección de control de la humedad. Se asume, en las definiciones, que el suelo soporta cualquier tipo de vegetación o es capaz de soportarlo, es decir, pueden ser cultivos, pastos o vegetación nativa, pero no se riega ni barbecha para incrementar la cantidad de humedad

almacenada. Estas prácticas culturales afectan las condiciones de humedad del suelo tanto como sea su duración.

**Régimen de humedad ácuico.**--El régimen de humedad ácuico (*L. aqua*, agua) es un régimen de reducción en un suelo que está virtualmente libre de oxígeno disuelto porque está saturado con agua. Algunos suelos están saturados con agua pero hay oxígeno disuelto debido a que el agua está en movimiento o porque el medio cuando no es favorable para los microorganismos (por ejemplo: si la temperatura es menor de 1 °C); tal régimen no se considera ácuico.

No se conoce qué duración de la saturación de un suelo es la necesaria para tener un régimen de humedad ácuico, pero la duración deberá ser al menos de unos pocos días, porque está implícito en el concepto que el oxígeno está virtualmente ausente. Debido a que el oxígeno disuelto es removido del nivel freático por la respiración de los microorganismos, raíces y fauna del suelo, también está implícito en el concepto que la temperatura del suelo está arriba del cero biológico por algún tiempo mientras el suelo esté saturado. El cero biológico en esta taxonomía se define como 5 °C. En algunas regiones del mundo más frías, ocurre actividad biológica aún a temperaturas más bajas de 5 °C.

Es muy común que el nivel del manto freático fluctúe con las estaciones. El nivel está más alto en la estación lluviosa o en el otoño, invierno o primavera, si el tiempo frío virtualmente detiene la evapotranspiración. Existen suelos; sin embargo, en los cuales el nivel freático está siempre en o muy cerca de la superficie. Ejemplos son los pantanos y depresiones cerradas alimentadas por corrientes perennes. El régimen de humedad de esos suelos se denomina perácuico.

**Regímenes de humedad árido y tórrido (*L. aridus*, seco y *L. torridus* caliente y seco).**--Estos términos se usan para el mismo régimen de humedad, pero en diferentes categorías de la taxonomía.

En el régimen de humedad árido (tórrido), la sección de control de humedad está en años normales:

1. Seca en todas partes por más de la mitad de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm de la superficie del suelo es superior de 5 °C; y
2. Húmeda en alguna o en todas sus partes por menos de 90 días consecutivos cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm es mayor de 8 °C.

Los suelos que tienen un régimen de humedad árido (tórrido) están normalmente en climas áridos. Unos pocos están en climas semiáridos ya sea porque tengan propiedades físicas que los mantienen secos, tales como los que presentan una costra superficial que virtualmente impide la infiltración del agua o porque están sobre pendientes muy pronunciadas donde la escorrentía es muy alta. Existe poca o ninguna lixiviación en este régimen de humedad y las sales solubles se acumulan en estos suelos, si existe una fuente de ellas.

Los límites de la temperatura del suelo excluyen a estos regímenes de las regiones muy frías y polares secas, así como de las grandes elevaciones. Se considera que tales suelos presentan condiciones anhídras (definidas anteriormente).

**Régimen de humedad údico.**--El régimen de humedad údico (*L. udus*, húmedo) es uno en el cual la sección de control de humedad no está seca en alguna parte por un período tan largo como 90 días acumulativos en años normales. Si la temperatura media anual del suelo es menor que 22 °C y si la temperatura media de invierno y la media de verano del suelo a una profundidad a 50 cm difieren por 6 °C o más, la sección de control de humedad está seca en todas partes por menos de 45 días consecutivos en los 4 meses que siguen al solsticio de verano. Además, el régimen de humedad údico requiere, excepto en períodos cortos, un sistema de tres fases, sólido-líquido-gaseoso, en parte o en toda la sección de control de humedad del suelo cuando la temperatura del suelo es superior de 5 °C.

El régimen de humedad údico es común en los suelos de climas húmedos que tienen una precipitación bien distribuida; tienen suficiente lluvia en verano, para que la cantidad de agua almacenada más la lluvia sea aproximadamente igual o exceda a la cantidad de evapotranspiración o tenga suficiente agua en invierno para recargar a los suelos y enfriarlos, y veranos nublados, como en las áreas costeras. El agua se mueve hacia abajo a través del suelo en algún tiempo en los años normales.

En climas en donde la precipitación excede a la evapotranspiración en todos los meses, en años normales, la tensión de humedad rara vez es mayor de 100 kPa en la sección de control de humedad, aunque hay períodos breves en los cuales se usa algo de la humedad almacenada. El agua se mueve a través del suelo en todos los meses en los que no está congelado. Este régimen cuando es extremadamente húmedo se le llama *perúdic* (*L. per*, a través del tiempo, y *L. udus*, húmedo). El elemento formativo “ud” se usa en los nombres de la mayoría de las taxa para indicar un régimen údico o Perúdic. El elemento formativo “per” se usa en taxa selectas.

**Régimen de humedad ústico.**--El régimen de humedad ústico (*L. ustus*, quemado, implicando sequedad) es intermedio entre el régimen arídico y el údico. Este concepto implica un régimen de humedad que está limitado, pero esa humedad está presente cuando existen condiciones favorables para el crecimiento de las plantas. El concepto de régimen de humedad ústico no se aplica a suelos que tienen permafrost (definidos anteriormente).

Si la temperatura media anual del suelo es de 22 °C o mayor o si la temperatura media del suelo de invierno y de verano difieren por menos de 6 °C a la profundidad de 50 cm, la sección de control en áreas del régimen ústico está seca, en alguna o en todas partes por 90 días o más acumulativos en años normales. Sin embargo, está húmeda en alguna parte por más de 180 días acumulativos por año o por 90 días o más consecutivos.

Si la temperatura media anual del suelo es menor de 22 °C y si la temperatura media del suelo del verano y del invierno difieren en 6 °C o más a la profundidad de 50 cm, la sección de control de la humedad del suelo en áreas del régimen ústico está seca en alguna o en todas partes por 90 días o más acumulativos en años normales, pero no está seca en todas partes por más de la mitad de los días acumulativos cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm

es mayor de 5 °C. Si la sección de control, en años normales, está húmeda en todas partes por 45 días o más consecutivos en los 4 meses siguientes al solsticio de invierno, la sección de control de la humedad está seca en todas partes por menos de 45 días consecutivos en los 4 meses que siguen al solsticio de verano.

En regiones tropicales y subtropicales que tienen un clima monzónico con una o dos estaciones secas, el verano y el invierno son poco significativos. En esas regiones el régimen de humedad es ústico, si tiene al menos una estación lluviosa de 3 meses o más. En regiones templadas de climas subhúmedos o semiáridos, las estaciones lluviosas son usualmente en primavera y en verano o en primavera y en otoño pero nunca en invierno. Las plantas nativas son en su mayoría anuales o tienen un período de dormancia mientras el suelo está seco.

**Régimen de humedad xérico.**--El régimen de humedad xérico (*Gr. xeros*, seco) es el régimen de humedad que tipifica a las áreas con climas mediterráneos, donde los inviernos son húmedos y frescos y los veranos son cálidos y secos. La humedad, que se produce en el invierno cuando la evapotranspiración potencial es mínima, es particularmente efectiva para la lixiviación. En un régimen de humedad xérico la sección de control de humedad en años normales está seca en todas partes por 45 días o más consecutivos en los 4 meses siguientes al solsticio de invierno. También en años normales, la sección de control de humedad está húmeda en alguna parte por más de la mitad de los días acumulativos por año, en los que la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm es mayor de 5 °C, o por 90 días o más consecutivos cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm es mayor de 8 °C. La temperatura media anual del suelo es menor de 22 °C, y las temperaturas medias del suelo del verano y del invierno difieren en 6 °C o más, a 50 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más superficial.

## Regímenes de Temperatura del Suelo

### Clases de Regímenes de Temperatura del Suelo

Lo siguiente es una descripción de los regímenes de temperatura del suelo que son usados para definir clases a varios niveles categóricos en esta taxonomía.

**Crylco (Gr. *Kryos*, frío; significa suelos muy fríos).**-- Los suelos en este régimen tienen una temperatura media anual menor de 8 °C, pero no tienen permafrost.

1. En suelos minerales, la temperatura media del suelo en verano (Junio, Julio y Agosto en el Hemisferio Norte y Diciembre, Enero y Febrero en el Hemisferio Sur) a 50 cm de profundidad o en un contacto dénsico, lítico o paralítico, lo que sea más superficial, es como sigue:

- a. Si el suelo no está saturado con agua durante alguna parte del verano y
  - (1) No tiene horizonte O, menor de 15 °C; *o*
  - (2) Tiene horizonte O, menor de 8 °C; *o*

b. Si el suelo está saturado con agua durante alguna parte del verano y

- (1) No tiene horizonte O, menor de 13 °C;
- (2) Tiene un horizonte O ó un epipedón hístico, menor de 6 °C.

2. En suelos orgánicos, la temperatura media anual del suelo es menor de 6 °C.

Los suelos cryicos que tienen un régimen de humedad ácuico comúnmente están mezclados por congelamiento.

Suelos isofrígidos pueden tener también un régimen de temperatura cryico. Unos pocos con materiales orgánicos en la parte superior son excepciones.

Los conceptos de los regímenes de temperatura del suelo que se describen a continuación se usan en las definiciones de clases de suelos en las categorías inferiores.

**Frígido.**--Un suelo con régimen frígido es más cálido en verano que un suelo con régimen cryico, pero su temperatura media anual es menor de 8 °C y la diferencia entre la temperatura media del suelo en verano y en invierno es mayor de 6 °C, a 50 cm de profundidad, o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más superficial.

**Mésico.**--La temperatura media anual del suelo es igual o mayor de 8 °C, pero menor de 15 °C, y la diferencia entre la temperatura media del suelo en verano y en invierno es mayor de 6 °C, a 50 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, lo que esté más superficial.

**Térmico.**--La temperatura media anual del suelo es igual o mayor a 15 °C pero menor de 22 °C y la diferencia entre la temperatura media del suelo del verano y del invierno es mayor de 6 °C, a 50 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, lo que este más superficial.

**Hipertérmico.**--La temperatura media anual del suelo es igual o mayor de 22 °C y la diferencia entre la temperatura media del suelo del verano y del invierno es mayor de 6 °C a 50 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, lo que esté más superficial.

Si el nombre de un régimen de temperatura del suelo tiene el prefijo *iso*, la temperatura media del verano y la media del invierno difieren en menos de 6 °C a 50 cm de profundidad o hasta un contacto dénsico, lítico o paralítico, lo que esté más superficial.

**Isofrígido.**--La temperatura media anual del suelo es menor de 8 °C.

**Isomésico.**--La temperatura media anual del suelo es igual o mayor de 8 °C, pero menor de 15 °C.

**Isotérmico.**--La temperatura media anual del suelo es igual o mayor de 15 °C, pero menor de 22 °C.

**Isohipertérmico.**--La temperatura media anual del suelo es 22 °C o mayor.

## Materiales Sulfídicos

Los materiales sulfídicos contienen compuestos de azufre oxidables. Son materiales orgánicos o minerales de suelo, con un valor de pH mayor de 3.5, y los cuales, si se incuban como una capa de 1 cm de espesor bajo condiciones aeróbicas húmedas (capacidad de campo) a temperatura ambiente,

muestran una disminución en el pH de 0.5 o más unidades a un pH de 4 o menos (relación 1:1 por peso en agua o con un mínimo de agua para permitir la medición) dentro de un tiempo de 8 semanas.

Los materiales sulfídicos se acumulan como un suelo o un sedimento que está permanentemente saturado, generalmente con aguas salobres. Los sulfatos en agua se reducen biológicamente a sulfitos como materiales acumulados. Los materiales sulfídicos son más comunes en pantanos costeros cercanos a las desembocaduras de ríos que acarrearán sedimentos no calcáreos, pero pueden ocurrir en pantanos de agua dulce si existen sulfuros en el agua. Los materiales sulfídicos en mesetas se pueden haber acumulado en el pasado geológico en forma similar.

Si un suelo que contiene materiales sulfídicos se drena o si los materiales sulfídicos son expuestos a condiciones aeróbicas, los sulfuros se oxidan y forman ácido sulfúrico. El valor del pH, normalmente cercano a la neutralidad antes de drenarse o exponerse, puede disminuir por abajo de 3. El ácido puede inducir a la formación de sulfatos de hierro y de aluminio. El sulfato de hierro, jarosita, se segrega y forma motas amarillo-brillantes que caracterizan al horizonte sulfúrico. La transición de los materiales sulfídicos al horizonte sulfúrico normalmente requiere de muy pocos años y puede ocurrir, más aún, en pocas semanas. Si una muestra de materiales sulfídicos se seca lentamente al aire bajo sombra por cerca de dos meses, con rehumedecimiento ocasional, se volverá extremadamente ácida.

## Horizonte Sulfúrico

### Características Requeridas

El horizonte sulfúrico (*L. sulfur*, azufre) tiene un espesor de 15 cm o más y está compuesto por materiales minerales u orgánicos de suelo que tienen un pH de 3.5 o menos (1:1 por peso en agua o en un mínimo de agua para permitir la medida) y muestra evidencias de que el pH bajo es causado por el ácido sulfúrico. Las evidencias son *una o más* de las siguientes:

1. El horizonte tiene:
  - a. Concentraciones de jarosita, schwertmanita y otros sulfatos de hierro, hidróxisulfatos y azufre elemental; *o*
  - b. Concentraciones con colores en la escala Munsell de hue, de 2.5Y o 5Y y chroma de 6 o más, en húmedo; *o*
  - c. 0.05 por ciento o más de sulfato soluble en agua; *o*
2. La capa que subyace directamente al horizonte consiste de materiales sulfídicos (definidos anteriormente).

## Literatura Citada

- Brewer, R. 1976. Fabric and Mineral Analysis of Soils. Second edition. John Wiley and Sons, Inc. New York.
- Burt, R., ed. 2004. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report 42, Version 4.0. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center.

Childs, C. W. 1981. Field Test for Ferrous Iron and Ferric-Organic Complexes (on Exchange Sites or in Water-Soluble Forms) in Soils. *Austr. J. of Soil Res.* 19: 175-180.

Pons, L. J. and I. S. Zonneveld. 1965. Soil Ripening and Soil Classification. Initial Soil Formation in Alluvial Deposits and a Classification of the Resulting Soils. *Int. Inst. Land Reclam. And Impr. Pub.* 13. Wageningen, The Netherlands.

United States Department of Agriculture, Soil Conservation Service. 1975. *Soil Taxonomy: A Basic System of Soil Classification for Making and Interpreting Soil Surveys.* Soil Surv. Staff. U. S. Dep. Agric. Handb. 436.

United States Department of Agriculture, Soil Conservation Service. 1993. *Soil Survey Manual.* Soil Surv. Div. Staff. U. S. Dep. Agric. Handb. 18.

## CAPÍTULO 4

### *Identificación de la Clase Taxonómica de un Suelo*

La clase taxonómica específica de un suelo puede ser determinada por el uso de las claves que se presentan en este y en otros capítulos. Se asume que el lector está familiarizado con las definiciones de los horizontes de diagnóstico y las propiedades de diagnóstico que están dadas en los capítulos 2 y 3 de esta publicación y con el significado de los términos usados para describir a los suelos tratados en el *Soil Survey Manual*. En el índice, al final de esta publicación, se indican las páginas donde se presentan las definiciones.

Para los valores numéricos se usaron las convenciones estándar de redondeo.

Los colores del suelo (como hue, value y chroma) se usan en muchos de los criterios que siguen. Los colores del suelo, dependiendo del contenido del agua, típicamente cambian de value, y algunos de hue y de chroma. En muchos criterios de las claves el contenido del agua en un suelo está especificado. Si no se especifica, se considera que el suelo satisface el criterio cuando está húmedo o cuando está seco o en ambos casos.

Todas las claves en esta taxonomía están diseñadas de tal forma para que los usuarios puedan determinar la clasificación correcta de un suelo, al usar sistemáticamente la clave. El usuario deberá comenzar por el principio de la “Clave para Órdenes de Suelo” y eliminar una por una las clases con criterios que no son satisfechos por el suelo en cuestión. El suelo se ubicará dentro de la primera clase listada que se cumplan todos los criterios requeridos.

En la clasificación de un suelo específico, el usuario de la Taxonomía de Suelos, iniciará revisando la “Clave para Órdenes de Suelo” para determinar el nombre del primer orden que, de acuerdo con los criterios listados, incluya al suelo en cuestión. El siguiente paso será ir a la página indicada para encontrar la “Clave para Subórdenes” de ese orden particular. Entonces el usuario deberá ir sistemáticamente a través de la clave para identificar correctamente el suborden que incluya al suelo, es decir, el primero que reúna todos los criterios requeridos. El mismo procedimiento se usa para encontrar la clase del suelo, en la “Clave para Grandes Grupos” para el suborden identificado. Similarmente, a través de la “Clave para Subgrupos” para el gran grupo, el usuario seleccionará el nombre correcto del subgrupo, con el nombre del primer taxón que reúna todos los criterios requeridos.

El nivel de familia se determina en forma similar, después de que los subgrupos hayan sido establecidos. El capítulo 17 puede emplearse de la misma manera como se usan las claves en esta taxonomía, para determinar cuales componentes son parte de la familia. La familia, sin embargo, típicamente tiene más de un componente y por lo tanto, se tendría que revisar todo el capítulo. Las claves para las

secciones de control para las clases de componentes de una familia deberán usarse primero y una vez determinada la sección de control se procederá a usar las claves de las clases.

Las descripciones y definiciones de las series de suelos individuales no están incluidas en este texto. Las definiciones generales de serie y de su sección de control se reportan en el capítulo 17.

En la “Clave de Órdenes de Suelo” y en las claves siguientes, los horizontes y propiedades de diagnóstico mencionados no incluyen a aquellos que estén debajo de cualquier contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico. Las propiedades de suelos enterrados y del manto superficial se consideran si el suelo cumple o no el significado de “suelo enterrado” proporcionado en el capítulo 1.

Si el suelo tiene un manto superficial y no es un suelo enterrado, la parte superior de la capa de la superficie original se considera como la “superficie del suelo” para la determinación de la profundidad y el espesor de los horizontes de diagnóstico y muchas otras características de diagnóstico de los suelos. Las propiedades donde se considera al manto superficial son la temperatura del suelo, humedad del suelo (incluyendo condiciones ácuicas) y cualquiera de las propiedades ándicas y vitrándicas y en los criterios para familia.

Si un perfil de suelo incluye a un suelo enterrado, la superficie del suelo se usa para determinar la humedad y temperatura del suelo, así como la profundidad y espesor de horizontes de diagnóstico y otras características de diagnóstico del suelo. Los horizontes de diagnóstico de suelos enterrados no se consideran en los taxa seleccionados a menos que los criterios en las claves indiquen en forma específica a horizontes enterrados, tales como en los subgrupos Thapto-Histic. Muchas otras características de diagnóstico de los suelos enterrados no son consideradas, pero sí se considera al carbono orgánico si es del período Holoceno, las propiedades ándicas de suelo, la saturación de bases y todas las propiedades empleadas para determinar familias y series.

#### **Claves para Órdenes de Suelo**

A. Suelos que tienen:

1. Permafrost dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Materiales gélicos dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y permafrost dentro de los 200 cm de la superficie del suelo.

## B. Otros suelos que:

1. No tienen propiedades ándicas de suelos en 60 por ciento o más del espesor entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 60 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico o un duripán si está más superficial;  
y
2. Tienen materiales orgánicos de suelo, que satisfacen una o más de las siguientes:
  - a. Sobreyacen a materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos y/o rellenan sus intersticios<sup>1</sup>, y directamente abajo de estos materiales tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico; o
  - b. Cuando se suman los materiales de cenizas, fragmentales o pomáceos tienen un total de 40 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 50 cm; o
  - c. Constituyen dos tercios o más del espesor total del suelo a un contacto dénsico, lítico o paralítico y no tienen horizontes minerales o tienen horizontes minerales con un espesor total de 10 cm o menos; o
  - d. Están saturados con agua por 30 días o más por año en años normales (o artificialmente drenados), tienen un límite superior dentro de los 40 cm de la superficie del suelo y tienen un espesor total de:
    - (1) 60 cm o más, si tres cuartos o más de su volumen consiste de fibras de musgos o si su densidad aparente, en húmedo, es menor de 0.1 g/cm<sup>3</sup>; o
    - (2) 40 cm o más, si ellos consisten de materiales sápricos o hémicos o de materiales fibricos con menos de tres cuartos (por volumen) de fibras de musgos y una densidad aparente, en húmedo, de 0.1 g/cm<sup>3</sup> o más.

**Histosols**, pág. 153

## C. Otros suelos que no tienen un epipedón plaggen o un horizonte argílico o kándico sobre un horizonte espódico, y tienen una o más de las siguientes:

1. Un horizonte espódico, un horizonte álbico en 50 por ciento o más de cada pedón y un régimen de temperatura del suelo cryico; o
2. Un horizonte Ap que contiene 85 por ciento o más de materiales espódicos; o
3. Un horizonte espódico con *todas* las siguientes características:
  - a. Una o más de las siguientes:

- (1) Un espesor de 10 cm o más; o
- (2) Un horizonte Ap suprayacente; o
- (3) Cementación en 50 por ciento o más de cada pedón; o
- (4) Una clase de tamaño de partícula francosa-gruesa, esquelética-francosa o más fina y un régimen de temperatura del suelo frígido; o
- (5) Un régimen de temperatura del suelo cryico; y

## b. Un límite superior dentro de las siguientes profundidades a partir de la superficie del suelo mineral; ya sea

- (1) Menor de 50 cm; o
- (2) Menor de 200 cm si el suelo tiene una clase de tamaño de partícula arenosa en al menos alguna parte entre la superficie del suelo mineral y el horizonte espódico; y

## c. Un límite inferior como sigue:

- (1) Ya sea a una profundidad de 25 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral, o la parte superior de un duripán o fragipán, o a un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico, cualquiera que esté más somero; o
- (2) A cualquier profundidad,
  - (a) Si el horizonte espódico tiene una clase de tamaño de partícula francosa-gruesa, francosa-esquelética o más fina, y el suelo tiene un régimen de temperatura frígido; o
  - (b) Si el suelo tiene un régimen de temperatura cryico; y

## d. Ya sea:

- (1) Un horizonte álbico directamente encima en 50 por ciento o más de cada pedón; o
- (2) Sin propiedades ándicas de suelo en 60 por ciento o más del espesor:
  - (a) Dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más superficial, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico, dentro de esa profundidad; o
  - (b) Entre, la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más superficial, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico.

**Spodosols**, pág. 251

<sup>1</sup> Los materiales que satisfacen la definición de ceniza, fragmental o pomácea excepto que tengan más de 10 por ciento (por volumen) de poros que están rellenos con materiales orgánicos se consideran como materiales de suelos orgánicos.

D. Otros suelos que tienen propiedades ándicas de suelo en 60 por ciento o más del espesor *ya sea*:

1. Dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más superficial, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán u horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*
2. Entre la superficie del suelo mineral, o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que este más superficial y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán u horizonte petrocálcico.

**Andisols**, pág. 77

E. Otros suelos que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte óxico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral y no tienen un horizonte kándico con su límite superior dentro de esa profundidad; *o*
2. 40 por ciento o más (por peso) de arcilla en la fracción de tierra-fina entre la superficie del suelo mineral y a una profundidad de 18 cm (después de mezclados); y un horizonte kándico que tiene las propiedades de minerales-intemperizables de un horizonte óxico y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Oxisols**, pág. 235

F. Otros suelos que tienen:

1. Una capa de 25 cm o más de espesor, con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene caras de fricción o agregados en forma de cuña con ejes longitudinales inclinados entre 10 a 60 grados de la horizontal; *y*
2. Un promedio ponderado de 30 por ciento o más de arcilla en la fracción de tierra-fina entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm ó en un horizonte Ap, cualquiera que sea más espeso; y 30 por ciento o más de arcilla en la fracción de tierra-fina de todos los horizontes entre una profundidad de 18 cm y una profundidad de 50 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico si están más someros; *y*
3. Grietas<sup>2</sup> que se abren y se cierran periódicamente.

**Vertisols**, pág. 283

G. Otros suelos que:

1. Tienen:

- a. Un régimen de humedad del suelo arídico; *y*
  - b. Un epipedón ócrico o antrópico; *y*
  - c. *Uno o más* de los siguientes con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; un horizonte cámbico a una profundidad menor de 25 cm o más; un régimen de temperatura cryico y un horizonte cámbico; un horizonte gypsico, petrocálcico, petrogypsico, o sálico, o un duripán; *o*
  - d. Un horizonte argílico o nátrico; *o*
2. Tienen un horizonte sálico; *y*
    - a. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo por 1 mes o más durante años normales; *y*
    - b. Una sección de control de humedad del suelo que está seca en alguna o en todas partes durante algún tiempo en años normales; *y*
    - c. Sin horizonte sulfúrico que tenga su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

**Aridisols**, pág. 97

H. Otros suelos que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte argílico o kándico, pero no un fragipán y una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a una de las siguientes profundidades:
  - a. Si el epipedón tiene una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en todo su espesor, *ya sea*:
    - (1) 125 cm abajo del límite superior del horizonte argílico (pero no más profundo de 200 cm abajo de la superficie del suelo mineral), o 180 cm abajo de la superficie del suelo mineral, cualquiera que esté más profundo; *o*
    - (2) A un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico si esta más somero; *o*
  - b. La más superficial de las siguientes profundidades:
    - (1) 125 cm abajo del límite superior del horizonte argílico o kándico; *o*
    - (2) 180 cm abajo de superficie del suelo mineral; *o*
    - (3) A un contacto lítico, paralítico o petroférico; *o*
2. Un fragipán y ambas de las siguientes:
  - a. Un horizonte argílico o un kándico encima, dentro o abajo de él o películas arcillosas de 1 mm o más de espesor en uno o más de sus subhorizontes; *y*

<sup>2</sup> Una grieta es una separación entre grandes poliedros. Si el horizonte superficial está lo suficientemente auto mullido, es decir, una masa de gránulos sueltos, o si el suelo está cultivado cuando las grietas están abiertas, las grietas pueden estar rellenas principalmente con materiales granulares de la superficie; pero están abiertas en el sentido de que los poliedros están separados. Una grieta se considera abierta si controla la infiltración y la percolación del agua en un suelo seco arcilloso.

b. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a la profundidad más superficial de las siguientes:

- (1) 75 cm abajo del límite superior del fragipán; *o*
- (2) 200 cm abajo de la superficie del suelo mineral; *o*
- (3) A un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico.

**Ultisols**, pág. 261

I. Otros suelos que tienen *ambas* de las siguientes:

1. *Ya sea*

- a. Un epipedón mólico; *o*
- b. Un horizonte superficial que reúne todos los requisitos de un epipedón mólico excepto en su espesor después de que el suelo se ha mezclado a la profundidad de 18 cm y un subhorizonte mayor de 7.5 cm de espesor, dentro de la parte superior de un horizonte argílico, kándico o nátrico, que satisface los requisitos de color, contenido de carbono-orgánico, saturación de bases y estructura de un epipedón mólico, pero están separados de la superficie por un horizonte álbico, *y*

2. Una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todos los horizontes entre el límite superior de cualquier horizonte argílico, kándico o nátrico y una profundidad de 125 cm abajo de ese límite o entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 180 cm o entre la superficie del suelo mineral y un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquier profundidad que este más superficial.

**Mollisols**, pág. 191

J. Otros suelos que no tienen un epipedón plaggen y que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico; *o*
2. Un fragipán que tiene películas de arcilla de 1 mm o más de espesor en alguna parte.

**Alfisols**, pág. 35

K. Otros suelos que tienen *ya sea*:

1. *Una o más* de las siguientes:

a. Un horizonte cámbico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral y su límite inferior a una profundidad de 25 cm o más debajo de la superficie del suelo mineral ; *o*

b. Dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, el límite superior de un horizonte cálcico, petrocálcico, gypsico, petrogypsico, plácico o un duripán; *o*

c. Un fragipán o un horizonte óxico, sómbrico o espódico con su límite superior dentro de 200 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

d. Un horizonte sulfúrico con su límite superior dentro de los 150 cm superficiales del suelo mineral; *o*

e. Un régimen de temperatura cryico y un horizonte cámbico; *o*

2. No tienen materiales sulfídicos dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

a. En uno o más horizontes entre 20 y 50 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un valor de *n* de 0.7 o menos, o menos de 8 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina; *y*

b. Una o ambas de las siguientes:

(1) Un horizonte sálico o un epipedón hístico, mólico, plaggen o úmbrico; *o*

(2) En el 50 por ciento o más de las capas entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 50 cm, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) el cual decrece con el incremento de la profundidad abajo de 50 cm y también un manto freático dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral en algún tiempo durante el año cuando el suelo no está congelado en ninguna parte.

**Inceptisols**, pág. 159

L. Otros suelos.

**Entisols**, pág. 123

## CAPÍTULO 5

### Alfisols

#### Clave para Subórdenes

JA. Alfisols que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas (diferentes a las condiciones antrácuicas) por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); y tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Rasgos redoximórficos en todas las capas entre el límite inferior de un horizonte Ap ó a una profundidad de 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral, cualquiera que esté más profundo y una profundidad de 40 cm; y *una* de las siguientes dentro de los 12.5 cm superiores del horizonte argílico, nátrico, glóssico o kándico:

a. 50 por ciento o más de empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos sobre las caras de los agregados y concentraciones redox dentro de los agregados; *o*

b. Concentraciones redox y 50 por ciento o más de empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en la matriz; *o*

c. 50 por ciento o más de empobrecimientos redox con un chroma de 1 o menos sobre las caras de los agregados ó en la matriz ó en ambos; *o*

2. En los horizontes que tienen condiciones ácuicas, suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa alfa al tiempo cuando el suelo no está bajo riego.

**Aqualfs**, pág. 35

JB. Otros Alfisols que tienen un régimen de temperatura cryico o isofrígido.

**Cryalfs**, pág. 44

JC. Otros Alfisols que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustalfs**, pág. 59

JD. Otros Alfisols que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xeralfs**, pág. 71

JE. Otros Alfisols.

**Udalfs**, pág. 47

#### Aqualfs

#### Clave para Grandes Grupos

JAA. Aqualfs que tienen un régimen de temperatura cryico.

**Cryaqualfs**, pág. 37

JAB. Otros Aqualfs que tienen, a través de uno o más horizontes entre 30 y 150 cm de profundidad a partir de la superficie del suelo, plintita que forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

**Plinthaqualfs**, pág. 43

JAC. Otros Aqualfs que tienen un duripán.

**Duraqualfs**, pág. 37

JAD. Otros Aqualfs que tienen un horizonte nátrico.

**Natraqualfs**, pág. 43

JAE. Otros Aqualfs que tienen un fragipán, con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Fragiaqualfs**, pág. 41

JAF. Otros Aqualfs que tienen un horizonte kándico.

**Kandiaqualfs**, pág. 42

JAG. Otros Aqualfs que tienen una o más capas de al menos 25 cm de espesor (acumulativo) dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 50 por ciento o más (por volumen) de bioturbación reconocible, como rellenos de madrigueras de animales, orificios de lombrices o desechos de lombrices.

**Vermaqualfs**, pág. 43

JAH. Otros Aqualfs que tienen un cambio textural abrupto entre el epipedón órico o el horizonte álbico y el horizonte argílico, y tienen una conductividad hidráulica a saturación moderadamente baja o menor en el horizonte argílico.

**Albaqualfs**, pág. 35

JAI. Otros Aqualfs que tienen un horizonte glóssico.

**Glossaqualfs**, pág. 41

JAJ. Otros Aqualfs que tienen una episaturación.

**Epiaqualfs**, pág. 39

JAK. Otros Aqualfs.

**Endoaqualfs**, pág. 37

#### Albaqualfs

#### Clave para Subgrupos

JAHA. Albaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

**Arenic Albaqualfs**

JAHB. Otros Albaqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas:*

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz entre el límite inferior del horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm de la superficie del suelo mineral.

**Aeric Vertic Albaqualfs**

JAHC. Otros Albaqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas:*

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y 18 cm después de mezclados que tienen uno o más de los siguientes colores;

a. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*

b. Un value, en seco, de 6 o más; *o*

c. Un chroma de 4 o más.

**Chromic Vertic Albaqualfs**

JAHD. Otros Albaqualfs que tienen una o ambas de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm

o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Vertic Albaqualfs**

JAHE. Otros Albaqualfs que tienen *ambas:*

1. Un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz entre el límite inferior del horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Un epipedón mólico o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados, reúnen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto su espesor.

**Udolic Albaqualfs**

JAHF. Otros Albaqualfs que tienen un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz entre el límite inferior del horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

**Aeric Albaqualfs**

JAHG. Otros Albaqualfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

**Aquandic Albaqualfs**

JAHH. Otros Albaqualfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados, reúnen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto su espesor.

**Mollic Albaqualfs**

JAHI. Otros Albaqualfs que tienen un epipedón úmbrico, o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados, reúnen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto su espesor.

**Umbric Albaqualfs**

JAHI. Otros Albaqualfs.

**Typic Albaqualfs**

## Cryaqualfs

### Clave para Subgrupos

JAAA. Todos los Cryaqualfs (provisionalmente).

#### Typic Cryaqualfs

## Duraqualfs

### Clave para Subgrupos

JACA. Todos los Duraqualfs (provisionalmente).

#### Typic Duraqualfs

## Endoqualfs

### Clave para Subgrupos

JAKA. Endoqualfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Endoqualfs

JAKB. Otros Endoqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas*:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y 18 cm que después de mezclados tienen uno o más de los siguientes colores;

- a. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
- b. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
- c. Un chroma de 4 o más.

#### Chromic Vertic Endoqualfs

JAKC. Otros Endoqualfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Endoqualfs

JAKD. Otros Endoqualfs que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos, en el interior de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
  - b. 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento; *y*
    - (1) Un color del value de 3 o más (en húmedo) y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
    - (2) Un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### Aeric Fragic Endoqualfs

JAKE. Otros Endoaqualfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Endoaqualfs**

JAKF. Otros Endoaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Endoaqualfs**

JAKG. Otros Endoaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Endoaqualfs**

JAKH. Otros Endoaqualfs que tienen:

1. Un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Un hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
  - b. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento *y*
    - (1) Un color del value, en húmedo y del chroma de 3 o más; *o*
    - (2) Un chroma de 2 o más, si no hay concentraciones redox.

#### **Udolic Endoaqualfs**

JAKI. Otros Endoaqualfs que tienen:

1. Un epipedón úmbrico o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados, reúnen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto en su espesor; *y*

2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, uno o una combinación de los siguientes colores:

- a. Hue de 7.5YR o más rojizo, en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
  - (1) Si, los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en el interior de los agregados; *o*
  - (2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
- b. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento, *y* ya sea:
  - (1) Un color del value de 3 o más (en húmedo), *y* un chroma de 3 o más; *o*
  - (2) Un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Umbric Endoaqualfs**

JAKJ. Otros Endoaqualfs que tienen en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

1. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en el interior de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 10YR o más amarillento, *y*:
  - a. Un color del value de 3 o más (en húmedo), *y* un chroma de 3 o más (en húmedo *y* en seco); *o*
  - b. Un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Endoaqualfs**

JAKK. Otros Endoaqualfs que tienen un epipedón mólico o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor.

#### **Mollic Endoaqualfs**

JAKL. Otros Endoaqualfs que tienen un epipedón úmbrico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto en su espesor.

#### **Umbric Endoaqualfs**

JAKM. Otros Endoaqualfs.

#### **Typic Endoaqualfs**

## Epiaqualfs

### Clave para Subgrupos

JAJA. Epiaqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas:*
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Un hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimiento redox con un chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*
  - b. Un hue de 10YR o más amarillento *y*:
    - (1) Un color del value de 3 o más, en húmedo, y del chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
    - (2) Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) y no hay concentraciones redox.
3. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y 18 cm, que después de mezclados tienen uno o más de los siguientes colores:
  - a. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
  - b. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
  - c. Un chroma de 4 o más.

### Aeric Chromic Vertic Epiaqualfs

JAJB. Otros Epiaqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas:*
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en

años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. En uno o más horizontes, entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

a. Un hue de 7.5YR o más rojizo; *y*

- (1) Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimiento redox con un chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
- (2) Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*

b. Un hue de 10YR o más amarillento; *o*

(1) Un color del value de 3 o más, en húmedo, y del chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*

(2) Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) y no hay concentraciones redox.

### Aeric Vertic Epiaqualfs

JAJC. Otros Epiaqualfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas:*
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y 18 cm que después de mezclados tienen uno o más de los siguientes colores:
  - a. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
  - b. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
  - c. Un chroma de 4 o más.

### Chromic Vertic Epiaqualfs

JAJD. Otros Epiaqualfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Epiaqualfs**

JAJE. Otros Epiaqualfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Epiaqualfs**

JAJF. Otros Epiaqualfs que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los

agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en el interior de los agregados; *o*

(2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más; *o*

b. Un hue de 10YR o más amarillento *y*:

(1) Un color del value de 3 o más (en húmedo) y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*

(2) Un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Fragic Epiaqualfs**

JAJG. Otros Epiaqualfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Epiaqualfs**

JAJH. Otros Epiaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Epiaqualfs**

JAJI. Otros Epiaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Epiaqualfs**

JAJJ. Otros Epiaqualfs que tienen:

1. Un epipedón úmbrico o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados, reúnen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto en su espesor; *y*

2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

a. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*

(1) Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en el interior de los agregados; *o*

(2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más; *o*

b. Un hue de 10YR o más amarillento *y*:

- (1) Un color del value de 3 o más (en húmedo) y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
- (2) Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) y no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Umbric Epiaqualfs**

JAJK. Otros Epiaqualfs que tienen:

1. Un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor; y
2. 50 por ciento o más de la matriz en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Un hue de 7.5YR o más rojizo; y
    - (1) Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
  - b. Un hue de 10YR o más amarillento, y *ya sea*:
    - (1) Un color del value, en húmedo y del chroma de 3 o más; *o*
    - (2) Un chroma de 2 o más, si no hay concentraciones redox.

#### **Udolic Epiaqualfs**

JAJL. Otros Epiaqualfs que tienen en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

1. Hue de 7.5YR o más rojizo; y
  - a. Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos (tanto en húmedo como en seco) en el interior de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*
2. Un hue de 10YR o más amarillento, y *ya sea*:
  - a. Un color del value de 3 o más (en húmedo), y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
  - b. Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Epiaqualfs**

JAJM. Otros Epiaqualfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de

mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor.

#### **Mollic Epiaqualfs**

JAJN. Otros Epiaqualfs que tienen un epipedón úmbrico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto en su espesor.

#### **Umbric Epiaqualfs**

JAJO. Otros Epiaqualfs.

#### **Typic Epiaqualfs**

### **Fragiaqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JAEA. Fragiaqualfs que tienen una o más capas de al menos 25 cm de espesor (acumulativo) dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 25 por ciento o más (por volumen) de bioturbación reconocible, como rellenos de madrigueras de animales, orificios de lombrices o desechos de lombrices.

#### **Vermic Fragiaqualfs**

JAEB. Otros Fragiaqualfs que tienen, entre un horizonte A o Ap y un fragipán, un horizonte con 50 por ciento o más de chroma de 3 o más, si el hue es 10YR o más rojizo o de 4 o más, si el hue es de 2.5Y o más amarillento.

#### **Aeric Fragiaqualfs**

JAEC. Otros Fragiaqualfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Fragiaqualfs**

JAED. Otros Fragiaqualfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo y una profundidad 18 cm que después de mezclados, tienen esos colores del value.

#### **Humic Fragiaqualfs**

JAEE. Otros Fragiaqualfs.

#### **Typic Fragiaqualfs**

### **Glossaqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JAIA. Glossaqualfs que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Glossaqualfs**

JAIB. Otros Glossaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Glossaqualfs**

JAIC. Otros Glossaqualfs que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos en el interior de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
  - b. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento, *y ya sea*:
    - (1) Un color del value de 3 o más (en húmedo) y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
    - (2) Un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Fragic Glossaqualfs**

JAID. Otros Glossaqualfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Glossaqualfs**

JAIE. Otros Glossaqualfs que tienen en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

1. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos (tanto en húmedo como en seco) en el interior de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*
2. Un hue de 10YR o más amarillento, *y ya sea*:

- a. Un color del value de 3 o más (en húmedo), y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
- b. Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco), si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Glossaqualfs**

JAIF. Otros Glossaqualfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor.

#### **Mollic Glossaqualfs**

JAIG. Otros Glossaqualfs.

#### **Typic Glossaqualfs**

### **Kandiaqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JAJA. Kandiaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Kandiaqualfs**

JAFB. Otros Kandiaqualfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Kandiaqualfs**

J AFC. Otros Kandiaqualfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kandiaqualfs**

JAFD. Otros Kandiaqualfs que tienen:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (en muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral, o materiales entre la superficie del suelo mineral y la profundidad de 18 cm, que después de mezclados, tienen esos colores del value; *y*
2. En uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:
  - a. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
    - (1) Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos (tanto en húmedo como en seco) en el interior de los agregados; *o*
    - (2) Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*

- b. Un hue de 10YR o más amarillento, y ya sea:
- (1) Un color del value de 3 o más (en húmedo), y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
  - (2) Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco), si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Umbric Kandiaqualfs**

JAFE. Otros Kandiaqualfs que tienen en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral, en 50 por ciento o más de la matriz, uno o una combinación de los siguientes colores:

1. Hue de 7.5YR o más rojizo; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco) sobre 50 por ciento o más de los exteriores de los agregados o sin empobrecimientos redox con chroma de 2 o menos (tanto en húmedo como en seco) en el interior de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco); *o*
2. Un hue de 10YR o más amarillento, *y ya sea*:
  - a. Un color del value de 3 o más (en húmedo) y un chroma de 3 o más (en húmedo y en seco); *o*
  - b. Un chroma de 2 o más (tanto en húmedo como en seco), si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Kandiaqualfs**

JAFF. Otros Kandiaqualfs que tienen un epipedón úmbrico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón úmbrico excepto en su espesor.

#### **Umbric Kandiaqualfs**

JAFG. Otros Kandiaqualfs.

#### **Typic Kandiaqualfs**

### **Natraqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JADA. Natraqualfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Natraqualfs**

JADB. Otros Natraqualfs que tienen una o más capas de al menos 25 cm de espesor (acumulativo) dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 25 por ciento o más (por volumen) de bioturbación reconocible, como rellenos de madrigueras de animales, orificios de lombrices o desechos de lombrices.

#### **Vermic Natraqualfs**

JADC. Otros Natraqualfs que tienen:

1. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico; *y*
2. Un porcentaje de sodio intercambiable de menos de 15 y menos magnesio más sodio que calcio más acidez extractable, ya sea a través de los 15 cm superiores del horizonte nátrico o en todos los horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, cualquiera que este más profundo.

#### **Albic Glossic Natraqualfs**

JADD. Otros Natraqualfs que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de menos de 15 y menos magnesio más sodio que calcio más acidez extractable, ya sea a través de los 15 cm superiores del horizonte nátrico o en todos los horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, cualquiera que este más profundo.

#### **Albic Natraqualfs**

JADE. Otros Natraqualfs que tienen un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico.

#### **Glossic Natraqualfs**

JADF. Otros Natraqualfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados, satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico excepto en su espesor.

#### **Mollic Natraqualfs**

JADG. Otros Natraqualfs.

#### **Typic Natraqualfs**

### **Plinthaqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JABA. Todos los Plinthaqualfs (provisionalmente).

#### **Typic Plinthaqualfs**

### **Vermaqualfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JAGA. Vermaqualfs que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 7 o más (o una relación de adsorción de sodio de 6 o más), en *una o ambas*:

1. A través de los 15 cm superiores del horizonte argílico; *y/o*
2. En todos los horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Natric Vermaqualfs**

JAGB. Otros Vermaqualfs.

### Typic Vermaqualfs

## Cryalfs

### Clave para Grandes Grupos

JBA. Cryalfs que tienen *todas* las siguientes:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico que tiene su límite superior a los 60 cm o más abajo *tanto*:
  - a. De la superficie del suelo mineral; y
  - b. Del límite inferior de cualquier manto superficial que contiene 30 por ciento o más ceniza volcánica vítrea, cenizas, u otros materiales piroclásticos vítreos; y
2. Una textura (en la fracción de tierra-fina) más fina que la arena francosa fina en uno o más horizontes arriba del horizonte argílico, kándico o nátrico; y
3. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte argílico, kándico o nátrico.

### Palecryalfs, pág. 47

JBB. Otros Cryalfs que tienen un horizonte glóssico.

### Glossocryalfs, pág. 44

JBC. Otros Cryalfs.

### Haplocryalfs, pág. 45

## Glossocryalfs

### Clave para Subgrupos

JBBA. Glossocryalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Glossocryalfs

JBBB. Otros Glossocryalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Vertic Glossocryalfs

JBBC. Otros Glossocryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### Andic Glossocryalfs

JBBD. Otros Glossocryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Vitrandic Glossocryalfs

JBBE. Otros Glossocryalfs que tienen en uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores de un horizonte argílico, kándico o nátrico, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Glossocryalfs

JBBF. Otros Glossocryalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Glossocryalfs

JBBG. Otros Glossocryalfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

### Fragic Glossocryalfs

JBBH. Otros Glossocryalfs que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; y
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; y

3. Una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Xerollic Glossocryalfs**

JBBI. Otros Glossocryalfs que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value.

#### **Umbric Xeric Glossocryalfs**

JBBJ. Otros Glossocryalfs que:

1. Están secos en alguna parte de la sección de control de humedad del suelo por 45 días o más (acumulativos) en años normales; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; *y*
3. Una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Ustollic Glossocryalfs**

JBBK. Otros Glossocryalfs que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Glossocryalfs**

JBBL. Otros Glossocryalfs que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad del suelo por 45 días o más (acumulativos) en años normales

#### **Ustic Glossocryalfs**

JBBM. Otros Glossocryalfs que:

1. Tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados después de mezclados tienen esos colores del value; *y*
2. Tienen una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Mollic Glossocryalfs**

JBBN. Otros Glossocryalfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value.

#### **Umbric Glossocryalfs**

JBBO. Otros Glossocryalfs que tienen una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Eutric Glossocryalfs**

JBBP. Otros Glossocryalfs.

#### **Typic Glossocryalfs**

### **Haplocryalfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JBCA. Haplocryalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplocryalfs**

JBCB. Otros Haplocryalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Haplocryalfs**

JBCC. Otros Haplocryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Haplocryalfs**

JBCD. Otros Haplocryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*

- a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
- b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Haplocryalfs**

JBCE. Otros Haplocryalfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm superiores de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplocryalfs**

JBCF. Otros Haplocryalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplocryalfs**

JBCG. Otros Haplocryalfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen, *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Haplocryalfs**

JBCH. Otros Haplocryalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico, kándico o nátrico o en todo el horizonte argílico, kándico o nátrico, si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Haplocryalfs**

JBCI. Otros Haplocryalfs que tienen:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico que tiene 35 cm o menos de espesor; *y*
2. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Haplocryalfs**

JBCJ. Otros Haplocryalfs que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; *y*
3. Una saturación de bases de 50 por ciento o más (por NH<sub>4</sub>OAc) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Xerollic Haplocryalfs**

JBCK. Otros Haplocryalfs que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value.

#### **Umbric Xeric Haplocryalfs**

JBCL. Otros Haplocryalfs que:

1. Están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 días o más (acumulativos) en años normales; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; *y*
3. Una saturación de bases de 50 por ciento o más (por NH<sub>4</sub>OAc) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Ustollic Haplocryalfs**

JBCM. Otros Haplocryalfs que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Haplocryalfs**

JBCN. Otros Haplocryalfs que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 días o más (acumulativos) en años normales

#### **Ustic Haplocryalfs**

JBCO. Otros Haplocryalfs que:

1. Tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; *y*

2. Tienen una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Mollic Haplocryalfs**

JBCP. Otros Haplocryalfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value.

#### **Umbric Haplocryalfs**

JBCQ. Otros Haplocryalfs que tienen una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Eutric Haplocryalfs**

JBCR. Otros Haplocryalfs.

#### **Typic Haplocryalfs**

### **Palecryalfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JBAA. Palecryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Palecryalfs**

JBAB. Otros Palecryalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *y*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Palecryalfs**

JBAC. Otros Palecryalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 100 cm superiores de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de

2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Palecryalfs**

JBAD. Otros Palecryalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Palecryalfs**

JBAE. Otros Palecryalfs que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Palecryalfs**

JBAF. Otros Palecryalfs que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 días o más (acumulativos) en años normales

#### **Ustic Palecryalfs**

JBAG. Otros Palecryalfs que:

1. Tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; *y*
2. Tienen una saturación de bases de 50 por ciento o más (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) en todas partes desde la superficie del suelo mineral hasta una profundidad de 180 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Mollic Palecryalfs**

JBAH. Otros Palecryalfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value.

#### **Umbric Palecryalfs**

JBAI. Otros Palecryalfs.

#### **Typic Palecryalfs**

### **Udalfs**

#### **Clave para Grandes Grupos**

JEA. Udalfs que tienen un horizonte nátrico.

#### **Natrudalfs, pág. 56**

JEB. Otros Udalfs que tienen:

1. Un horizonte glóssico; *y*

2. En el horizonte argílico o kándico, nódulos discretos de 2.5 a 30 cm de diámetro, que:

- a. Están enriquecidos con hierro y con una cementación de extremadamente débil a endurecidos; y
- b. Tienen exteriores con un hue más rojizo o un chroma más alto que en los interiores.

**Ferrudalfs**, pág. 49

JEC. Otros Udalfs que tienen *ambos*:

1. Un horizonte glóssico; y
2. Un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fraglossudalfs**, pág. 49

JED. Otros Udalfs que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiudalfs**, pág. 49

JEE. Otros Udalfs que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Tienen un horizonte kándico; y
3. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral:
  - a. No tienen un decrecimiento de arcilla con el incremento de la profundidad de 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla [la arcilla se mide como arcilla no carbonatada o con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% de agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % carbono orgánico), cualquiera que tenga el mayor valor pero no mayor de 100]; o
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene 20 por ciento menos de arcilla y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

**Kandiudalfs**, pág. 55

JEF. Otros Udalfs que tienen un horizonte kándico.

**Kanhapludalfs**, pág. 56

JEG. Otros Udalfs que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférrico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral:
  - a. No tienen un decrecimiento de arcilla con el incremento de la profundidad de 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla [la

arcilla es medida como arcilla no carbonatada o con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% de agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % carbono orgánico), cualquiera que tenga el mayor valor pero no mayor de 100]; o

b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene 20 por ciento menos de arcilla y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina; y

3. Tienen un horizonte argílico con *una o más* de las siguientes:

a. En 50 por ciento o más de la matriz de uno o más subhorizontes en su mitad inferior, un hue de 7.5YR o más rojizo; o

b. En 50 por ciento o más de la matriz de horizontes que constituyen más de la mitad de su espesor total, un hue de 2.5YR o más rojizo, un value en húmedo, de 3 o menos y un value en seco, de 4 o menos; o

c. Muchas concentraciones redox gruesas con un hue de 5YR o más rojizo o un chroma de 6 o más, o ambos, en uno o más subhorizontes; o

4. Tienen un régimen de temperatura frígido y *todas* las siguientes:

a. Un horizonte argílico que tiene su límite superior a 60 cm o más abajo de *ambas*:

(1) La superficie del suelo mineral; y

(2) El límite inferior de cualquier manto superficial que contiene 30 por ciento o más de ceniza volcánica vítrica, ceniza, u otros materiales piroclásticos; y

b. Una textura (en la fracción de tierra-fina) más fina que la arena francosa fina en uno o más horizontes encima del horizonte argílico; y

c. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte argílico.

**Paleudalfs**, pág. 57

JEH. Otros Udalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte argílico o de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen todo lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y

2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; y

3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

**Rhodudalfs**, pág. 59

JEI. Otros Udalfs que tienen un horizonte glóssico.

**Glossudalfs**, pág. 50

JEJ. Otros Udalfs.

### Hapludalfs, pág. 51

#### Ferrudalfs

##### Clave para Subgrupos

JEDA. Ferrudalfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

##### Aquic Ferrudalfs

JEDB. Otros Ferrudalfs.

##### Typic Ferrudalfs

#### Fragiudalfs

##### Clave de Subgrupos

JEDA. Fragiudalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

##### Andic Fragiudalfs

JEDB. Otros Fragiudalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

##### Vitrandic Fragiudalfs

JEDC. Otros Fragiudalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

##### Aquic Fragiudalfs

JEDD. Otros Fragiudalfs que están saturados con agua en una o más capas encima del fragipán en años normales *por una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Fragiudalfs

JEDE. Otros Fragiudalfs.

#### Typic Fragiudalfs

#### Fraglossudalfs

##### Clave para Subgrupos

JECA. Fraglossudalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

##### Andic Fraglossudalfs

JECB. Otros Fraglossudalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

##### Vitrandic Fraglossudalfs

JECC. Otros Fraglossudalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 25 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

##### Aquic Fraglossudalfs

JECD. Otros Fraglossudalfs que están saturados con agua en una o más capas encima del fragipán en años normales *por una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Fraglossudalfs

JECE. Otros Fraglossudalfs.

#### Typic Fraglossudalfs

## Glossudalfts

### Clave para Subgrupos

JEIA. Glossudalfts que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

### Aquertic Glossudalfts

JEIB. Otros Glossudalfts que tienen *ambas*:

1. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Oxyaquic Vertic Glossudalfts

JEIC. Otros Glossudalfts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de

un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Vertic Glossudalfts

JEID. Otros Glossudalfts que tienen:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores de un horizonte argílico, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral con *una o más* de las siguientes:
  - a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
  - b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Aquandic Glossudalfts

JEIE. Otros Glossudalfts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### Andic Glossudalfts

JEIF. Otros Glossudalfts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Glossudalfs**

JEIG. Otros Glossudalfs que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; y
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Fragiaquic Glossudalfs**

JEIH. Otros Glossudalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Aquic Arenic Glossudalfs**

JEII. Otros Glossudalfs que tienen en uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Glossudalfs**

JEIJ. Otros Glossudalfs que tienen *ambas*:

1. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; o

- b. 30 o más días acumulativos; y

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Oxyaquic Glossudalfs**

JEIK. Otros Glossudalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Glossudalfs**

JEIL. Otros Glossudalfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Glossudalfs**

JEIM. Otros Glossudalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Glossudalfs**

JEIN. Otros Glossudalfs que tienen un horizonte glóssico con un espesor total menor de 50 cm.

#### **Haplic Glossudalfs**

JEIO. Otros Glossudalfs.

#### **Typic Glossudalfs**

### **Hapludalfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JEJA. Hapludalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Hapludalfs**

JEJB. Otros Hapludalfs que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene

su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral; *y*

3. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm, que después de mezclados, tiene *uno o más* de los siguientes:

a. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*

b. Un color del value, en seco, de 6 o más; *o*

c. Un chroma de 4 o más.

#### **Aquertic Chromic Hapludalfs**

JEJC. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Aquertic Hapludalfs**

JEJD. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

a. 20 o más días consecutivos; *o*

b. 30 o más días acumulativos; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Oxyaquic Vertic Hapludalfs**

JEJE. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Un horizonte Ap o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm, que después de mezclada, tiene *uno o más* de los siguientes:

a. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*

b. Un color del value, en seco, de 6 o más; *o*

c. Un chroma de 4 o más.

#### **Chromic Vertic Hapludalfs.**

JEJF. Otros Hapludalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Hapludalfs

JEJG. Otros Hapludalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Hapludalfs

JEJH. Otros Hapludalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Hapludalfs

JEJI. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Fragiaquic Hapludalfs

JEJJ. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:

- a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*

2. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

#### Fragic Oxyaquic Hapludalfs

JEJK. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Aquic Arenic Hapludalfs

JEJL. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos; *y*
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Arenic Oxyaquic Hapludalfs

JEJM. Otros Hapludalfs que tienen condiciones antrácuicas.

#### Anthraquic Hapludalfs

JEJN. Otros Hapludalfs que tienen:

1. Un cambio textural abrupto; *y*
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

- b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral; y
3. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 60 por ciento hasta a una profundidad de 125 cm a partir de la parte superior de un horizonte argílico, a una profundidad de 180 cm a partir de la superficie del suelo mineral, o directamente encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Albaquultic Hapludalfs

JEJO. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*

1. Un cambio textural abrupto; y
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Albaquic Hapludalfs

JEJP. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*

1. Interdigitaciones de materiales álbicos en la parte superior del horizonte argílico; y
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Glossaquic Hapludalfs

JEJQ. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*:

1. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral; y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 60 por ciento hasta a una profundidad de 125 cm a partir

de la parte superior de un horizonte argílico, a una profundidad de 180 cm a partir de la superficie del suelo mineral, o directamente encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

#### Aquultic Hapludalfs

JEJR. Otros Hapludalfs que tienen *ambas*

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores del value; y
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Aquollic Hapludalfs

JEJS. Otros Hapludalfs que tienen empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

1. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Aquic Hapludalfs

JEJT. Otros Hapludalfs que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados reúnen los requerimientos de color para un epipedón mólico; y
2. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por una o ambas:
  - a. 20 o más días consecutivos; o
  - b. 30 o más días acumulativos.

#### Mollic Oxyaquic Hapludalfs

JEJU. Otros Hapludalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por una o ambas:

1. 20 o más días consecutivos; o

2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Hapludalfs**

JEJV. Otros Hapludalfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Hapludalfs**

JEJW. Otros Hapludalfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Hapludalfs**

JEJX. Otros Hapludalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Hapludalfs**

JEJY. Otros Hapludalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Hapludalfs**

JEJZ. Otros Hapludalfs que tienen interdigitaciones de materiales álbicos en uno o más subhorizontes del horizonte argílico.

#### **Glossic Hapludalfs**

JEJZa. Otros Hapludalfs que tienen:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico que tiene 35 cm o menos de espesor; *y*
2. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Hapludalfs**

JEJZb. Otros Hapludalfs que tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 60 por ciento a una profundidad: de 125 cm a partir de la parte superior de un horizonte argílico o de 180 cm a partir de la superficie del suelo mineral, o directamente encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

#### **Ultic Hapludalfs**

JEJZc. Otros Hapludalfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados reúnen los requerimientos de color para un epipedón mólico.

#### **Mollic Hapludalfs**

JEJZd. Otros Hapludalfs.

#### **Typic Hapludalfs**

### **Kandiudalfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JEEA. Kandiudalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthaquic Kandiudalfs**

JEEB. Otros Kandiudalfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kandiudalfs**

JEEC. Otros Kandiudalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Kandiudalfs**

JEEED. Otros Kandiudalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Kandiudalfs**

JEEEE. Otros Kandiudalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Grossarenic Plinthic Kandiudalfs

JEEF. Otros Kandiudalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Kandiudalfs

JEEG. Otros Kandiudalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Kandiudalfs

JEEH. Otros Kandiudalfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kandiudalfs

JEEI. Otros Kandiudalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte kándico o de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### Rhodic Kandiudalfs

JEEJ. Otros Kandiudalfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados reúnen los requerimientos de color para un epipedón mólico.

#### Mollic Kandiudalfs

JEEK. Otros Kandiudalfs.

#### Typic Kandiudalfs

### Kanhapludalfs

#### Clave para Subgrupos

JEFA. Kanhapludalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Kanhapludalfs

JEFB. Otros Kanhapludalfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo

mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Kanhapludalfs

JEFC. Otros Kanhapludalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Kanhapludalfs

JEFD. Otros Kanhapludalfs que tienen en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte kándico o de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### Rhodic Kanhapludalfs

JEFE. Otros Kanhapludalfs.

#### Typic Kanhapludalfs

### Natrudalfs

#### Clave para Subgrupos

JEAA. Natrudalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Natrudalfs

JEAB. Otros Natrudalfs que tienen:

1. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico; *y*
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte nátrico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

- b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte nátrico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Glossaquic Natrudalfts

JEAC. Otros Natrudalfts que tienen empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

1. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte nátrico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte nátrico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Aquic Natrudalfts

JEAD. Otros Natrudalfts.

#### Typic Natrudalfts

### Paleudalfts

#### Clave para Subgrupos

JEGA. Paleudalfts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Paleudalfts

JEGB. Otros Paleudalfts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Paleudalfts

JEGC. Otros Paleudalfts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

- b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Paleudalfts

JEGD. Otros Paleudalfts que tienen condiciones antrácuicas.

#### Anthraquic Paleudalfts

JEGE. Otros Paleudalfts que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Fragiaquic Paleudalfts

JEGF. Otros Paleudalfts que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthaquic Paleudalfts

JEGG. Otros Paleudalfts que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Un horizonte glóssico *o*, en la parte superior del horizonte argílico, uno o más subhorizontes que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos con chroma de 2 o menos.

#### Glossaquic Paleudalfts

JEGH. Otros Paleudalfts que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*

2. Un incremento de arcilla de 15 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra - fina dentro una distancia vertical de 2.5 cm del límite superior del horizonte argílico.

#### **Albaquic Paleudalfs**

JEGI. Otros Paleudalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Paleudalfs**

JEGJ. Otros Paleudalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Paleudalfs**

JEGK. Otros Paleudalfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Paleudalfs**

JEGL. Otros Paleudalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Paleudalfs**

JEGM. Otros Kandiudalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Plinthic Paleudalfs**

JEGN. Otros Paleudalfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*

3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:

- a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
- b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Paleudalfs**

JEGO. Otros Paleudalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Paleudalfs**

JEGP. Otros Paleudalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Paleudalfs**

JEQQ. Otros Paleudalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### **Grossarenic Paleudalfs**

JEGR. Otros Paleudalfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Paleudalfs**

JEGS. Otros Paleudalfs que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte glóssico; *o*
2. En la parte superior del horizonte argílico, uno o más subhorizontes que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes con un chroma de 2 o menos; *o*
3. 5 por ciento o más (por volumen) de materiales álbicos en algún subhorizonte del horizonte argílico.

#### **Glossic Paleudalfs**

JEGT. Otros Paleudalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte kándico o de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento con los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*

3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### Rhodic Paleudalfs

JEGU. Otros Paleudalfs que tienen un epipedón mólico, o los 18 cm superiores del suelo mineral, que después de mezclados reúnen los requerimientos de color para un epipedón mólico.

#### Mollic Paleudalfs

JEGV. Otros Paleudalfs.

#### Typic Paleudalfs

### Rhodudalfs

#### Clave para Subgrupos

JEHA. Todos los Rhodudalfs (provisionalmente)

#### Typic Rhodudalfs

### Ustalfs

#### Clave para Grandes Grupos

JCA. Ustalfs que tienen un duripán que tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Durustalfs, pág. 60

JCB. Otros Ustalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral plintita que forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

#### Plinthustalfs, pág. 70

JCC. Otros Ustalfs que tienen un horizonte nátrico.

#### Natrudalfs, pág. 65

JCD. Otros Ustalfs que:

1. Tienen un horizonte kándico; y
2. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
3. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. No tienen un decrecimiento de arcilla con el incremento de la profundidad de 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla [la arcilla se mide como arcilla no carbonatada o con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% de agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % carbono orgánico), cualquiera que tenga el mayor valor pero no mayor de 100]; o
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un 20 por ciento menos de arcilla y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### Kandiustalfs, pág. 63

JCE. Otros Ustalfs que tienen un horizonte kándico.

#### Kanhaplustalfs, pág. 64

JCF. Otros Ustalfs que tienen *una o más* de las siguientes:

1. Un horizonte petrocálcico que tienen su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. No tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral y un horizonte argílico que tiene *ambas*:
  - a. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
    - (1) Con el incremento de la profundidad, no tienen un decrecimiento de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla [la arcilla se mide como arcilla no carbonatada o con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% de agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % carbono orgánico), cualquiera que tenga el mayor valor pero no mayor de 100]; o
    - (2) 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un 20 por ciento menos de arcilla y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina; y
  - b. En la mitad inferior del horizonte argílico, uno o más subhorizontes con *una o ambas*:
    - (1) En 50 por ciento o más de la matriz un hue de 7.5YR o más rojizo y un chroma de 5 o más; o
    - (2) Concentraciones redox comunes o gruesas con un hue de 7.5YR o más rojizas o un chroma de 6 o más, o ambos; o

3. No tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral y un horizonte argílico que tiene *ambas*:

- a. Una clase de tamaño de partícula arcillosa o esquelética – arcillosa a través de uno o más subhorizontes en su parte superior; y
- b. En su límite superior, un incremento de arcilla (en la fracción de tierra-fina) de *ya sea* 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm.

#### Paleustalfs, pág. 67

JCG. Otros Ustalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte argílico o de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; y
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### Rhodustalfs, pág. 70

JCH. Otros Ustalfs.

### Haplustalfs, pág. 60

#### Durustalfs

##### Clave para Subgrupos

JCAA. Todos los Durustalfs (provisionalmente).

#### Typic Durustalfs

#### Haplustalfs

##### Clave para Subgrupos

JCHA. Haplustalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplustalfs

JCHB. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquertic Haplustalfs

JCHC. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Vertic Haplustalfs

JCHD. Otros Haplustalfs que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, tiene *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Torrertic Haplustalfs

JCHE. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. Si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo méxico y una sección de control de humedad la cual, en años normales, está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura de 50 cm, abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control

de humedad que en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; y

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Udertic Haplustalfs

JCHF. Otros Haplustalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Haplustalfs.

JCHG. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Aquic Arenic Haplustalfs

JCHH. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. Un horizonte argílico que tiene una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 75 por ciento.

#### Aquiltic Haplustalfs

JCHI. Otros Haplustalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo

mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Haplustalfs

JCHJ. Otros Haplustalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyquic Haplustalfs

JCHK. Otros Haplustalfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Haplustalfs

JCHL. Otros Haplustalfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### Lamellic Hapludalfs

JCHM. Otros Haplustalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### Psammentic Haplustalfs

JCHN. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más; *y*
2. Cuando nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### Arenic Aridic Haplustalfs

JCHO. Otros Haplustalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### Arenic Haplustalfs

JCHP. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. Un horizonte cálcico que su límite superior está dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Cuando nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años

normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

- (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*
- (2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### Calcic Haplustalfs

JCHQ. Otros Haplustalfs que, cuando nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*
  - b. Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### Aridic Haplustalfs

JCHR. Otros Haplustalfs que tienen una CIC de menos de 24 cmol(+)/kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) en 50 por ciento o más de *ya sea* el horizonte argílico si es menor de 100 cm de espesor o de sus 100 cm superiores.

#### Kanhaplic Haplustalfs

JCHS. Otros Haplustalfs que tienen:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico con un espesor de 35 cm o menos; *y*

2. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Inceptic Haplustalfs

JCHT. Otros Haplustalfs que tienen *ambas*:

1. Un horizonte cálcico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Cuando nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### Calcic Udic Haplustalfs

JCHU. Otros Haplustalfs que tienen un horizonte argílico con una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 75 por ciento en todo su espesor.

#### Ultic Haplustalfs

JCHV. Otros Haplustalfs que tienen un horizonte cálcico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Haplustalfs

JCHW. Otros Haplustalfs que, cuando no se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en

todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### Udic Haplustalfs

JCHX. Otros Haplustalfs.

#### Typic Haplustalfs

### Kandiustalfs

#### Clave para Subgrupos

JCDA. Kandiustalfs que tienen Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Kandiustalfs

JCDB. Otros Kandiustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Aquic Arenic Kandiustalfs

JCDC. Otros Kandiustalfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kandiustalfs

JCDD. Otros Kandiustalfs que tienen, en uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Kandiustalfs

JCDE. Otros Kandiustalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; y
2. Cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo méxico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Arenic Aridic Kandiuistalfts**

JCDF. Otros Kandiuistalfts que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Kandiuistalfts**

JCDG. Otros Kandiuistalfts que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; o

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

b. Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C;

#### **Aridic Kandiuistalfts**

JCDH. Otros Kandiuistalfts que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por 135 días acumulativos o menos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; o

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### **Udic Kandiuistalfts**

JCDI. Otros Kandiuistalfts que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte kándico o de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y

2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; y

3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### **Rhodic Kandiuistalfts**

JCDJ. Otros Kandiuistalfts.

#### **Typic Kandiuistalfts**

### **Kanhaplustalfts**

#### **Clave para Subgrupos**

JCEA. Kanhaplustalfts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Kanhaplustalfts**

JCEB. Otros Kanhaplustalfts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kanhaplustalfts**

JCEC. Otros Kanhaplustalfts que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; o

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

b. Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Kanhaplustalfts**

JCED. Otros Kanhaplustalfts que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está

seca en alguna parte por 135 días acumulativos o menos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### **Udic Kanhaplustalfs**

JCEE. Otros Kanhaplustalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte kándico o de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen todo lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### **Rhodic Kanhaplustalfs**

JCEF. Otros Kanhaplustalfs.

#### **Typic Kanhaplustalfs**

### **Natrustalfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JCCA. Natrustalfs que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Saladic Natrustalfs**

JCCB. Otros Natrustalfs que tienen *todas* las siguientes:

1. Cristales visibles de yeso o otras sales más solubles, o ambos, dentro de los 40 cm de la superficie del suelo; *y*
2. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *y*

3. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Leptic Torrertic Natrustalfs**

JCCC. Otros Natrustalfs que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a

través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Torrertic Natrustalfs**

JCCD. Otros Natrustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Aquertic Natrustalfs**

JCCE. Otros Natrustalfs que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Cristales visibles de yeso u otras sales más solubles; *y*

2. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Leptic Natrustalfs**

JCCF. Otros Natrustalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Natrustalfs**

JCCG. Otros Natrustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Aquic Arenic Natrustalfs**

JCCH. Otros Natrustalfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Natrustalfs**

JCCI. Otros Natrustalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Natrustalfs**

JCCJ. Otros Natrustalfs que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Natrustalfs**

JCCK. Otros Natrustalfs que tienen cristales visibles de yeso o de otras sales más solubles que el yeso, o ambas, dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Leptic Natrustalfs**

JCCL. Otros Natrustalfts que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Un porcentaje de sodio intercambiable menor de 15 (o una relación de adsorción de sodio menor de 13) en 50 por ciento o más del horizonte nátrico; y
2. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Haplargidic Natrustalfts**

JCCM. Otros Natrustalfts que tienen *ambas*:

1. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

(2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; y

2. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico.

#### **Aridic Glossic Natrustalfts**

JCCN. Otros Natrustalfts que, si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y
  - b. Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Natrustalfts**

JCCO. Otros Natrustalfts que tienen un epipedón mólico o los 18 cm superiores del suelo mineral cumplen con los requisitos de color para un epipedón mólico, después de mezclados.

#### **Mollic Natrustalfts**

JCCP. Otros Natrustalfts.

#### **Typic Natrustalfts**

#### **Paleustalfts**

#### **Clave para Subgrupos**

JCFA. Paleustalfts que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y

2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquertic Paleustalfs**

JCFB. Otros Paleustalfs que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y

2. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

a. 20 o más días consecutivos; o

b. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Vertic Paleustalfs**

JCFB. Otros Paleustalfs que tienen *ambas*:

1. Cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

a. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos del tiempo (acumulativo) por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; o

b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; y

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene

su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Udertic Paleustalfs**

JCFD. Otros Paleustalfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Paleustalfs**

JCFE. Otros Paleustalfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Aquic Arenic Paleustalfs**

JCFF. Otros Paleustalfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Paleustalfs**

JCFG. Otros Paleustalfs que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o

2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Paleustalfs**

JCFH. Otros Paleustalfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; o

2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; o

3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:

- a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
- b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### Lamellic Paleustalfs

JCFI. Otros Paleustalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### Psammentic Paleustalfs

JCFJ. Otros Paleustalfs que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. Si nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### Arenic Aridic Paleustlfs

JCFK. Otros Paleustalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que

se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Paleustalfs

JCFL. Otros Paleustalfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm

#### Arenic Paleustalfs

JCFM. Otros Paleustalfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Paleustalfs

JCFN. Otros Paleustalfs que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petrocalcic Paleustalfs

JCFO. Otros Paleustalfs que tienen *ambas*:

1. Cuando nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *y*
2. Un horizonte cálcico *ya sea* dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral si el promedio ponderado de la clase de tamaño de partículas de los 50 cm superiores del horizonte argílico es arenosa, *o* dentro de los 60 cm si es francosa, *o* dentro de los 50 cm si es arcillosa, *y* carbonatos en todos los horizontes arriba del horizonte cálcico.

#### Calcic Paleustlfs

JCFP. Otros Paleustalfs que tienen cuando nunca han sido irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C; *y*

b. Está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Paleustalfs**

JCFQ. Otros Paleustalfs que tienen una CIC de menos de 24 cmol(+)/kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) en 50 por ciento o más de *ya sea* el horizonte argílico si tiene menos de 100 cm de espesor o de sus 100 cm superiores.

#### **Kandic Paleustalfs**

JCFR. Otros Paleustalfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte argílico o de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

#### **Rhodic Paleustalfs**

JCFS. Otros Paleustalfs que tienen un horizonte argílico con una saturación de bases (por suma de cationes) menor de 75 por ciento en todo su espesor.

#### **Ultic Paleustalfs**

JCFT. Otros Paleustalfs que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos del tiempo (acumulativo) por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### **Udic Paleustalfs**

JCFU. Otros Paleustalfs.

#### **Typic Paleustalfs**

#### **Plinthustalfs**

##### **Clave para Subgrupos**

JCBA. Todos los Plinthustalfs (provisionalmente).

#### **Typic Plinthustalfs**

#### **Rhodustalfs**

##### **Clave para Subgrupos**

JCGA. Rhodustalfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Rhodustalfs**

JCGB. Otros Rhodustalfs que tienen una CIC de menos de 24 cmol(+)/kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) en 50 por ciento o más de *ya sea* el horizonte argílico si tiene menos de 100 cm de espesor o de sus 100 cm superiores.

#### **Kanhaplic Rhodustalfs**

JCGC. Otros Rhodustalfs que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro décimos o menos del tiempo (acumulativo) por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

#### **Udic Rhodustalfs**

JCGD. Otros Rhodustalfs

#### **Typic Rhodustalfs**

## Xeralfs

### Clave para Grandes Grupos

JDA. Xeralfs que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Durixeralfs**, pág. 71

JDB. Otros Xeralfs que tienen un horizonte nátrico.

**Natrixeralfs**, pág. 74

JDC. Otros Xeralfs que tienen un fragipán con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragixeralfs**, pág. 72

JDD. Otros Xeralfs que tienen en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral plintita que forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

**Plinthoxeralfs**, pág. 76

JDE. Otros Xeralfs que tienen, en *todos* los subhorizontes de los 100 cm superiores del horizonte argílico o kándico o de todo el horizonte argílico o kándico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alta que el value en húmedo.

**Rhodoxeralfs**, pág. 76

JDF. Otros Xeralfs que tienen *una o más* de las siguientes:

1. Un horizonte petrocálcico que tienen su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. No tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral *y* un horizonte argílico que tiene *ambas*:

a. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:

(1) Con el incremento de la profundidad, no tienen un decrecimiento de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla [la arcilla se mide como arcilla no carbonatada o con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% de agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % carbono orgánico), cualquiera que tenga el mayor valor pero no mayor de 100]; *o*

(2) 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un 20 por ciento menos de arcilla *y* abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina; *y*

b. Su base a una profundidad de 150 cm o más; *o*

3. No tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral *y* un horizonte argílico o kándico que tiene dentro de los 15 cm de su límite superior *ambas*:

a. Una clase de tamaño de partícula arcillosa o esquelética – arcillosa; *y*

b. Un incremento de arcilla, en la fracción de tierra-fina, de *ya sea* 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm.

**Pallexeralfs**, pág. 74

JDG. Otros Xeralfs.

**Haploxeralfs**, pág. 72

### Durixeralfs

#### Clave para Subgrupos

JDAA. Durixeralfs que tienen un horizonte nátrico.

**Natric Durixeralfs**

JDAB. Otros Durixeralfs que tienen encima del duripán, *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales *y* caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más.

**Vertic Durixeralfs**

JDAC. Otros Durixeralfs que tienen en uno o más subhorizontes dentro del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos *y* también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Durixeralfs**

JDAD. Otros Durixeralfs que tienen:

1. Un horizonte argílico que tiene *ambas*:
  - a. Una clase de tamaño de partícula arcillosa en todo el espesor de algún subhorizonte de 7.5 cm de espesor o más; *y*
  - b. En su límite superior o dentro de alguna parte, un incremento de arcilla de *ya sea* 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm, en la fracción de tierra-fina; *y*
2. Un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

**Abruptic Haplic Durixeralfs**

JDAE. Otros Durixeralfs que tienen un horizonte argílico que tiene *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arcillosa en todo el espesor de algún subhorizonte de 7.5 cm de espesor o más; *y*
2. En su límite superior o dentro de alguna parte, un incremento de arcilla de *ya sea* 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm, en la fracción de tierra-fina.

#### **Abruptic Durixeralfs**

JDAF. Otros Durixeralfs que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### **Haplic Durixeralfs**

JDAG. Otros Durixeralfs

#### **Typic Durixeralfs**

### **Fragixeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDCA. Fragixeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Fragixeralfs**

JDCB. Otros Fragixeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Fragixeralfs**

JDCC. Otros Fragixeralfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 18 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm que tienen esos colores, después de mezclados.

#### **Mollic Fragixeralfs**

JDCD. Otros Fragixeralfs que tienen en uno o más subhorizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Fragixeralfs**

JDCE. Otros Fragixeralfs que, encima del fragipán, no tienen un horizonte argílico o kándico con películas de arcilla en las caras verticales y horizontales de los agregados.

#### **Inceptic Fragixeralfs**

JDCF. Otros Fragixeralfs.

#### **Typic Fragixeralfs**

### **Haploxeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDGA. Haploxeralfs que tienen *ambas*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y 0.7 por ciento o más de carbono orgánico *ya sea* en todo el horizonte Ap o a través de los 10 cm superiores de un horizonte A.

#### **Lithic Mollic Haploxeralfs**

JDGB. Otros Haploxeralfs que tienen *ambas*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un horizonte argílico o kándico que es discontinuo horizontalmente en cada pedón.

#### **Lithic Ruptic-Inceptic Haploxeralfs**

JDGC. Otros Haploxeralfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haploxeralfs**

JDGD. Otros Haploxeralfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Haploxeralfs**

JDGE. Otros Haploxeralfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un

chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; o

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

(2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Haploxeralfs**

JDGF. Otros Haploxeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Haploxeralfs**

JDGG. Otros Haploxeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Haploxeralfs**

JDGH. Otros Haploxeralfs que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:

a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; y

2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico o kándico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Fragiaquic Haploxeralfs**

JDGI. Otros Haploxeralfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); y

2. Un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 75 por ciento en uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm superiores o encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

#### **Aquultic Haploxeralfs**

JDGJ. Otros Haploxeralfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Haploxeralfs**

JDGK. Otros Haploxeralfs que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) en uno o más subhorizontes del horizonte argílico o kándico.

#### **Natric Haploxeralfs**

JDGL. Otros Haploxeralfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o

2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Haploxeralfs**

JDGM. Otros Haploxeralfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; o

2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*

3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:

a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*

b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Haploxeralfs**

JDGN. Otros Haploxeralfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Haploxeralfs**

JDGO. Otros Haploxeralfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Haploxeralfs**

JDGP. Otros Haploxeralfs que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Haploxeralfs**

JDGQ. Otros Haploxeralfs que tienen:

1. Un horizonte argílico, kándico o nátrico que tiene un espesor de 35 cm o menos; *y*
2. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Haploxeralfs**

JDGR. Otros Haploxeralfs que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 75 por ciento en uno o más subhorizontes dentro de sus 75 cm superiores o encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

#### **Ultic Haploxeralfs**

JDGS. Otros Haploxeralfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 10 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm que después de mezclados tienen esos colores.

#### **Mollic Haploxeralfs**

JDGT. Otros Haploxeralfs.

#### **Typic Haploxeralfs**

### **Natrixeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDBA. Natrixeralfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Natrixeralfs**

JDBB. Otros Natrixeralfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Natrixeralfs**

JDBC. Otros Natrixeralfs.

#### **Typic Natrixeralfs**

### **Palexeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDBA. Palexeralfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Palexeralfs**

JDFB. Otros Palexeralfs que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de

agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; o

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Palexeralfs**

JDFC. Otros Palexeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando más de 1.0.

#### **Andic Palexeralfs**

JDFD. Otros Palexeralfs que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Palexeralfs**

JDFE. Otros Palexeralfs que tienen *ambas*:

1. Propiedades frágicas de suelo:

a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; y

2. Empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en capas que también tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:

a. Dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico si su límite superior está dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, si el límite superior del horizonte argílico o kándico está 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

#### **Fragiaquic Palexeralfs**

JDFF. Otros Palexeralfs que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Palexeralfs**

JDFG. Otros Palexeralfs que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Palexeralfs**

JDFH. Otros Palexeralfs que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; o

2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; o

3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:

a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); o

b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Palexeralfs**

JDFI. Otros Palexeralfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores de un horizonte argílico o en todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Palexeralfs**

JDFJ. Otros Palexeralfs que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa, que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico o kándico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Palexeralfs**

JDFK. Otros Palexeralfs que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de

sodio de 13 o más) en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Natric Palexeralfs**

JDFL. Otros Palexeralfs que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Palexeralfs**

JDFM. Otros Palexeralfs que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Palexeralfs**

JDFN. Otros Palexeralfs que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Palexeralfs**

JDFO. Otros Palexeralfs que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 75 por ciento en todo su espesor.

#### **Ultic Palexeralfs**

JDFP. Otros Palexeralfs con un horizonte argílico o kándico que tiene, en la fracción de tierra-fina, *una o ambas*:

1. Menos de 35 por ciento de arcilla a través de todos los subhorizontes dentro de los 15 cm de su límite superior; *o*
2. En su límite superior, un incremento de arcilla de menos del 20 por ciento (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm y de menos de 15 por ciento (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm.

#### **Haplic Palexeralfs**

JDFQ. Otros Palexeralfs que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y 0.7 por ciento o más de carbono orgánico ya sea a través de los 10 cm superiores del suelo mineral (sin mezclar) o a través de los 18 cm superiores del suelo mineral que después de mezclados.

#### **Mollic Palexeralfs**

JDFR. Otros Palexeralfs.

#### **Typic Palexeralfs**

### **Plinthoxeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDDA. Todos los Plinthoxeralfs (provisionalmente).

#### **Typic Plinthoxeralfs**

### **Rhodoxeralfs**

#### **Clave para Subgrupos**

JDEA. Rhodoxeralfs que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Rhodoxeralfs**

JDEB. Otros Rhodoxeralfs que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Rhodoxeralfs**

JDEC. Otros Rhodoxeralfs que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Rhodoxeralfs**

JDED. Otros Rhodoxeralfs que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Rhodoxeralfs**

JDEE. Otros Rhodoxeralfs que tienen un horizonte argílico o kándico que ya sea que es menor de 35 cm de espesor o es horizontalmente discontinuo en cada pedón.

#### **Inceptic Rhodoxeralfs**

JDEF. Otros Rhodoxeralfs.

#### **Typic Rhodoxeralfs**

## CAPÍTULO 6

### Andisols

#### Clave para Subórdenes

DA. Andisols que tienen *ya sea*:

1. Un epipedón hístico; *o*
2. En una capa encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa a una profundidad entre 40 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral o a partir de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente) y *una o más* de las siguientes:
  - a. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
  - b. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
  - c. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva al dipiridil-alfa, alfa en el tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

**Aquands**, pág. 77

DB. Otros Andisols que tienen, en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media de verano del suelo que:

1. Es de 8 °C o más fría, si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría, si existe un horizonte O.

**Gelands**, pág. 84

DC. Otros Andisols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryands**, pág. 81

DD. Otros Andisols que tienen un régimen de humedad arídico.

**Torrands**, pág. 84

DE. Otros Andisols que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xerands**, pág. 95

DF. Otros Andisols que tienen una retención de agua a 1500 kPa de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y menos de 30 por ciento en muestras no secadas a través del 60 por ciento o más de su espesor *ya sea*:

1. Dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades

ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*

2. Entre la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico.

**Vitrands**, pág. 93

DG. Otros Andisols que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustands**, pág. 92

DH. Otros Andisols.

**Udands**, pág. 85

#### Aquands

#### Clave para Grandes Grupos

DAA. Aquands que tienen, en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media de verano del suelo que:

1. Es de 8 °C o más fría, si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría, si existe un horizonte O.

**Gelaquands**, pág. 79

DAB. Otros Aquands que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryaquands**, pág. 78

DAC. Otros Aquands que tienen, en la mitad o más de cada pedón, un horizonte plácico dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Placaquands**, pág. 80

DAD. Otros Aquands que tienen, en el 75 por ciento o más de cada pedón, una horizonte cementado que tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Duraquands**, pág. 78

DAE. Otros Aquands que tienen una retención de agua a 1500 kPa menor de 15 por ciento en muestras secadas-al-aire

y menor de 30 por ciento en muestras no secadas, en 60 por ciento o más de su espesor, *ya sea*:

1. Dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; o

2. Entre la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico.

**Vitraquands**, pág. 80

DAF. Otros Aquands que tienen un epipedón melánico.

**Melanaquands**, pág. 79

DAG. Otros Aquands que tienen episaturación.

**Epiaquands**, pág. 79

DAH. Otros Aquands.

**Endoquands**, pág. 78

## Cryaquands

### Claves para Subgrupos

DABA. Cryaquands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Lithic Cryaquands**

DABB. Otros Cryaquands que tienen un epipedón hístico.

**Histic Cryaquands**

DABC. Otros Cryaquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

**Thaptic Cryaquands**

DABD. Otros Cryaquands.

**Typic Cryaquands**

## Duraquands

### Clave para Subgrupos

DADA. Duraquands que tienen un epipedón hístico.

**Histic Duraquands**

DADB. Otros Duraquands que tienen bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCI 1N totalizando menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, entre 25 y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Acraquoxíc Duraquands**

DADC. Otros Duraquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

**Thaptic Duraquands**

DADD. Otros Duraquands.

**Typic Duraquands**

## Endoquands

### Clave para Subgrupos

DAHA. Endoquands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Lithic Endoquands**

DAHB. Otros Endoquands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Duric Endoquands**

DAHC. Otros Endoquands que tienen un epipedón hístico.

**Histic Endoquands**

DAHD. Otros Endoquands que tienen más de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de  $\text{Al}^{3+}$  (por KCI, 1N) en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Alic Endoquands**

DAHE. Otros Endoquands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a 1500-kPa de 70 por ciento o más en toda una capa de 35 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte

superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Endoaquands**

DAHF. Otros Endoaquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Endoaquands**

DAHG. Otros Endoaquands.

#### **Typic Endoaquands**

### **Epiaquands**

#### **Clave para Subgrupos**

DAGA. Epiaquands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor con 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Duric Epiaquands**

DAGB. Otros Epiaquands que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Epiaquands**

DAGC. Otros Epiaquands que tienen más de 2.0 cmol(+)/kg, de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Alic Epiaquands**

DAGD. Otros Epiaquands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a 1500-kPa de 70 por ciento o más en toda una capa de 35 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Epiaquands**

DAGE. Otros Epiaquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en

húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Epiaquands**

DAGF. Otros Epiaquands.

#### **Typic Epiaquands**

### **Gelaquands**

#### **Clave para Subgrupos**

DAAA. Gelaquands que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Gelaquands**

DAAB. Otros Gelaquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Gelaquands**

DAAC. Otros Gelaquands.

#### **Typic Gelaquands**

### **Melanaquands**

#### **Clave para Subgrupos**

DAFA. Melanaquands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Melanaquands**

DAFB. Otros Melanaquands que tienen bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina, de uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acraquoxic Melanaquands**

DAFC. Otros Melanaquands que tienen:

1. En muestras sin secarse, una retención de agua a 1500 kPa de 70 por ciento o más, a través de una capa de 35 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y colores del epipedón mólico en una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de

la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Pachic Melanaquands**

DAFD. Otros Melanaquands que tienen, en muestras sin secarse, una retención de agua a 1500 kPa de 70 por ciento o más, a través de una capa de 35 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Melanaquands**

DAFE. Otros Melanaquands que tienen más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y colores del epipedón mólico en una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Pachic Melanaquands**

DAFF. Otros Melanaquands que tienen, a una profundidad entre 40 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Melanaquands**

DAFG. Otros Melanaquands.

#### **Typic Melanaquands**

### **Placaquands**

#### **Clave para Subgrupos**

DACA. Placaquands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Placaquands**

DACB. Otros Placaquands que tienen *ambas*:

1. Un epipedón hístico; y
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Duric Histic Placaquands**

DACC. Otros Placaquands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y su límite superior dentro de

los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Duric Placaquands**

DACD. Otros Placaquands que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Placaquands**

DACE. Otros Placaquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Placaquands**

DACF. Otros Placaquands.

#### **Typic Placaquands**

### **Vitraquands**

#### **Clave para Subgrupos**

DAEA. Vitraquands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Vitraquands**

DAEB. Otros Vitraquands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Duric Vitraquands**

DAEC. Otros Vitraquands que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Vitraquands**

DAED. Otros Vitraquands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Vitraquands**

DAEE. Otros Vitraquands.

#### **Typic Vitraquands**

## Cryands

### Clave para Grandes Grupos

DCA. Cryands que tienen, en 75 por ciento o más de cada pedón, un horizonte cementado que tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Duricryands**, pág. 81

DCB. Otros Cryands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a 1500-kPa de 100 por ciento o más, por promedio ponderado, a través de *ya sea*:

1. Una o más capas con un espesor total de 35 cm entre la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*

2. 60 por ciento o más del espesor del horizonte entre *ya sea* la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico.

**Hydrocryands**, pág.83

DCC. Otros Cryands que tienen un epipedón melánico.

**Melanocryands**, pág.83

DCD. Otros Cryands que tienen una capa que reúne los requisitos de profundidad, espesor y carbono- orgánico de un epipedón melánico.

**Fulvicryands**, pág.82

DCE. Otros Cryands que tienen menos de 15 por ciento de agua retenida a 1500 kPa, en muestras secadas-al-aire y de menos de 30 por ciento en muestras sin secar en 60 por ciento o más de su espesor *ya sea*:

1. Dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*

2. Entre la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico.

**Vitricryands**, pág.83

DCF. Otros Cryands.

**Haplocryands**, pág.82

## Duricryands

### Clave para Subgrupos

DCAA. Duricryands que tienen, en algún subhorizonte a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Duricryands

DCAB. Otros Duricryands que tienen *ambas*:

1. Sin horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg, de Al<sup>3+</sup> (por KCl, IN) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Saturación con agua en una o más capas encima del horizonte cementado en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

### Eutric Oxyaquic Duricryands

DCAC. Otros Duricryands que están saturados con agua en una o más capas encima del horizonte cementado en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Duricryands

DCAD. Otros Duricryands que no tienen horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg, de Al<sup>3+</sup> (por KCl, IN) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Eutric Duricryands

DCAE. Otros Duricryands.

### Typic Duricryands

## Fulvicryands

### Clave para Subgrupos

DCDA. Fulvicryands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Fulvicryands

DCDB. Otros Fulvicryands que tienen *ambas*:

1. Sin horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. A través de una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera:
  - a. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico, por promedio ponderado; y
  - b. Más de 4.0 por ciento de carbono orgánico en todas partes.

#### Eutric Pachic Fulvicryands

DCDC. Otros Fulvicryands que no tienen horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Eutric Fulvicryands

DCDD. Otros Fulvicryands que tienen, a través de una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera:

1. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico, por promedio ponderado; y
2. Más de 4.0 por ciento de carbono orgánico en todas partes.

#### Pachic Fulvicryands

DCDE. Otros Fulvicryands que tienen, una retención de agua a 1500 kPa de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y menos de 30 por ciento, en muestras sin secar, a través de una o más capas que tienen propiedades ándicas y tienen un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Vitric Fulvicryands

DCDF. Otros Fulvicryands.

### Typic Fulvicryands

## Haplocryands

### Clave para Subgrupos

DCFA. Haplocryands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Haplocryands

DCFB. Otros Haplocryands que tienen, en algún subhorizonte a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; o
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; o
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Haplocryands

DCFC. Otros Haplocryands que están saturados con agua en una o más capas encima del horizonte cementado en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Haplocryands

DCFD. Otros Haplocryands que tienen más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Alic Haplocryands

DCFE. Otros Haplocryands que tienen un horizonte álbico que sobreyace a un horizonte cámbico en 50 por ciento o más de cada pedón o tienen un horizonte espódico en 50 por ciento o más de cada pedón.

#### Spodic Haplocryands

DCFF. Otros Haplocryands que tienen bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo

mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acraquoxic Haplocryands**

DCFG. Otros Haplocryands que tienen, una retención de agua a 1500 kPa de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y menos de 30 por ciento, en muestras sin secar, a través de una o más capas que tienen propiedades ándicas y tienen un espesor total de 25 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Vitric Haplocryands**

DCFH. Otros Haplocryands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Haplocryands**

DCFI. Otros Haplocryands que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Haplocryands**

DCFJ. Otros Haplocryands.

#### **Typic Haplocryands**

### **Hydrocryands**

#### **Clave para Subgrupos**

DCBA. Hydrocryands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Hydrocryands**

DCBB. Otros Hydrocryands que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Placic Hydrocryands**

DCBC. Otros Hydrocryands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos

redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*

3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### **Aquic Hydrocryands**

DCBD. Otros Hydrocryands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Hydrocryands**

DCBE. Otros Hydrocryands.

#### **Typic Hydrocryands**

### **Melanocryands**

#### **Clave para Subgrupos**

DCCA. Melanocryands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Melanocryands**

DCCB. Otros Melanocryands que tienen, una retención de agua a 1500 kPa de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y menos de 30 por ciento, en muestras sin secar, a través de una o más capas que tienen propiedades ándicas y tienen un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Vitric Melanocryands**

DCCC. Otros Melanocryands.

#### **Typic Melanocryands**

### **Vitricryands**

#### **Clave para Subgrupos**

DCEA. Vitricryands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Vitricryands**

DCEB. Otros Vitricryands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### **Aquic Vitricryands**

DCEC. Otros Vitricryands que están saturados con agua en una o más capas encima del horizonte cementado en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Vitricryands**

DCED. Otros Vitricryands que tienen un horizonte álbico que sobreyace a un horizonte cámbico en 50 por ciento o más de cada pedón o tienen un horizonte espódico en 50 por ciento o más de cada pedón.

#### **Spodic Vitricryands**

DCEE. Otros Vitricryands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Vitricryands**

DCEF. Otros Vitricryands que tienen un régimen de humedad xérico y un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Xeric Vitricryands**

DCEG. Otros Vitricryands que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Vitricryands**

DCEH. Otros Vitricryands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de los 50 cm superiores o en todo el horizonte argílico o kándico, si es menor de 50 cm de espesor.

#### **Ultic Vitricryands**

DCEI. Otros Vitricryands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm

desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Alfic Vitricryands**

DCEJ. Otros Vitricryands que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Vitricryands**

DCEK. Otros Vitricryands.

#### **Typic Vitricryands**

### **Gelands**

#### **Clave para Grandes Grupos**

DBA. Todos los Gelands se consideran como Vitrigelands.

**Vitrigelands**, pág. 84

#### **Vitrigelands**

#### **Clave para Subgrupos**

DBAA. Vitrigelands que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Vitrigelands**

DBAB. Otros Vitrigelands.

#### **Typic Vitrigelands**

### **Torrands**

#### **Clave para Grandes Grupos**

DDA. Torrands que tienen, en 75 por ciento o más de cada pedón, un horizonte cementado que tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Duritorrands**, pág. 85

DDB. Otros Torrands que tienen menos de 15 por ciento de agua retenida a 1500 kPa, en muestras secadas-al-aire en el 60 por ciento o más de su espesor ya *sea*:

1. Dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*
2. Entre ya sea la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, un duripán, o un horizonte petrocálcico.

**Vitritorrands**, pág. 85

DDC. Otros Torrands.

**Haplotorrands**, pág. 85

## Duritorrands

### Clave para Subgrupos

DDAA. Duritorrands que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petrocalcic Duritorrands

DDAB. Otros Duritorrands que tienen menos de 15 por ciento de agua retenida a 1500 kPa, en muestras secadas-al-aire en 60 por ciento o más de su espesor ya *sea*:

1. Entre la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto paralítico o un duripán, dentro de esa profundidad; o
2. Entre la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto paralítico o un duripán.

#### Vitric Duritorrands

DDAC. Otros Duritorrands.

#### Typic Duritorrands

## Haplotorrands

### Clave para Subgrupos

DDCA. Haplotorrands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplotorrands

DDCB. Otros Haplotorrands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Duric Haplotorrands

DDCC. Otros Haplotorrands que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Haplotorrands

DDCD. Otros Haplotorrands.

#### Typic Haplotorrands

## Vitritorrands

### Clave para Subgrupos

DDBA. Vitritorrands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Vitritorrands

DDBB. Otros Vitritorrands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen)

de material de suelo cementado y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Duric Vitritorrands

DDBC. Otros Vitritorrands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; o
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; o
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Vitritorrands

DDBD. Otros Vitritorrands que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Vitritorrands

DDBE. Otros Vitritorrands.

#### Typic Vitritorrands

## Udands

### Clave para Grandes Grupos

DHA. Udands que tienen, en la mitad o más de cada pedón, un horizonte plácico dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Placudands, pág. 92

DHB. Otros Udands que tienen, en 75 por ciento o más de cada pedón, un horizonte cementado que tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Durudands, pág. 86

DHC. Otros Udands que tienen un epipedón melánico.

#### Melanudands, pág. 90

DHD. Otros Udands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a 1500-kPa de 100 por ciento o más, por promedio ponderado, a través de *ya sea*:

1. Una o más capas con un espesor total de 35 cm entre la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más

somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*

2. 60 por ciento o más del espesor del horizonte entre la superficie del suelo mineral o la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán o un horizonte petrocálcico.

**Hydrudands**, pág. 89

DHE. Otros Udands que tienen una capa que reúne los requisitos de profundidad, espesor y carbono- orgánico de un epipedón melánico.

**Fulvudands**, pág. 86

DHF. Otros Udands.

**Hapludands**, pág. 87

## Durudands

### Clave para Subgrupos

DHBA. Durudands que tienen, en uno o más horizontes encima del horizonte cementado, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Durudands

DHBB. Otros Durudands que no tienen horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Eutric Durudands

DHBC. Otros Durudands que tienen bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 cm desde la superficie del suelo o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera y el horizonte cementado.

### Acrudoxic Durudands

DHBD. Otros Durudands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de

70 por ciento o más a través de una capa de 35 cm o más de espesor sobre el horizonte cementado.

### Hydric Durudands

DHBE. Otros Durudands que tienen más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y colores del epipedón mólico en una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Pachic Durudands

DHBF. Otros Durudands.

### Typic Durudands

## Fulvudands

### Clave para Subgrupos

DHEA. Fulvudands que tienen *ambas*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Sin horizontes con más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera y el contacto lítico.

### Eutric Lithic Fulvudands

DHEB. Otros Fulvudands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Lithic Fulvudands

DHEC. Otros Fulvudands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Fulvudands

DHED. Otros Fulvudands que están saturados con agua en una o más capas encima del horizonte cementado en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Fulvudands

DHEE. Otros Fulvudands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de 70 por ciento o más a través de una capa de 35 cm o más de espesor dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Hydric Fulvudands

DHEF. Otros Fulvudands que tienen bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con  $\text{KCl}$  1N de menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina de uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Acraquoxic Fulvudands

DHEG. Otros Fulvudands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### Ultic Fulvudands

DHEH. Otros Fulvudands que tienen *ambas*:

1. Sin horizontes con más de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de  $\text{Al}^{3+}$  (por  $\text{KCl}$ , 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. A través de una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera:
  - a. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico, por promedio ponderado; *y*
  - b. Más de 4.0 por ciento de carbono orgánico en todas partes.

#### Eutric Pachic Fulvudands

DHEI. Otros Fulvudands que no tienen horizontes con más de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de  $\text{Al}^{3+}$  (por  $\text{KCl}$ , 1N) en la fracción de tierra-fina y con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Eutric Fulvudands

DHEJ. Otros Fulvudands que tienen, a través de una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera:

1. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico, por promedio ponderado; *y*
2. Más de 4.0 por ciento de carbono orgánico en todas partes.

#### Pachic Fulvudands

DHEK. Otros Fulvudands que tienen, a una profundidad entre 40 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### Thaptic Fulvudands

DHEL. Otros Fulvudands.

#### Typic Fulvudands

### Hapludands

#### Clave para Subgrupos

DHFA. Hapludands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Hapludands

DHFB. Otros Hapludands que tienen condiciones antrácuicas.

#### Anthraquic Hapludands

DHFC. Otros Hapludands que tienen *ambas*:

1. Un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. En uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:
  - a. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
  - b. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*

- c. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Duric Hapludands

DHFD. Otros Hapludands que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de material de suelo cementado y tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Duric Hapludands

DHFE. Otros Hapludands que tienen en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Hapludands

DHFF. Otros Hapludands que están saturados con agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Hapludands

DHFG. Otros Hapludands que tienen más de 2.0 cmol(+)/kg de  $Al^{3+}$  (por KCl, 1N) en la fracción de tierra-fina, en uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más, a una profundidad entre 25 y 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Alic Hapludands

DHFH. Otros Hapludands que tienen *ambas*:

1. Bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm a partir de la superficie del suelo o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. En muestras no secadas, una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de 70 por ciento o más a través de una

capa de 35 cm o más de espesor, dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Acrudoxic Hydric Hapludands

DHFI. Otros Hapludands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, *ambas*:

1. Bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más; *y*
2. Una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### Acrudoxic Thaptic Hapludands

DHFJ. Otros Hapludands que tienen *ambas*:

1. Bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm a partir de la superficie del suelo o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:
  - a. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
  - b. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### Acrudoxic Ultic Hapludands

DHFK. Otros Hapludands que tienen bases extractables (por  $NH_4OAc$ ) más  $Al^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 2.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Acrudoxic Hapludands

DHFL. Otros Hapludands que tienen una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y menos de 30 por ciento en muestras no secadas a través de una o más capas que tienen propiedades ándicas de suelo y tienen un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo

mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Vitric Hapludands**

DHFM. Otros Hapludands que tienen *ambas*:

1. En muestras no secadas, una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de 70 por ciento o más a través de una capa de 35 cm o más de espesor, dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. A una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Hydric Thaptic Hapludands**

DHFN. Otros Hapludands que tienen, en muestras no secadas, una retención de agua a una tensión de 1500 kPa de 70 por ciento o más a través de una capa de 35 cm o más de espesor, dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Hapludands**

DHFO. Otros Hapludands que tienen *ambas*:

1. Una suma de bases extractables de más de 25.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina a través de uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm a una profundidad entre 25 y 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. A una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Eutric Thaptic Hapludands**

DHFP. Otros Hapludands que tienen a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su

espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Hapludands**

DHFQ. Otros Hapludands que tienen una suma de bases extractables de más de 25.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina a través de uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm a una profundidad entre 25 y 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Eutric Hapludands**

DHFR. Otros Hapludands que tienen un horizonte óxico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Oxic Hapludands**

DHFS. Otros Hapludands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### **Ultic Hapludands**

DHFT. Otros Hapludands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Alfic Hapludands**

DHFU. Otros Hapludands.

#### **Typic Hapludands**

### **Hydrudands**

#### **Clave para Subgrupos**

DHDA. Hydrudands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Hydrudands**

DHDB. Otros Hydrudands que tienen en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### **Aquic Hydrudands**

DHDC. Otros Hydrudands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, *ambas*:

1. Bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más; *y*
2. Una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Acrudoxic Thaptic Hydrudands**

DHDD. Otros Hydrudands que tienen, bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acrudoxic Hydrudands**

DHDE. Otros Hydrudands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Hydrudands**

DHDF. Otros Hydrudands que tienen una suma de bases extractables de más de 25.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra fina a través de uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm a una profundidad entre 25 y 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Eutric Hydrudands**

DHDG. Otros Hydrudands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### **Ultic Hydrudands**

DHDH. Otros Hydrudands.

#### **Typic Hydrudands**

### **Melanudans**

#### **Clave para Subgrupos**

DHCA. Melanudands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Lithic Melanudands**

DHCB. Otros Melanudands que tienen condiciones antrácuicas.

#### **Anthraquic Melanudands**

DHCC. Otros Melanudands que tienen en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### **Aquic Melanudands**

DHCD. Otros Melanudands que tienen, *ambas*:

1. Bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. A 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través de una o más capas con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de

una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acrudoxic Vitric Melanudands**

DHCE. Otros Melanudands que tienen, *ambas*:

1. Bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con  $\text{KCl}$  1N de menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y

2. En muestras no secadas a 1500 kPa una retención de agua de 70 por ciento o más, a través de una capa con un espesor de 35 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acrudoxic Hydric Melanudands**

DHCF. Otros Melanudands que tienen, bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con  $\text{KCl}$  1N totalizando menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Acrudoxic Melanudands**

DHCG. Otros Melanudands que tienen, *ambas*:

1. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y los colores del epipedón mólico a través de una capa de 50 cm o más de espesor, dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y

2. A 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través de una o más capas con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Pachic Vitric Melanudands**

DHCH. Otros Melanudands que tienen a 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través de una o más capas con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Vitric Melanudands**

DHCI. Otros Melanudands que tienen, *ambas*:

1. En muestras no secadas a 1500 kPa una retención de agua de 70 por ciento o más, a través de una capa con un espesor de 35 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y

2. Más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y los colores del epipedón mólico a través de una capa de 50 cm o más de espesor, dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Pachic Melanudands**

DHCJ. Otros Melanudands que tienen más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y los colores del epipedón mólico a través de una capa de 50 cm o más de espesor, dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Pachic Melanudands**

DHCK. Otros Melanudands que tienen en muestras no secadas a 1500 kPa una retención de agua de 70 por ciento o más, a través de una capa con un espesor de 35 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Hydric Melanudands**

DHCL. Otros Melanudands que tienen, a una profundidad entre 40 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Melanudands**

DHCM. Otros Melanudands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y

2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### **Ultic Melanudands**

DHCN. Otros Melanudands que tienen una suma de bases extractables de más de 25.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra fina a través de uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm a una profundidad entre 25 y 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Eutric Melanudands**

DHCO. Otros Melanudands.

### Typic Melanudands

### Placudands

#### Clave para Subgrupos

DHAA. Placudands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Placudands

DHAB. Otros Placudands que tienen en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y el horizonte plácico, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Placudands

DHAC. Otros Placudands que tienen, bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N de menos de 2.0  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 30 cm o más, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Acrudoxic Placudands

DHAD. Otros Placudands que tienen en muestras no secadas a 1500 kPa una retención de agua de 70 por ciento o más, a través de una capa con un espesor de 35 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Hydric Placudands

DHAE. Otros Placudands.

#### Typic Placudands

### Ustands

#### Clave para Grandes Grupos

DGA. Ustands que tienen, en el 75 por ciento o más de cada pedón, un horizonte cementado que tiene su límite superior dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo

mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

**Durustands**, pág. 92

DGB. Otros Ustands.

**Haplustands**, pág. 92

### Durustands

#### Clave para Subgrupos

DGAA. Durustands que tienen en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Durustands

DGAB. Otros Durustands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### Thaptic Durustands

DGAC. Otros Durustands que tienen un epipedón melánico, mólico o úmbrico.

#### Humic Durustands

DGAD. Otros Durustands.

#### Typic Durustands

### Haplustands

#### Clave para Subgrupos

DGBA. Haplustands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Haplustands

DGBB. Otros Haplustands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la

superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### **Aquic Haplustands**

DGBC. Otros Haplustands que tienen *ambas*:

1. Bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 15.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina en uno o más horizontes con un espesor total de 60 cm o más, dentro de los 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*

2. A 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través de una o más capas con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Dystric Vitric Haplustands**

DGBD. Otros Haplustands que tienen a 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través de una o más capas con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Vitric Haplustands**

DGBE. Otros Haplustands que tienen más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y los colores del epipedón mólico a través de una capa de 50 cm o más de espesor, dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Pachic Haplustands**

DGBF. Otros Haplustands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en

húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### **Thaptic Haplustands**

DDBG. Otros Haplustands que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Calcic Haplustands**

DGBH. Otros Haplustands que tienen bases extractables (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) más  $\text{Al}^{3+}$  extractable con KCl 1N totalizando menos de 15.0 cmol(+)/kg en la fracción de tierra-fina a través de uno o más horizontes con un espesor total de 60 cm o más, dentro de los 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Dystric Haplustands**

DGBI. Otros Haplustands que tienen un horizonte óxico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Oxic Haplustands**

DGBJ. Otros Haplustands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*

2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores o en todo el horizonte argílico o kándico si tienen menos de 50 cm de espesor.

#### **Ultic Haplustands**

DGBK. Otros Haplustands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### **Alfic Haplustands**

DGBL. Otros Haplustands que tienen un epipedón melánico, mólico o úmbrico.

#### **Humic Haplustands**

DGBM. Otros Haplustands.

#### **Typic Haplustands**

### **Vitrands**

#### **Clave para Grandes Grupos**

DFA. Vitrands que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustivitrands**, pág. 94

DFB. Otros Vitrandos.

**Udivitrands**, pág. 94

## Udivitrands

### Clave para Subgrupos

DFBA. Udivitrands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Lithic Udivitrands

DFBB. Otros Udivitrands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Udivitrands

DFBC. Otros Udivitrands que están saturados con agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Udivitrands

DFBD. Otros Udivitrands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

### Thaptic Udivitrands

DFBE. Otros Udivitrands que tienen *ambas*:

1. Un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*

2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de los 50 cm superiores del horizonte argílico o kándico.

### Ultic Udivitrands

DFBF. Otros Udivitrands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Alfic Udivitrands

DFBG. Otros Udivitrands que tienen un epipedón melánico, mólico o úmbrico.

### Humic Udivitrands

DFBH. Otros Udivitrands.

### Typic Udivitrands

## Ustivitrands

### Clave para Subgrupos

DFAA. Ustivitrands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Lithic Ustivitrands

DFAB. Otros Ustivitrands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Ustivitrands

DFAC. Otros Ustivitrands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

### Thaptic Ustivitrands

DFAD. Otros Ustivitrands que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Calcic Ustivitrands

DFAE. Otros Ustivitrands que tienen un epipedón melánico, mólico o úmbrico.

#### Humic Ustivitrands

DFAF. Otros Ustivitrands.

#### Typic Ustivitrands

## Xerands

### Clave para Grandes Grupos

DEA. Xerands que tienen a 1500 kPa una retención de agua de menos de 15 por ciento en muestras secadas al aire y de menos de 30 por ciento en muestras no secadas, a través del 60 por ciento o más del espesor *ya sea*:

1. Dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, si no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán u horizonte petrocálcico dentro de esa profundidad; *o*
2. Entre desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, y un contacto dénsico, lítico o paralítico, duripán u horizonte petrocálcico.

#### Vitrixerands, pág. 96

DEB. Otros Xerands que tienen un epipedón melánico.

#### Melanoxerands, pág. 96

DEC. Otros Xerands.

#### Haploxerands, pág. 95

## Haploxerands

### Clave para Subgrupos

DECA. Haploxerands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Lithic Haploxerands

DECB. Otros Haploxerands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*

2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*

3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

#### Aquic Haploxerands

DECC. Otros Haploxerands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

#### Thaptic Haploxerands

DECD. Otros Haploxerands que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Haploxerands

DECE. Otros Haploxerands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores.

#### Ultic Haploxerands

DECF. Otros Haploxerands que tienen *ambas*:

1. Un epipedón mólico o úmbrico; *y*
2. Un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Alfic Humic Haploxerands

DECG. Otros Haploxerands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

#### Alfic Haploxerands

DECH. Otros Haploxerands que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Humic Haploxerands

DECI. Otros Haploxerands.

### Typic Haploxerands

## Melanoxerands

### Clave para Subgrupos

DEBA. Melanoxerands que tienen más de 6.0 por ciento de carbono orgánico y los colores de un epipedón mólico a través de una capa de 50 cm o más de espesor dentro de los 60 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Pachic Melanoxerands

DEBB. Otros Melanoxerands.

### Typic Melanoxerands

## Vitrixerands

### Clave para Subgrupos

DEAA. Vitrixerands que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Lithic Vitrixerands

DEAB. Otros Vitrixerands que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm, desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o más* de las siguientes:

1. 2 por ciento o más de concentraciones redox; *o*
2. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos, en empobrecimientos redox sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes; *o*
3. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiril-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

### Aquic Vitrixerands

DEAC. Otros Vitrixerands que tienen, a una profundidad entre 25 y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o

de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera, una capa de 10 cm o más de espesor con más de 3.0 por ciento de carbono orgánico y colores de un epipedón mólico en todo su espesor, subyaciendo uno o más horizontes con un espesor total de 10 cm o más que tienen un color del value, en húmedo, de 1 unidad o más, más alta y un contenido de carbono-orgánico de 1 por ciento o más (absoluto), más bajo.

### Thaptic Vitrixerands

DEAD. Otros Vitrixerands que tienen *ambas*:

1. Un epipedón melánico, mólico o úmbrico; y
2. Un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Alfic Humic Vitrixerands

DEAE. Otros Vitrixerands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene *ambas*:

1. Un límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera; y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 35 por ciento a través de sus 50 cm superiores o en todo el horizonte argílico o kándico si es menor de 50 cm de espesor.

### Ultic Vitrixerands

DEAF. Otros Vitrixerands que tienen un horizonte argílico o kándico que tiene su límite superior dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que esté más somera.

### Alfic Vitrixerands

DEAG. Otros Vitrixerands que tienen un epipedón melánico, mólico o úmbrico.

### Humic Vitrixerands

DEAH. Otros Vitrixerands.

### Typic Vitrixerands

## CAPÍTULO 7

### *Aridisols*

#### Clave para Subórdenes

GA. Aridisols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryids**, pág. 112

GB. Otros Aridisols que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Salids**, pág. 122

GC. Otros Aridisols que tienen un duripán cuyo límite superior está dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Durids**, pág. 115

GD. Otros Aridisols que tienen un horizonte gypsico o petrogypsico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y carecen de un horizonte petrocálcico por encima de cualquiera de esos horizontes.

**Gypsids**, pág. 118

GE. Otros Aridisols que tienen un horizonte argílico o nátrico y no tienen un horizonte petrocálcico cuyo límite superior esté dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Argids**, pág. 97

GF. Otros Aridisols que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico cuyo límite superior está dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Calcids**, pág. 105

GG. Otros Aridisols.

**Cambids**, pág. 108

#### Argids

##### Clave para Grandes Grupos

GEA. Argids que tienen un duripán o un horizonte petrocálcico o petrogypsico cuyo límite superior esté dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

**Petroargids**, pág. 105

GEB. Otros Argids que tienen un horizonte nátrico.

**Natrargids**, pág. 102

GEC. Otros Argids que no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, y tienen:

1. Un incremento de arcilla de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm dentro del horizonte argílico o en su límite superior; *o*

2. Un horizonte argílico que se extiende hasta 150 cm o más desde la superficie del suelo, que no tiene un decremento de arcilla con el incremento de la profundidad de 20 por ciento o más (relativo) del máximo contenido de arcilla, y tiene, en el 50 por ciento o más de la matriz, en alguna parte entre los 100 y 150 cm, *ya sea*:

a. Un hue de 7.5 YR o más rojizo y un chroma de 5 o más; *o*

b. Un hue de 7.5 YR o más rojizo y un value, en húmedo, de 3 o menos y un value, en seco, de 4 o menos.

**Paleargids**, pág. 104

GED. Otros Argids que tienen un horizonte gypsico cuyo límite superior está dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

**Gypsiargids**, pág. 99

GEE. Otros Argids que tienen un horizonte cálcico cuyo límite superior está dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

**Calciargids**, pág. 97

GEF. Otros Argids.

**Haplargids**, pág. 100

#### Calciargids

##### Clave para Subgrupos

GEEA. Calciargids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Calciargids**

GEEB. Otros Calciargids que tienen *tanto*:

1. *Una o ambas* de las siguientes

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y un régimen de humedad del suelo que limita con un xérico.

#### **Xeretic Calciargids**

GEEC. Otros Calciargids que tienen *tanto*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustertic Calciargids**

GEED. Otros Calciargids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Calciargids**

GEEE. Otros Calciargids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más por año en años normales.

#### **Aquic Calciargids**

GEEF. Otros Calciargids que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la

superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más; y

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Arenic Ustic Calciargids**

GEEG. Otros Calciargids que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Calciargids**

GEEH. Otros Calciargids que tienen la siguiente combinación de características:

1. Tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Durinodic Xeric Calciargids**

GEEI. Otros Calciargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Calciargids**

GEEJ. Otros Calciargids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es 5 °C o más alta y tiene un régimen de humedad del suelo que limita con un régimen xérico; y
2. Tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Xeric Calciargids**

GEEK. Otros Calciargids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es 5 °C o más alta y tiene un régimen de humedad del suelo que limita con un régimen ústico; y

2. Tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Ustic Calciargids**

GEEL. Otros Calciargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Calciargids**

GEEM. Otros Calciargids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Calciargids**

GEEN. Otros Calciargids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Calciargids**

GEEQ. Otros Calciargids que están secos en la sección de control de humedad en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Calciargids**

GEEP. Otros Calciargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas

partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es 5 °C o más alta y tiene un régimen de humedad del suelo que limita con un régimen ústico.

#### **Ustic Calciargids**

GEEQ. Otros Calciargids.

#### **Typic Calciargids**

#### **Gypsiargids**

##### **Clave para Subgrupos**

GEDA. Gypsiargids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o

2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más por año en años normales.

#### **Aquic Gypsiargids**

GEDB. Otros Gypsiargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Gypsiargids**

GEDC. Otros Gypsiargids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Gypsiargids**

GEDD. Otros Gypsiargids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (porcentaje), es 30 o más.

#### **Vitrandic Gypsiargids**

GEDE. Otros Gypsiargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Gypsiargids**

GEDF. Otros Gypsiargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Gypsiargids**

GEDG. Otros Gypsiargids.

#### **Typic Gypsiargids**

### **Haplargids**

#### **Clave para Subgrupos**

GEFA. Haplargids que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Un horizonte argílico discontinuo a través de cada pedón.

#### **Lithic Ruptic-Entic Haplargids**

GEFB. Otros Haplargids que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Lithic Xeric Haplargids**

GEFC. Otros Haplargids que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Lithic Ustic Haplargids**

GEFD. Otros Haplargids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Haplargids**

GEFE. Otros Haplargids que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xerertic Haplargids**

GEFF. Otros Haplargids que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustertic Haplargids**

GEFG. Otros Haplargids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico si está más somero.

#### **Vertic Haplargids**

GEFH. Otros Haplargids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Haplargids**

GEFI. Otros Haplargids que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Arenic Ustic Haplargids**

GEFJ. Otros Haplargids que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Haplargids**

GEFK. Otros Haplargids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Durinodic Xeric Haplargids**

GEFL. Otros Haplargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Haplargids**

GEFM. Otros Haplargids que:

1. Tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15

cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; *y*

2. Están secos en todas partes de la sección de control por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Petronodic Ustic Haplargids**

GEFN. Otros Haplargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Haplargids**

GEFO. Otros Haplargids que tienen:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Haplargids**

GEFP. Otros Haplargids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Haplargids**

GEFQ. Otros Haplargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Haplargids**

GEFR. Otros Haplargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ustic Haplargids

GEFS. Otros Haplargids.

#### Typic Haplargids

### Natrargids

#### Clave para Subgrupos

GEBA. Natrargids que tienen las siguientes:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Lithic Xeric Natrargids

GEBB. Otros Natrargids que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), en la que el suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Lithic Ustic Natrargids

GEBC. Otros Natrargids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Natrargids

GEBD. Otros Natrargids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad limita con un xérico; y
2. Tienen *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en la mayoría de los años, y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Xerertic Natrargids

GEBE. Otros Natrargids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad limita con un ústico; y
2. Tienen *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en la mayoría de los años, y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Ustertic Natrargids

GEBF. Otros Natrargids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en la mayoría de los años, y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Natrargids

GEBG. Otros Natrargids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### Aquic Natrargids

GEBH. Otros Natrargids que tienen las siguientes:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tienen un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; y
2. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Durinodic Xeric Natrargids

GEBI. Otros Natrargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Natrargids**

GEBJ. Otros Natrargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Natrargids**

GEBK. Otros Natrargids que tienen:

1. Esqueletanes que cubren 10 por ciento o más de las superficies de los agregados a una profundidad de 2.5 cm o más abajo del límite superior del horizonte nátrico; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Glossic Ustic Natrargids**

GEBL. Otros Natrargids que tienen:

1. Un porcentaje de sodio intercambiable menor de 15 (o una RAS menor de 13) en 50 por ciento o más del horizonte nátrico; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Haplic Ustic Natrargids**

GEBM. Otros Natrargids que tienen:

1. Un porcentaje de sodio intercambiable menor de 15 (o una RAS menor de 13) en 50 por ciento o más del horizonte nátrico; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Haploxeralfic Natrargids**

GEBN. Otros Natrargids que tienen un porcentaje de sodio intercambiable menor de 15 (o una RAS menor de 13) en el 50 por ciento o más del horizonte nátrico.

#### **Haplic Natrargids**

GEBO. Otros Natrargids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo

(acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes, con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más del 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Natrargids**

GEBP. Otros Natrargids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Natrargids**

GEBQ. Otros Natrargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Natrargids**

GEBR. Otros Natrargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Natrargids**

GEB S. Otros Natrargids que tienen esqueletanes que cubren 10 por ciento o más de las superficies de los agregados a una profundidad 2.5 cm o más abajo del límite superior del horizonte nátrico.

#### **Glossic Natrargids**

GEBT. Otros Natrargids.

#### **Typic Natrargids**

## Paleargids

### Clave para Subgrupos

GECA. Paleargids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Vertic Paleargids

GEGB. Otros Paleargids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

### Aquic Paleargids

GECC. Otros Paleargids que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

### Arenic Ustic Paleargids

GECD. Otros Paleargids que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

### Arenic Paleargids

GECE. Otros Paleargids que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

### Calcic Paleargids

GECF. Otros Paleargids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo

(acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

### Durinodic Xeric Paleargids

GECH. Otros Paleargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

### Durinodic Paleargids

GECH. Otros Paleargids que:

1. Tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

### Petronodic Ustic Paleargids

GECI. Otros Paleargids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

### Petronodic Paleargids

GECH. Otros Paleargids que tienen:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

### Vitrikerandic Paleargids

GECK. Otros Paleargids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Paleargids**

GECL. Otros Paleargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Paleargids**

GECLM. Otros Paleargids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad, por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Paleargids**

GECLN. Otros Paleargids.

#### **Typic Paleargids**

### **Petroargids**

#### **Clave para Subgrupos**

GEAA. Petroargids que tienen las siguientes:

1. Un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Petrogypic Ustic Petroargids**

GEAB. Otros Petroargids que tienen un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrogypic Petroargids**

GEAC. Otros Petroargids que tienen:

1. Un duripán con su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Duric Xeric Petroargids**

GEAD. Otros Petroargids que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

#### **Duric Petroargids**

GEAE. Otros Petroargids que tienen un horizonte nátrico.

#### **Natric Petroargids**

GEAF. Otros Petroargids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Petroargids**

GEAG. Otros Petroargids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Petroargids**

GEAH. Otros Petroargids.

#### **Typic Petroargids**

### **Calcids**

#### **Clave para Grandes Grupos**

GFA. Calcids que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrocalcids, pág. 107**

GFB. Otros Calcids.

#### **Haplocalcids, pág. 105**

### **Haplocalcids**

#### **Clave para Subgrupos**

GFBA. Haplocalcids que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Lithic Xeric Haplocalcids**

GFBB. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o

más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Lithic Ustic Haplocalcids**

GFBC. Otros Haplocalcids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm desde la superficie del suelo.

#### **Lithic Haplocalcids**

GFBD. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Grietas dentro de los 125 cm desde la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Haplocalcids**

GFBE. Otros Haplocalcids que:

1. Están ya *sea*:
  - a. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en *una o más* capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o
  - b. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales; y
2. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Aquic Durinodic Haplocalcids**

GFBF. Otros Haplocalcids que están ya *sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Haplocalcids**

GFBG. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Un duripán que tiene su límite superior dentro de los 150 cm desde la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Duric Xeric Haplocalcids**

GFBH. Otros Haplocalcids que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

#### **Duric Haplocalcids**

GFBI. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Durinodic Xeric Haplocalcids**

GFBJ. Otros Haplocalcids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Haplocalcids**

GFBK. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Petronodic Xeric Haplocalcids**

GFBL. Otros Haplocalcids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; y
2. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Petronodic Ustic Haplocalcids**

GFBM. Otros Haplocalcids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Haplocalcids**

GFBN. Otros Haplocalcids que tienen *tanto*:

1. Un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tiene un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Sodic Xeric Haplocalcids

GFBO. Otros Haplocalcids que tienen *tanto*:

1. Un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tiene un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Sodic Ustic Haplocalcids

GFBP. Otros Haplocalcids que tienen en un o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales.

#### Sodic Haplocalcids

GFBB. Otros Haplocalcids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 más.

#### Vitrixerandic Haplocalcids

GFBR. Otros Haplocalcids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los

75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Haplocalcids

GFBS. Otros Haplocalcids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Haplocalcids

GFBT. Otros Haplocalcids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ústic Haplocalcids

GFBU. Otros Haplocalcids.

#### Typic Haplocalcids

### Petrocalcids

#### Clave para Subgrupos

GFAA. Petrocalcids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### Aquic Petrocalcids

GFAB. Otros Petrocalcids que tienen un horizonte nátrico.

#### Nátric Petrocalcids

GFAC. Otros Petrocalcids que tienen las siguientes:

1. Un horizonte argílico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeralfic Petrocalcids

GFAD. Otros Petrocalcids que tienen las siguientes:

1. Un horizonte argílico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustalfic Petrocalcids**

GFAE. Otros Petrocalcids que tienen un horizonte argílico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Argic Petrocalcids**

GFAF. Otros Petrocalcids que tienen:

1. Un horizonte cálcico por encima del horizonte petrocálcico; y
2. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Calcic Lithic Petrocalcids**

GFAG. Otros Petrocalcids que tienen un horizonte cálcico por encima del horizonte petrocálcico.

#### **Calcic Petrocalcids**

GFAH. Otros Petrocalcids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Petrocalcids**

GFAI. Otros Petrocalcids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Petrocalcids**

GFAJ. Otros Petrocalcids.

#### **Typic Petrocalcids**

### **Cambids**

#### **Clave para Grandes Grupos**

GGA. Cambids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en año normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o

2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

**Aquicambids**, pág. 108

GGB. Otros Cambids que tienen un duripán o un horizonte petrocálcico o petrogypsico que tiene su límite superior dentro de 150 cm de la superficie del suelo.

**Petrocambids**, pág. 111

GGC. Otros Cambids que tienen un epipedón antrópico.

**Anthracambids**, pág. 108

GGD. Otros Cambids.

**Haplocambids**, pág. 109

#### **Anthracambids**

#### **Clave para Subgrupos**

GGCA. Todos los Anthracambids.

**Typic Anthracambids**

#### **Aquicambids**

#### **Clave para Subgrupos**

GGAA. Aquicambids que tienen en un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales.

**Sodic Aquicambids**

GGAB. Otros Aquicambids que:

1. Tienen en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; y
2. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

**Durinodic Xeric Aquicambids**

GGAC. Otros Aquicambids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

**Durinodic Aquicambids**

GGAD. Otros Aquicambids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Aquicambids**

GGAE. Otros Aquicambids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
- La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Aquicambids**

GGAF. Otros Aquicambids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
- La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Aquicambids**

GGAG. Otros Aquicambids que tienen un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Fluventic Aquicambids**

GGAH. Otros Aquicambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Aquicambids**

GGAI. Otros Aquicambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Aquicambids**

GGAJ. Otros Aquicambids.

### **Typic Aquicambids**

#### **Haplocambids**

##### **Clave para Subgrupos**

GGDA. Haplocambids que tienen:

- Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
- Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Lithic Xeric Haplocambids**

GGDB. Otros Haplocambids que tienen:

- Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
- Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Lithic Ustic Haplocambids**

GGDC. Otros Haplocambids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Haplocambids**

GGDD. Otros Haplocambids que tienen:

- Una o ambas* de las siguientes:
  - Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
  - Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y
- Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xerertic Haplocambids**

GGDE. Otros Haplocambids que tienen:

- Una o ambas* de las siguientes:
  - Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña,

en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustertic Haplocambids**

GGDF. Otros Haplocambids que tienen *al menos* una de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Haplocambids**

GGDG. Otros Haplocambids que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Durinodic Xeric Haplocambids**

GGDH. Otros Haplocambids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o son quebradizos y tienen al menos una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedos.

#### **Durinodic Haplocambids**

GGDI. Otros Haplocambids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo

(acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Petronodic Xeric Haplocambids**

GGDJ. Otros Haplocambids que tienen:

1. Uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Petronodic Ustic Haplocambids**

GGDK. Otros Haplocambids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Haplocambids**

GGDL. Otros Haplocambids que tienen *tanto*:

1. Un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tiene un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Sodic Xeric Haplocambids**

GGDM. Otros Haplocambids que cumplen *ambas* de las siguientes:

1. Tienen, en un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales; *y*

2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Sodic Ustic Haplocambids**

GGDN. Otros Haplocambids que tienen, en un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales.

#### **Sodic Haplocambids**

GGDO. Otros Haplocambids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Haplocambids**

GGDP. Otros Haplocambids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrantic Haplocambids**

GGDQ. Otros Haplocambids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*

2. Tienen un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de los 25 cm de profundidad a una profundidad de 125 cm, o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Xerofluventic Haplocambids**

GGDR. Otros Haplocambids que:

1. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un régimen ústico; *y*

2. Tienen un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de los 25 cm de profundidad a una

profundidad de 125 cm, o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Ustifluventic Haplocambids**

GGDS. Otros Haplocambids que tienen un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de los 25 cm de profundidad a una profundidad de 125 cm, o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Fluventic Haplocambids**

GGDT. Otros Haplocambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Haplocambids**

GGDU. Otros Haplocambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Haplocambids**

GGDV. Otros Haplocambids.

#### **Typic Haplocambids**

### **Petrocambids**

#### **Clave para Subgrupos**

GGBA. Petrocambids que tienen un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, que tiene un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales.

#### **Sodic Petrocambids**

GGBB. Otros Petrocambids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez *o*

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Petrocambids**

GGBC. Otros Petrocambids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Petrocambids**

GGBD. Otros Petrocambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Petrocambids**

GGBE. Otros Petrocambids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Petrocambids**

GGBF. Otros Petrocambids.

#### **Typic Petrocambids**

### **Cryids**

#### **Clave para Grandes Grupos**

GAA. Cryids que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Salicryids, pág. 115**

GAB. Otros Cryids que tienen un duripán, o un horizonte petrocálcico o petrogypsico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrocryids, pág. 114**

GAC. Otros Cryids que tienen un horizonte gypsico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Gypsicryids, pág. 113**

GAD. Otros Cryids que tienen un horizonte argílico o nátrico.

#### **Argicryids, pág. 112**

GAE. Otros Cryids que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Calcicryids, pág. 113**

GAF. Otros Cryids.

### **Haplocryids, pág. 114**

#### **Argicryids**

#### **Clave para Subgrupos**

GADA. Argicryids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Argicryids**

GADB. Otros Argicryids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Argicryids**

GADC. Otros Argicryids que tienen un horizonte nátrico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Natric Argicryids**

GADD. Otros Argicryids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Argicryids**

GADE. Otros Argicryids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrantic Argicryids

GADF. Otros Argicryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Argicryids

GADG. Otros Argicryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ustic Argicryids

GADH. Otros Argicryids.

#### Typic Argicryids

### Calcicryids

#### Clave para Subgrupos

GAEA. Calcicryids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Calcicryids

GAEB. Otros Calcicryids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrikerandic Calcicryids

GAEC. Otros Calcicryids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los

75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrantic Calcicryids

GAED. Otros Calcicryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Calcicryids

GAEE. Otros Calcicryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ustic Calcicryids

GAEF. Otros Calcicryids.

#### Typic Calcicryids

### Gypsicryids

#### Clave para Subgrupos

GACA. Gypsicryids que tienen un horizonte cálcico.

#### Calcic Gypsicryids

GACB. Otros Gypsicryids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrikerandic Gypsicryids

GACC. Otros Gypsicryids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Gypsicryids

GACD. Otros Gypsicryids.

#### Typic Gypsicryids

### Haplocryids

#### Clave para Subgrupos

GAGA. Haplocryids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Haplocryids

GAFB. Otros Haplocryids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Haplocryids

GAFC. Otros Haplocryids que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al

más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrixerandic Haplocryids

GAFD. Otros Haplocryids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Haplocryids

GAFE. Otros Haplocryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Haplocryids

GAFF. Otros Haplocryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ustic Haplocryids

GAFG. Otros Haplocryids.

#### Typic Haplocryids

### Petrocryids

#### Clave para Subgrupos

GABA. Petrocryids que:

1. Tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *y*
2. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xereptic Petrocryids

GABB. Otros Petrocryids que:

1. Tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *y*

2. Están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Duric Xeric Petrocryids**

GABC. Otros Petrocryids que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Duric Petrocryids**

GABD. Otros Petrocryids que tienen un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrogypic Petrocryids**

GABE. Otros Petrocryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Petrocryids**

GABF. Otros Petrocryids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, tiene una temperatura 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Petrocryids**

GABG. Otros Petrocryids.

#### **Typic Petrocryids**

### **Salicryids**

#### **Clave para Subgrupos**

GAAA. Salicryids que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Salicryids**

GAAB. Otros Salicryids.

#### **Typic Salicryids**

### **Durids**

#### **Clave para Grandes Grupos**

GCA. Durids que tienen un horizonte nátrico arriba del duripán.

**Natridurids**, pág. 117

GCB. Otros Durids que tienen un horizonte argílico arriba del duripán.

**Argidurids**, pág. 115

GCC. Otros Durids.

**Haplodurids**, pág. 116

### **Argidurids**

#### **Clave para Subgrupos**

GCBA. Argidurids que tienen, arriba del duripán, *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas entre la superficie del suelo y el límite superior del duripán con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior encima del duripán; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y la parte superior del duripán.

#### **Vertic Argidurids**

GCBB. Otros Argidurids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Argidurids**

GCBC. Otros Argidurids que tienen la siguiente combinación de características:

1. Un horizonte argílico que tiene 35 por ciento o más de arcilla en la fracción de tierra-fina en alguna parte y además tiene *ya sea*:
  - a. Un incremento de arcilla de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm dentro del horizonte argílico o en su límite superior; *o*
  - b. Si existe un horizonte Ap directamente encima del horizonte argílico, un incremento de arcilla del 10 por ciento o más (absoluto) en el límite superior del horizonte argílico; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Abruptic Xeric Argidurids**

G CBD. Otros Argidurids que tienen un horizonte argílico que tiene 35 por ciento o más de arcilla en la fracción de tierra-fina en alguna parte y además tiene *ya sea*:

1. Un incremento de arcilla de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm dentro del horizonte argílico o en su límite superior; *o*

2. Si existe un horizonte Ap directamente encima del horizonte argílico, un incremento de arcilla de 10 por ciento o más (absoluto) en el límite superior del horizonte argílico.

#### **Abruptic Argidurids**

GCBE. Otros Argidurids que tienen:

1. Un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes; *y*
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Haploxeralfic Argidurids**

GCBF. Otros Argidurids que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### **Argidic Argidurids**

GCBG. Otros Argidurids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 % o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Argidurids**

GCBH. Otros Argidurids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Argidurids**

GCBI. Otros Argidurids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Argidurids**

GCBJ. Otros Argidurids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Argidurids**

GCBK. Otros Argidurids.

#### **Typic Argidurids**

### **Haplodurids**

#### **Clave para Subgrupos**

GCCA. Haplodurids que:

1. Tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes; *y*
2. Están *ya sea*:
  - a. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquicambic Haplodurids**

GCCB. Otros Haplodurids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Haplodurids**

GCCC. Otros Haplodurids que tienen:

1. Un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos sus subhorizontes; *y*
2. Una temperatura media anual del suelo menor de 22 °C, una diferencia de 5 °C o menos entre la temperatura media del verano y la media del invierno en el suelo a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xerptic Haplodurids**

GCCD. Otros Haplodurids que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### **Cambidic Haplodurids**

GCCE. Otros Haplodurids que tienen:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrixerandic Haplodurids**

GCCF. Otros Argidurids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Haplodurids**

GCCG. Otros Haplodurids que tienen una temperatura media anual del suelo menor de 22 °C, una diferencia de 5 °C o menos entre la temperatura media del verano y la media del invierno en el suelo a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Haplodurids**

GCCH. Otros Haplodurids que están secos en todas partes de la sección de control de humedad por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm es de 5 °C o más alta y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Haplodurids**

GCCI. Otros Haplodurids.

### **Typic Haplodurids**

#### **Natridurids**

##### **Clave para Subgrupos**

GCAA. Natridurids que tienen, encima del duripán, *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas entre la superficie del suelo y la parte superior del duripán que tienen un anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior encima del duripán; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y la parte superior del duripán.

#### **Vertic Natridurids**

GCAB. Otros Natridurids que cumplen *ambas* de las siguientes:

1. Tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes; y
2. Están *ya sea*:
  - a. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o
  - b. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Natrargidic Natridurids**

GCAC. Otros Natridurids que están *ya sea*:

1. Irrigados y tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales, en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; o
2. Saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, por 1 mes o más en años normales.

#### **Aquic Natridurids**

GCAD. Otros Natridurids que tienen la siguiente combinación de características:

1. Un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes; y
2. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Natrixeralfic Natridurids**

GCAE. Otros Natridurids que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### Natrargidic Natridurids

GCAF. Otros Natridurids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres-cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrikerandic Natridurids

GCAG. Otros Natridurids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandidic Natridurids

GCAH. Otros Natridurids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las trescuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Natridurids

GCAI. Otros Natridurids.

#### Typic Natridurids

## Gypsids

### Clave para Grandes Grupos

GDA. Gypsids que tienen un horizonte petrogypico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Petrogypsids**, pág. 121

GDB. Otros Gypsids que tienen un horizonte nátrico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Natrígypsids**, pág. 120

GDC. Otros Gypsids que tienen un horizonte argílico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Argígypsids**, pág. 118

GDD. Otros Gypsids que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Calcígypsids**, pág. 119

GDE. Otros Gypsids.

**Haplogypsids**, pág. 120

## Argígypsids

### Clave para Subgrupos

GDCA. Argígypsids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Argígypsids**

GDCB. Otros Argígypsids que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Vertic Argígypsids**

GDCC. Otros Argígypsids que tienen un horizonte cálcico encima del horizonte gypico.

**Calcic Argígypsids**

GDCD. Otros Argígypsids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides, nódulos o concreciones.

**Petronodic Argígypsids**

GDCE. Otros Argígypsids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Argigypsids**

GDCF. Otros Argigypsids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Argigypsids**

GDCG. Otros Argigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las trescuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Argigypsids**

GDCH. Otros Argigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las trescuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Argigypsids**

GDCI. Otros Argigypsids.

#### **Typic Argigypsids**

### **Calcigypsids**

#### **Clave para Subgrupos**

GDDA. Calcigypsids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Calcigypsids**

GDDB. Otros Calcigypsids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides, nódulos o concreciones.

#### **Petronodic Calcigypsids**

GDDC. Otros Calcigypsids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Calcigypsids**

GDDD. Otros Calcigypsids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Calcigypsids**

GDDE. Otros Calcigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las trescuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Calcigypsids**

GDDF. Otros Calcigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las trescuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Calcigypsids**

GDDG. Otros Calcigypsids.

#### **Typic Calcigypsids**

## Haplogypsids

### Clave para Subgrupos

GDEA. Haplogypsids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Haplogypsids

GDEB. Otros Haplogypsids que tienen un horizonte gypsicó que tiene su límite superior dentro de los 18 cm de la superficie del suelo.

#### Leptic Haplogypsids

GDEC. Otros Haplogypsids que tienen, en un horizonte de al menos 25 cm de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una RAS de 13 o más) durante al menos 1 mes en años normales.

#### Sodic Haplogypsids

GDED. Otros Haplogypsids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides, nódulos o concreciones.

#### Petronodic Haplogypsids

GDEE. Otros Haplogypsids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. La fracción de tierra fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrixerandic Haplogypsids

GDEF. Otros Haplogypsids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. La fracción de tierra fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por

ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Haplogypsids

GDEG. Otros Haplogypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### Xeric Haplogypsids

GDEH. Otros Calcigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### Ustic Haplogypsids

GDEI. Otros Haplogypsids.

#### Typic Haplogypsids

## Natrigypsids

### Clave para Subgrupos

GDBA. Natrigypsids que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Natrigypsids

GDBB. Otros Natrigypsids que tienen:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Natrigypsids

GDBC. Otros Natrigypsids que tienen uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo y con un espesor combinado de 15 cm o más, que contienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides, nódulos o concreciones.

#### Petronodic Natrigypsids

GDBD. Otros Natrigypsids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Natrigypsids**

GDBE. Otros Natrigypsids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Natrigypsids**

GDBF. Otros Natrigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Natrigypsids**

GDBG. Otros Natrigypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Natrigypsids**

GDBH. Otros Natrigypsids.

#### **Typic Natrigypsids**

### **Petrogypsids**

#### **Clave para Subgrupos**

GDA A. Petrogypsids que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrocalcic Petrogypsids**

GDAB. Otros Petrogypsids que tienen un horizonte cálcico encima del horizonte petrogypsico.

#### **Calcic Petrogypsids**

GDAC. Otros Petrogypsids que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrikerandic Petrogypsids**

GDAD. Otros Petrogypsids que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Petrogypsids**

GDAE. Otros Petrogypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un xérico.

#### **Xeric Petrogypsids**

GDAF. Otros Petrogypsids que tienen una sección de control de humedad que está seca en todas partes por menos de las tres cuartas partes del tiempo (acumulativo), cuando la temperatura del suelo es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm y el régimen de humedad del suelo limita con un ústico.

#### **Ustic Petrogypsids**

GDAG. Otros Petrogypsids.

#### **Typic Petrogypsids**

**Salids****Clave para Grandes Grupos**

GBA. Salids que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por 1 mes o más en años normales.

**Aquisalids**, pág. 122

GBB. Otros Salids

**Haplosalids**, pág. 122

**Aquisalids****Clave para Subgrupos**

GBAA. Aquisalids que tienen un horizonte gypico o petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Gypic Aquisalids**

GBAB. Otros Aquisalids que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Calcic Aquisalids**

GBAC. Otros Aquisalids.

**Typic Aquisalids**

**Haplosalids****Clave para Subgrupos**

GBBA. Haplosalids que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Duric Haplosalids**

GBBB. Otros Haplosalids que tienen un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Petrogypic Haplosalids**

GBBC. Otros Haplosalids que tienen un horizonte gypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Gypic Haplosalids**

GBBD. Otros Haplosalids que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Calcic Haplosalids**

GBBE. Otros Haplosalids.

**Typic Haplosalids**

## CAPÍTULO 8

### Entisols

#### Clave para Subórdenes

LA. Entisols que tienen *una o más* de las siguientes:

1. Condiciones ácuicas y materiales sulfídicos dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Saturación permanente con agua y una matriz reducida en todos los horizontes abajo de los 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
3. En una capa encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa entre 40 y 50 cm abajo de la superficie del suelo mineral, cualquiera que esté más somero, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial), y *una o más* de las siguientes:
  - a. Una textura más fina que la arena francosa fina y en 50 por ciento o más de la matriz, *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un chroma de 0; *o*
    - (2) Un chroma de 1 o menos y un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*
    - (3) Un chroma de 2 o menos y concentraciones redox; *o*
  - b. Una textura de arena francosa fina o más gruesa y en 50 por ciento o más de la matriz, *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un chroma de 0; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 1; *o*
    - (3) Un hue de 10YR o más rojizo, un chroma de 2 o menos y concentraciones redox; *o*
    - (4) Un hue de 2.5Y o más amarillento, un chroma de 3 o menos y concentraciones redox distintivas y prominentes; *o*
    - (5) Un hue de 2.5Y o más amarillento y un chroma de 1; *o*
    - (6) Un hue de 5GY, 5G, 5BG, o 5B; *o*
    - (7) Cualquier color si este resulta de granos de arena no recubiertos; *o*
  - c. Suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

**Aquents**, pág. 123

LB. Otros Entisols que tienen, en una o más capas a una profundidad entre 25 y 100 cm abajo de la superficie del suelo mineral, 3 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de horizontes de diagnóstico que no están arreglados en ningún orden discernible.

**Arents**, pág. 127

LC. Otros Entisols que tienen menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos rocosos y una textura de arena francosa fina o más gruesa, en todas las capas (están permitidas lamelas franco arenosas) dentro de la sección de control de tamaño de partícula.

**Psamments**, pág. 139

LD. Otros Entisols que no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 25 cm de la superficie del suelo mineral y tienen:

1. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y*
2. 0.2 por ciento o más de carbono orgánico del período Holoceno a una profundidad de 125 cm, abajo de la superficie del suelo o un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
3. Un régimen de temperatura del suelo:
  - a. Que es más caliente que el cryico; *o*
  - b. Que es cryico y el suelo tiene:
    - (1) No material gélico; *y*
    - (2) Una pendiente menor de 5 por ciento o menos de 15 por ciento de vidrio volcánico en la fracción de 0.02 a 2.0 mm en alguna parte de la sección de control de tamaño de partícula.

**Fluents**, pág. 128

LE. Otros Entisols.

**Orthents**, pág. 133

#### Aquents

##### Clave para Grandes Grupos

LAA. Aquents que tienen materiales sulfídicos dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Sulfaquents**, pág. 127

LAB. Otros Aquepts que tienen, en todos los horizontes a una profundidad entre 20 y 50 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un valor de  $n$  de más de 0.7 y 8 por ciento o más de arcilla en la fracción de tierra-fina.

**Hydraquepts**, pág. 126

LAC. Otros Aquepts que tienen en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media del suelo de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O;  $o$
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

**Gelaquepts**, pág. 126

LAD. Otros Aquepts que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryaquepts**, pág. 124

LAE. Otros Aquepts que tienen menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca y una textura de arena francosa fina o más gruesa en todas las capas (son permitidas lamelas franco arenosas) dentro de la sección de control de tamaño de partícula.

**Psammaquepts**, pág. 126

LAF. Otros Aquepts que tienen *ya sea* 0.2 por ciento o más de carbono orgánico del período Holoceno a una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico de una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

**Fluvaquepts**, pág. 125

LAG. Otros Aquepts que tienen episaturación.

**Epiaquepts**, pág. 125

LAH. Otros Aquepts.

**Endoquepts**, pág. 124

## Cryaquepts

### Clave para Subgrupos

LADA. Cryaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0;  $o$
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos que 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez;  $o$
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro;  $y$

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico;  $y$

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

## Aquandic Cryaquepts

LADB. Otros Cryaquepts.

## Typic Cryaquepts

## Endoquepts

### Clave para Subgrupos

LAHA. Endoquepts que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Materiales sulfídicos;  $o$
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor, que tiene todas las características de un horizonte sulfúrico, excepto que tiene un valor de pH entre 3.5 y 4.0.

## Sulfic Endoquepts

LAHB. Otros Endoquepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

## Lithic Endoquepts

LAHC. Otros Endoquepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

## Sodic Endoquepts

LAHD. Otros Endoquepts que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte Ap o a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm, colores en 50 por ciento o más de la matriz como siguen:

1. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 6 o más, y un chroma de 3 o más;  $o$
2. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 5 o menos, y un chroma de 2 o más;  $o$
3. Hue de 5Y y chroma de 3 o más;  $o$
4. Hue 5Y o más rojizo y chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

## Aeric Endoquepts

LAHE. Otros Endoquepts que tienen *tanto*:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm, después de mezclados, que tienen esos colores;  $y$

2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 50 por ciento, en alguna parte, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Humaqueptic Endoaquents**

LAHF. Otros Endoaquents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Endoaquents**

LAHG. Otros Endoaquents.

#### **Typic Endoaquents**

### **Epiaquents**

#### **Clave para Subgrupos**

LAGA. Epiaquents que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte Ap o a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm, colores en 50 por ciento o más de la matriz como siguen:

1. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 6 o más, y un chroma de 3 o más; *o*
2. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 5 o menos, y un chroma de 2 o más; *o*
3. Hue de 5Y y chroma de 3 o más; *o*
4. Hue 5Y o más rojizo y chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Epiaquents**

LAGB. Otros Epiaquents que tienen *tanto*:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm, después de mezclados, que tienen esos colores; *y*
2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 50 por ciento, en alguna parte, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Humaqueptic Epiaquents**

LAGC. Otros Epiaquents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Endoaquents**

LAGD. Otros Endoaquents.

### **Typic Endoaquents**

### **Fluvaquents**

#### **Clave para Subgrupos**

LAHA. Fluvaquents que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Materiales sulfídicos; *o*
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor, que tiene todas las características de un horizonte sulfúrico, excepto que tiene un valor de pH entre 3.5 y 4.0.

#### **Sulfic Fluvaquents**

LAFB. Otros Fluvaquents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Fluvaquents**

L AFC. Otros Fluvaquents que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Thapto-Histic Fluvaquents**

LAFD. Otros Fluvaquents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos que 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

- b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Fluvaquents

LAFE. Otros Fluvaquents que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte Ap o a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm, colores en 50 por ciento o más de la matriz como siguen:

1. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 6 o más, y un chroma de 3 o más; *o*
2. Hue de 2.5Y o más rojizo, un color del value, en húmedo, de 5 o menos, y un chroma de 2 o más; *o*
3. Hue de 5Y y chroma de 3 o más; *o*
4. Hue 5Y o más rojizo y chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox.

#### Aeric Fluvaquents

LAFF. Otros Fluvaquents que tienen *tanto*:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm, después de mezclados, que tienen esos colores; *y*
2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 50 por ciento, en alguna parte, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Humaqueptic Fluvaquents

LAFG. Otros Fluvaquents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### Mollic Fluvaquents

LAFH. Otros Fluvaquents.

#### Typic Fluvaquents

#### Gelaquents

##### Clave para Subgrupos

LACA. Todos los Gelaquents.

#### Typic Gelaquents

#### Hydraquents

##### Clave para Subgrupos

LABA. Hydraquents que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Materiales sulfídicos; *o*

2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor, que tiene todas las características de un horizonte sulfúrico, excepto que tiene un valor de pH entre 3.5 y 4.0.

#### Sulfic Hydraquents

LABB. Otros Hydraquents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### Sodic Hydraquents

LABC. Otros Hydraquents que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Thapto-Histic Hydraquents

LABD. Otros Hydraquents.

#### Typic Hydraquents

#### Psammaquents

##### Clave para Subgrupos

LAEA. Psammaquents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Psammaquents

LAEB. Otros Psammaquents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### Sodic Psammaquents

LAEC. Otros Psammaquents que tienen un horizonte, de 5 cm o más de espesor, abajo de un horizonte Ap o a una profundidad de 18 cm o más a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que esté más profundo, que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

#### Spodic Psammaquents

LAED. Otros Psammaquents que tienen *tanto*:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm, después de mezclados, que tienen esos colores; *y*

2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 50 por ciento, en alguna parte, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Humaqueptic Psammaquents**

LAEE. Otros Psammaquents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Psammaquents**

LAEF. Otros Psammaquents.

#### **Typic Psammaquents**

### **Sulfaquents**

#### **Clave para Subgrupos**

LAAA. Sulfaquents que tienen, en algún horizonte a una profundidad entre 20 y 50 cm abajo de la superficie del suelo mineral, *una o ambas*:

1. Un valor de  $n$  de 0.7 o menos;  $o$
2. Menos de 8 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina.

#### **Haplic Sulfaquents**

LAAB. Otros Sulfaquents que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Sulfaquents**

LAAC. Otros Sulfaquents que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Thapto-Histic Sulfaquents**

LAAD. Otros Sulfaquents.

#### **Typic Sulfaquents**

### **Arents**

#### **Clave para Grandes Grupos**

LBA. Arents que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustarents, pág. 127**

LBB. Otros Arents que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xerarents, pág. 128**

LBC. Otros Arents que tienen un régimen de humedad arídico (o tórrido).

#### **Torriarents, pág. 127**

LBD. Otros Arents.

**Udarents, pág. 127**

### **Torriarents**

#### **Clave para Subgrupos**

LBCA. Torriarents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, 3 por ciento o más de fragmentos de un horizonte nátrico.

#### **Sodic Torriarents**

LBCB. Otros Torriarents que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, 3 por ciento o más de fragmentos de un duripán o de un horizonte petrocálcico.

#### **Duric Torriarents**

LBCC. Otros Torriarents.

#### **Typic Torriarents**

### **Udarents**

#### **Clave para Subgrupos**

LBDA. Udarents que tienen 3 por ciento o más de fragmentos de un horizonte argílico en algún horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral y tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de 35 por ciento o más en todas partes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Alfic Udarents**

LBDB. Otros Udarents que tienen 3 por ciento o más de fragmentos de un horizonte argílico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Ultic Udarents**

LBDC. Otros Udarents que tienen 3 por ciento o más de fragmentos de un epipedón mólico en algún horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral y tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de 35 por ciento o más en todas partes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Mollic Udarents**

LBDD. Otros Udarents.

#### **Haplic Udarents**

### **Ustarents**

#### **Clave para Subgrupos**

LBAA. Todos los Ustarents.

#### **Haplic Ustarents**

## Xerarents

### Clave para Subgrupos

LBBB. Xerarents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, 3 por ciento o más de fragmentos de un horizonte nátrico.

#### Sodic Xerarents

LBBB. Otros Xerarents que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, 3 por ciento o más de fragmentos de un duripán o de un horizonte petrocálcico.

#### Duric Xerarents

LBBC. Otros Xerarents que tienen fragmentos de un horizonte argílico con una saturación de bases (por suma de cationes) de 35 por ciento o más dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Alfic Xerarents

LBBB. Otros Xerarents.

#### Typic Xerarents

## Fluents

### Clave para Grandes Grupos

LDA. Fluents que tienen en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media del suelo de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

#### Gelifluents, pág. 129

LDB. Otros Fluents que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

#### Cryofluents, pág. 128

LDC. Otros Fluents que tienen un régimen de humedad xérico.

#### Xerofluents, pág. 132

LDD. Otros Fluents que tienen un régimen de humedad ústico.

#### Ustifluents, pág. 131

LDE. Otros Fluents que tienen un régimen de humedad arídico (tórrido).

#### Torrifluents, pág. 129

LDF. Otros Fluents.

#### Udifluents, pág. 130

## Cryofluents

### Clave para Subgrupos

LDBA. Cryofluents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Cryofluents

LDBC. Otros Cryofluents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Cryofluents

LDBC. Otros Cryofluents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Cryofluents

LDBD. Otros Cryofluents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Cryofluents

LDBE. Otros Cryofluents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### Mollic Cryofluents

LDBF. Otros Cryofluents.

#### Typic Cryofluents

## Gelifluvents

### Clave para Subgrupos

LDAA. Gelifluvents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Gelifluvents

LDAB. Otros Gelifluvents.

#### Typic Gelifluvents

## Torrifluvents

### Clave para Subgrupos

LDEA. Torrifluvents que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales, y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm a partir de la superficie del suelo, es de 5 °C o más alta; *y*
3. Un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

#### Ustertic Torrifluvents

LDEB. Otros Torrifluvents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Torrifluvents

LDEC. Otros Torrifluvents que tienen:

1. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas

partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*

2. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico; *y*
3. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrixerandic Torrifluvents

LDED. Otros Torrifluvents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Torrifluvents

LDEE. Otros Torrifluvents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Torrifluvents

LDEF. Otros Torrifluvents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Torrifluvents

LDEG. Otros Torrifuvents que tienen:

1. Un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que es de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo; y
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; y
3. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

#### **Duric Xeric Torrifuvents**

LDEH. Otros Torrifuvents que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que es de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duric Torrifuvents**

LDEI. Otros Torrifuvents que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; y
2. Un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

#### **Ustic Torrifuvents**

LDEJ. Otros Torrifuvents que tienen *tanto*:

1. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; y
2. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

#### **Xeric Torrifuvents**

LDEK. Otros Torrifuvents que tienen un epipedón antrópico.

#### **Anthropic Torrifuvents**

LDEL. Otros Torrifuvents.

#### **Typic Torrifuvents**

### **Udifluvents**

#### **Clave para Subgrupos**

LDFA. Udifluvents que tienen *tanto*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; y

2. *Una o ambas*

- a. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*
- b. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y ya sea un chroma de 0 ó un hue de 5GY, 5G, 5BG o 5B y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente).

#### **Aquertic Udifluvents**

LDFB. Otros Udifluvents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Udifluvents**

LDFC. Otros Udifluvents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Udifluvents**

LDFD. Otros Udifluvents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y

- a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
- b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Udifluents**

LDFE. Otros Udifluents que tienen *ya sea*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*
2. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y *ya sea* un chroma de 0 ó un hue de 5GY, 5G, 5BG o 5B y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente).

#### **Aquic Udifluents**

LDFE. Otros Udifluents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Udifluents**

LDFG. Otros Udifluents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Udifluents**

LDFH. Otros Udifluents.

#### **Typic Udifluents**

### **Ustifluents**

#### **Clave para Subgrupos**

LDDA. Ustifluents que tienen *tanto*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*

#### 2. *Ya sea o ambas*

- a. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*
- b. En uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y *ya sea* un chroma de 0 ó un hue de 5GY, 5G, 5BG o 5B y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente).

#### **Aquertic Ustifluents**

LDDB. Otros Ustifluents que tienen las siguientes:

1. Cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *o*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*

#### **Torrertic Ustifluents**

LDDC. Otros Ustifluents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Ustifluents

LDDD. Otros Ustifluents que tienen condiciones antrácuicas.

#### Anthraquic Ustifluents

LDDE. Otros Ustifluents que tienen *ya sea*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*

2. En uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y ya sea un chroma de 0 ó un hue de 5GY, 5G, 5BG o 5B y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente).

#### Aquic Ustifluents

LDDF. Otros Ustifluents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Ustifluents

LDDG. Otros Ustifluents que cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 180 días acumulativos por año, cuando la

temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Aridic Ustifluents

LDDH. Otros Ustifluents que cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por menos de cuatro décimos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Ustifluents

LDDI. Otros Ustifluents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### Mollic Ustifluents

LDDJ. Otros Ustifluents.

#### Typic Ustifluents

#### Xerofluents

##### Clave para Subgrupos

LDCA. Xerofluents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Xerofluents

LDCB. Otros Xerofluents que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente); *o*
2. En uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y ya sea un chroma de 0 ó un hue más azul que 10Y y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente); *y*
3. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos que 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Xerofluents**

LDCC. Otros Xerofluents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Xerofluents**

LDCCD. Otros Xerofluents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Xerofluents**

LDCE. Otros Xerofluents que tienen *ya sea*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *o*
2. En uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, un color del value, en húmedo, de 4 o más y ya sea un chroma de 0 ó un hue de 5GY, 5G, 5BG o 5B y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenados artificialmente).

#### **Aquic Xerofluents**

LDCF. Otros Xerofluents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Xerofluents**

LDCCG. Otros Xerofluents que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral con 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura de firme cuando húmedo.

#### **Durinodic Xerofluents**

LDCH. Otros Xerofluents que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Xerofluents**

LDCL. Otros Xerofluents.

#### **Typic Xerofluents**

### **Orthents**

#### **Clave para Grandes Grupos**

LEA. Orthents que tienen en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media del suelo de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

**Gelorthents**, pág. 134

LEB. Otros Orthents que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryorthents**, pág. 134

LEC. Otros Orthents que tienen un régimen de humedad arídico (tórrido).

**Torriorthents**, pág. 134

LED. Otros Orthents que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xerorthents**, pág. 138

LEE. Otros Orthents que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustorthents**, pág. 136

LEF. Otros Orthents.

**Udorthents**, pág. 136

## **Cryorthents**

### **Clave para Subgrupos**

LEBA. Cryorthents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Cryorthents**

LEBB. Otros Cryorthents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Cryorthents**

LEBC. Otros Cryorthents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Cryorthents**

LEBD. Otros Cryorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Cryorthents**

LEBE. Otros Cryorthents que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Cryorthents**

LEBF. Otros Cryorthents.

#### **Typic Cryorthents**

## **Gelorthents**

### **Clave para Subgrupos**

LEAA. Gelorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Gelorthents**

LEAB. Otros Gelorthents.

#### **Typic Gelorthents**

## **Torriorthents**

### **Clave para Subgrupos**

LECA. Torriorthents que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*
3. Un régimen de temperatura hipertérmico, térmico, mésico o *iso* y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

#### **Lithic Ustic Torriorthents**

LECB. Otros Torriorthents que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*
3. Un régimen de temperatura térmico, mésico o frígido *y* un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

#### **Lithic Xeric Torriorthents**

LECC. Otros Torriorthents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Torriorthents**

LECD. Otros Torriorthents que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*
3. Un régimen de temperatura térmico, mésico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

#### **Xerertic Torriorthents**

LECE. Otros Torriorthents que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*
3. Un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

#### **Ustertic Torriorthents**

LECF. Otros Torriorthents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Torriorthents**

LECG. Otros Torriorthents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
- a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
- b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Torriorthents**

LECH. Otros Torriorthents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Torriorthents**

LECI. Otros Torriorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

- 20 o más días consecutivos; *o*
- 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Torriorthents**

LECJ. Otros Torriorthents que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que es de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duric Torriorthents**

LECK. Otros Torriorthents que tienen *ambas*:

- Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*
- Un régimen de temperatura hipertérmico, térmico, mésico o *iso* y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

#### **Ustic Torriorthents**

LECL. Otros Torriorthents que tienen *ambas*:

- Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta a una profundidad de 50 cm; *y*
- Un régimen de temperatura térmico, mésico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

#### **Xeric Torriorthents**

LECM. Otros Torriorthents.

### Typic Torriorthents

#### Udorthents

##### Clave para Subgrupos

LEFA. Udorthents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

##### Lithic Udorthents

LEFB. Otros Udorthents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

##### Vitrandic Udorthents

LEFC. Otros Udorthents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos *y* también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

##### Aquic Udorthents

LEFD. Otros Udorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

##### Oxyaquic Udorthents

LEFE. Otros Udorthents que tienen 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos y desechos de lombrices *y* madrigueras de animales rellenas, entre el horizonte Ap *o* a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, *y* ya sea una profundidad de 100 cm *o* a un contacto denso, lítico, paralítico *o* petroférico, cualquiera que sea más somero.

##### Vermic Udorthents

LEFF. Otros Udorthents.

### Typic Udorthents

#### Ustorthents

##### Clave para Subgrupos

LEEA. Ustorthents que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido *y* una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos *o* más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura mésico *o* térmico *y* una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos *o* más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico *o* un *iso* más caliente *y* una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna *o* en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

##### Aridic Lithic Ustorthents

LEEB. Otros Ustorthents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

##### Lithic Ustorthents

LEEC. Otros Ustorthents que tienen *tanto*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm *o* más a través de un espesor de 30 cm *o* más por algún tiempo en años normales *y* caras de fricción *o* agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm *o* más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm *o* más entre la superficie del suelo mineral *y* una profundidad de 100 cm *o* a un contacto denso, lítico *o* paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. Cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido *y* una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos *o* más de los días

acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Torrertic Ustorthents**

LEED. Otros Ustorthents que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Ustorthents**

LEEE. Otros Ustorthents que tienen condiciones antrácuicas.

#### **Antraquic Ustorthents**

LEEF. Otros Ustorthents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Ustorthents**

LEEG. Otros Ustorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Ustorthents**

LEEH. Otros Ustorthents que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Durinodic Ustorthents**

LEEI. Otros Ustorthents que tienen:

1. Cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrorrandic Ustorthents**

LEEJ. Otros Ustorthents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Ustorthents**

LEEK. Otros Ustorthents que, cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 180 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Aridic Ustorthents

LEEL. Otros Ustorthents que, cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por menos de los cuatro décimos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Ustorthents

LEEM. Otros Ustorthents que tienen 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos y desechos de lombrices y madrigueras de animales rellenas entre el horizonte Ap o a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico, cualquiera que sea más somero.

#### Vermic Ustorthents

LEEN. Otros Ustorthents.

#### Typic Ustorthents

## Xerorthents

### Clave para Subgrupos

LEDA. Xerorthents que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Xerorthents

LEDB. Otros Xerorthents que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Xerorthents

LEDC. Otros Xerorthents que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos *y* también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Xerorthents

LEDD. Otros Xerorthents que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Xerorthents

LEDE. Otros Xerorthents que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor *y* que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo *y* una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### Durinodic Xerorthents

LEDF. Otros Xerorthents que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de menos de 60 por ciento en todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral o en el horizonte directamente encima de una capa que limita el desarrollo de raíces que está a una menor profundidad.

#### Dystric Xerorthents

LEDG. Otros Xerorthents.

#### Typic Xerorthents

## Psamments

### Clave para Grandes Grupos

LCA. Psamments que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryopsamments**, pág. 139

LCB. Otros Psamments que tienen un régimen de humedad arídico (o tórrido).

**Torrripsamments**, pág. 140

LCC. Otros Psamments que tienen, en la fracción de 0.02 a 2.0 mm dentro de la sección de control de tamaño de partícula, un total de más de 90 por ciento (por promedio ponderado) de minerales resistentes.

**Quartzipsamments**, pág. 139

LCD. Otros Psamments que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustipsamments**, pág. 141

LCE. Otros Psamments que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xeropsamments**, pág. 142

LCF. Otros Psamments.

**Udipsamments**, pág. 141

## Cryopsamments

### Clave para Subgrupos

LCAA. Cryopsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Cryopsamments

LCAB. Otros Cryopsamments que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Cryopsamments

LCAC. Otros Cryopsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Cryopsamments

LCAD. Otros Cryopsamments que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que contiene 5 por ciento o más de vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con

oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### Vitrandic Cryopsamments

LCAE. Otros Cryopsamments que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

#### Spodic Cryopsamments

LCAF. Otros Cryopsamments que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lamellic Cryopsamments

LCAG. Otros Cryopsamments.

#### Typic Cryopsamments

## Quartzipsamments

### Clave para Subgrupos

LCCA. Quartzipsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Quartzipsamments

LCCB. Otros Quartzipsamments que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:
  - a. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
  - b. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
  - c. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

#### Aquodic Quartzipsamments

LCCC. Otros Quartzipsamments que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Quartzipsamments

LCCD. Otros Quartzipsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Quartzipsamments**

LCCE. Otros Quartzipsamments que cumplen las siguientes:

1. Tienen un régimen de humedad ústico; *y*
2. Tienen una fracción arcillosa con una CIC de 16 cmol(+) o menos por kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc a pH 7); *y*
3. La suma del promedio ponderado de limo más 2 veces el peso ponderado de arcilla (ambos por peso) es más de 5.

#### **Ustoxic Quartzipsamments**

LCCF. Otros Quartzipsamments que cumplen las siguientes:

1. Tienen un régimen de humedad údico; *y*
2. Tienen una fracción arcillosa con una CIC de 16 cmol(+) o menos por kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc a pH 7); *y*
3. La suma del promedio ponderado de limo más 2 veces el peso ponderado de arcilla (ambos por peso) es más de 5.

#### **Udoxic Quartzipsamments**

LCCG. Otros Quartzipsamments que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Quartzipsamments**

LCCH. Otros Quartzipsamments que tienen *ambas*:

1. Lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un régimen de humedad ústico.

#### **Lamellic Ustic Quartzipsamments**

LCCI. Otros Quartzipsamments que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Quartzipsamments**

LCCJ. Otros Quartzipsamments que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustic Quartzipsamments**

LCCK. Otros Quartzipsamments que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Quartzipsamments**

LCCL. Otros Quartzipsamments que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor, abajo de un horizonte Ap o a una

profundidad de 18 cm o más a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

#### **Spodic Quartzipsamments**

LCCM. Otros Quartzipsamments.

#### **Typic Quartzipsamments**

### **Torripsamments**

#### **Clave para Subgrupos**

LCBA. Torripsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Torripsamments**

LCBB. Otros Torripsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Torripsamments**

LCBC. Otros Torripsamments que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que contiene 5 por ciento o más de vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Torripsamments**

LCBD. Otros Torripsamments que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Haploduric Torripsamments**

LCBE. Otros Torripsamments que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; *y*

2. Un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un ústico.

### Ustic Torripsamments

LCBF. Otros Torripsamments que tienen *ambas*:

1. Una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por menos de tres cuartas partes de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm, es de 5 °C o más alta; y
2. Un régimen de temperatura del suelo térmico, méxico o frígido y un régimen de humedad arídico (o tórrido) que limita con un xérico.

### Xeric Torripsamments

LCBG. Otros Torripsamments que tienen, en todos los horizontes a una profundidad de 25 a 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos; y
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

### Rhodic Torripsamments

LCBH. Otros Torripsamments.

### Typic Torripsamments

## Udipsamments

### Clave para Subgrupos

LCFA. Udipsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Udipsamments

LCFB. Otros Udipsamments que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Udipsamments

LCFC. Otros Udipsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Udipsamments

LCFD. Otros Udipsamments que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor, abajo de un horizonte Ap o a una profundidad de 18 cm o más a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

### Spodic Udipsamments

LCFE. Otros Udipsamments que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lamellic Udipsamments

LCFF. Otros Udipsamments que tienen un horizonte superficial entre 25 y 50 cm de espesor que satisface todos los requisitos de un epipedón plaggen excepto su espesor.

### Plagganthreptic Udipsamments

LCFG. Otros Udipsamments.

### Typic Udipsamments

## Ustipsamments

### Clave para Subgrupos

LCDA. Ustipsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Ustipsamments

LCDB. Otros Ustipsamments que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Ustipsamments

LCDC. Otros Ustipsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Ustipsamments

LCDD. Otros Ustipsamments que, cuando no están irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en todas partes por los cuatro décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que, en años normales, está seca en alguna parte por los seis décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que, en años normales, está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 180 días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Aridic Ustipsamments**

LCDE. Otros Ustipsamments que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Ustipsamments**

LCDF. Otros Ustipsamments que tienen, en todos los horizontes a una profundidad de 25 a 100 cm, más de 50 por ciento de los colores que tienen *todo* lo siguiente:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Rhodic Ustipsamments**

LCDG. Otros Ustipsamments.

#### **Typic Ustipsamments**

### **Xeropsamments**

#### **Clave para Subgrupos**

LCEA. Xeropsamments que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Xeropsamments**

LCEB. Otros Xeropsamments que tienen *ambas*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*

2. Un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Aquic Durinodic Xeropsamments**

LCEC. Otros Xeropsamments que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Xeropsamments**

LCED. Otros Xeropsamments que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Xeropsamments**

LCEE. Otros Xeropsamments que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que contiene 5 por ciento o más de vidrio volcánico, y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Xeropsamments**

LCEF. Otros Xeropsamments que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor y que tenga 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Durinodic Xeropsamments**

LCEG. Otros Xeropsamments que tienen lamelas dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Xeropsamments**

LCEH. Otros Xeropsamments que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de menos de 60 por ciento en todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral o en el horizonte directamente encima de una capa que limita el desarrollo de raíces que está a menor profundidad.

#### **Dystric Xeropsamments**

LCEI. Otros Xeropsamments.

#### **Typic Xeropsamments**

## CAPÍTULO 9

### Gelisols

#### Clave para Subórdenes

AA. Gelisols que tienen materiales orgánicos de suelo que satisfacen *una o más* de las siguientes:

1. Sobreyacen a cenizas, materiales fragmentales o pomáceos y/o rellenan sus intersticios y directamente abajo de estos tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico; *o*
2. Cuando se suman con las cenizas, materiales fragmentales o pomáceos, constituyen un total de 40 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 50 cm; *o*
3. Están saturados con agua por 30 o más días acumulativos en años normales (o están artificialmente drenados) y tienen 80 por ciento o más, por volumen, de materiales orgánicos de suelo, desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 cm o a una capa glácica o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté mas somero.

**Histels**, pág. 143

AB. Otros Gelisols que tienen uno o más horizontes que muestran crioturbación en forma de límites de horizontes irregulares, quebradizos o distorsionados, como involuciones, acumulación de materia orgánica sobre la parte superior de un permafrost, cuñas de hielo o arena y como fragmentos de roca orientados.

**Turbels**, pág. 148

AC. Otros Gelisols.

**Orthels**, pág. 144

#### Histels

#### Clave para Grandes Grupos

AAA. Histels que están saturados con agua por menos de 30 días acumulativos durante años normales (y no están artificialmente drenados).

**Folistels**, pág. 144

AAB. Otros Histels que están saturados con agua por 30 o más días acumulativos en años normales y tienen *ambas*:

1. Una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo; y
2. Menos de las tres cuartas partes (por volumen) de fibras de *Sphagnum* en los materiales orgánicos de suelo hasta una

profundidad de 50 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

**Glacistels**, pág. 144

AAC. Otros Histels que tienen mayor espesor de materiales fibricos de suelo que cualquier otro tipo de material orgánico de suelo hasta una profundidad de 50 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

**Fibristels**, pág. 143

AAD. Otros Histels que tienen mayor espesor de materiales hémicos de suelo que cualquier otro tipo de material orgánico de suelo hasta una profundidad de 50 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

**Hemistels**, pág. 144

AAE. Otros Histels.

**Sapristels**, pág. 144

#### Fibristels

#### Clave para Subgrupos

AACA. Fibristels que tienen un contacto lítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Fibristels**

AACB. Otros Fibristels que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Terric Fibristels**

AACC. Otros Fibristels que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas de cualquier espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Fluvaquentic Fibristels**

AACD. Otros Fibristels en los cuales las tres cuartas partes o más de los materiales fibricos se derivaron de *Sphagnum* hasta una profundidad de 50 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que este más somero.

**Sphagnic Fibristels**

AACE. Otros Fibristels.

**Typic Fibristels**

## Folistels

### Clave para Subgrupos

AAAA. Folistels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Folistels

AAAB. Otros Folistels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Glacic Folistels

AAAC. Otros Folistels.

#### Typic Folistels

## Glacistels

### Clave para Subgrupos

AABA. Glacistels que tienen materiales hémicos con mayor espesor que cualquier otro tipo de material orgánico de suelo en los 50 cm superiores.

#### Hemic Glacistels

AABB. Otros Glacistels que tienen materiales sápricos con mayor espesor que cualquier otro tipo de material orgánico de suelo en los 50 cm superiores.

#### Sapric Glacistels

AABC. Otros Glacistels.

#### Typic Glacistels

## Hemistels

### Clave para Subgrupos

AADA. Hemistels que tienen un contacto lítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Hemistels

AADB. Otros Hemistels que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Terric Hemistels

AADC. Otros Hemistels que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas de cualquier espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Fluvaquentic Hemistels

AADD. Otros Hemistels.

#### Typic Hemistels

## Sapristels

### Clave para Subgrupos

AAEA. Sapristels que tienen un contacto lítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Lithic Sapristels

AAEB. Otros Sapristels que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Terric Sapristels

AAEC. Otros Sapristels que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas de cualquier espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Fluvaquentic Sapristels

AAED. Otros Sapristels.

#### Typic Sapristels

## Orthels

### Clave para Grandes Grupos

ACA. Orthels que tienen en 30 por ciento o más del pedón más de 40 por ciento, por volumen, de materiales orgánicos desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 cm.

#### Historthels, pág. 146

ACB. Otros Orthels que tienen, dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas durante años normales (o drenados artificialmente).

#### Aquorthels, pág. 145

ACC. Otros Orthels que tienen condiciones anhídridas.

#### Anhyorthels, pág. 145

ACD. Otros Orthels que tienen un epipedón mólico.

#### Mollorthels, pág. 147

ACE. Otros Orthels que tienen un epipedón úmbrico.

#### Umbroorthels, pág. 148

ACF. Otros Orthels que tienen un horizonte argílico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Argiorthels, pág. 146

ACG. Otros Orthels que tienen, abajo de un horizonte Ap o abajo de una profundidad de 25 cm, cualquiera que sea más profunda, menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca y tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa en la sección de control del tamaño de partícula.

#### Psammorthels, pág. 147

ACH. Otros Orthels.

**Haplorthels**, pág. 146

## Anhyorthels

### Clave para Subgrupos

ACCA. Anhyorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Anhyorthels

ACCB. Otros Anhyorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Glacic Anhyorthels

ACCC. Otros Anhyorthels que tienen un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petrogypic Anhyorthels

ACCD. Otros Anhyorthels que tienen un horizonte gypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Gypic Anhyorthels

ACCE. Otros Anhyorthels que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que contiene 12 cmol(-)/L de nitrato en una relación 1:5 de suelo: agua y en el cuál el producto de su espesor (en cm) y su concentración de nitratos es de 3,500 o más.

#### Nitric Anhyorthels

ACCF. Otros Anhyorthels que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Salic Anhyorthels

ACCG. Otros Anhyorthels que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Anhyorthels

ACCH. Otros Anhyorthels.

#### Typic Anhyorthels

## Aquorthels

### Clave para Subgrupos

ACBA. Aquorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Aquorthels

ACBB. Otros Aquorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Glacic Aquorthels

ACBC. Otros Aquorthels que tienen un horizonte sulfúrico o materiales sulfídicos con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Sulfuric Aquorthels

ACBD. Otros Aquorthels que tienen *ya sea*:

1. Materiales orgánicos de suelo que están discontinuos en la superficie; o
2. Materiales orgánicos de suelo en la superficie que cambian en espesor cuatro veces o más dentro de un pedón.

#### Ruptic-Histic Aquorthels

ACBE. Otros Aquorthels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a 33 kPa de retención de agua, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Aquorthels

ACBF. Otros Aquorthels que tienen a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### Vitrandic Aquorthels

ACBG. Otros Aquorthels que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Salic Aquorthels

ACBH. Otros Aquorthels que tienen menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca y una textura de arena francosa fina o más gruesa en todas las capas dentro de la sección de control del tamaño de partícula.

#### Psammentic Aquorthels

ACBI. Otros Aquorthels que tienen una pendiente menor de 25 por ciento, y:

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o

2. Un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm o un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Aquorthels**

ACBJ. Otros Aquorthels.

#### **Typic Aquorthels**

### **Argiorthels**

#### **Claves para Subgrupos**

ACFA. Argiorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Argiorthels**

ACFB. Otros Argiorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Glacic Argiorthels**

ACFC. Otros Argiorthels que tienen un horizonte nátrico.

#### **Natric Argiorthels**

ACFD. Otros Argiorthels.

#### **Typic Argiorthels**

### **Haplorthels**

#### **Clave para Subgrupos**

ACHA. Haplorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplorthels**

ACHB. Otros Haplorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Glacic Haplorthels**

ACHC. Otros Haplorthels que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; y

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. *Ya sea:*

a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o

b. Un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm o hasta un contacto

denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Haplorthels**

ACHD. Otros Haplorthels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplorthels**

ACHE. Otros Haplorthels que tienen una pendiente de menos de 25 por ciento, *y ya sea:*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o

2. Un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm o hasta un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluentic Haplorthels**

ACHF. Otros Haplorthels.

#### **Typic Haplorthels**

### **Historthels**

#### **Clave para Subgrupos**

ACAA. Historthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Historthels**

ACAB. Otros Historthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Glacic Historthels**

ACAC. Otros Historthels que tienen una pendiente de menos de 25 por ciento; y

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. *Ya sea:*

a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o

b. Un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm o hasta un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Historthels**

ACAD. Otros Historthels que tienen una pendiente menor de 25 por ciento, *y ya sea*:

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Un decrecimiento irregular en el contenido de carbono orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm o hasta un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluentic Historthels**

ACAE. Otros Historthels que tienen más de 40 por ciento, por volumen, de materiales orgánicos de suelo de la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 cm en el 75 por ciento o menos del pedón.

#### **Ruptic Historthels**

ACAF. Otros Historthels.

#### **Typic Historthels**

### **Mollorthels**

#### **Clave para Subgrupos**

ACDA. Mollorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Mollorthels**

ACDB. Otros Mollorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Glacic Mollorthels**

ACDC. Otros Mollorthels que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo durante años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o hasta un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Mollorthels**

ACDD. Otros Mollorthels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Mollorthels**

ACDE. Otros Mollorthels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Mollorthels**

ACDF. Otros Mollorthels que tienen:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor con una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento.

#### **Cumulic Mollorthels**

ACDG. Otros Mollorthels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo durante años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Mollorthels**

ACDH. Otros Mollorthels.

#### **Typic Mollorthels**

### **Psammorthels**

#### **Clave para Subgrupos**

ACGA. Psammorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Psammorthels**

ACGB. Otros Psammorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Glacic Psammorthels**

ACGC. Otros Psammorthels que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

#### Spodic Psammorthels

ACGD. Otros Psammorthels.

#### Typic Psammorthels

### Umbroorthels

#### Clave para Subgrupos

ACEA. Umbroorthels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Umbroorthels

ACEB. Otros Umbroorthels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Glacic Umbroorthels

ACEC. Otros Umbroorthels que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo durante años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o hasta un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Umbroorthels

ACED. Otros Umbroorthels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Umbroorthels

ACEE. Otros Umbroorthels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Umbroorthels

ACEF. Otros Umbroorthels que tienen:

1. Un epipedón úmbrico de 40 cm o más de espesor con una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento.

#### Cumulic Umbroorthels

ACEG. Otros Umbroorthels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo durante años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Umbroorthels

ACEH. Otros Umbroorthels.

#### Typic Umbroorthels

### Turbels

#### Clave para Grandes Grupos

ABA. Turbels que tienen en 30 por ciento o más del pedón más de 40 por ciento, por volumen, de materiales orgánicos desde la superficie del suelo hasta una profundidad de 50 cm.

#### Histoturbels, pág. 149

ABB. Otros Turbels que tienen, dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas durante años normales (o drenados artificialmente).

#### Aquiturbels, pág. 149

ABC. Otros Turbels que tienen condiciones anhídridas.

#### Anhyturbels, pág. 149

ABD. Otros Turbels que tienen un epipedón mólico.

#### Molliturbels, pág. 150

ABE. Otros Turbels que tienen un epipedón úmbrico.

#### Umbriturbels, pág. 150

ABF. Otros Turbels que tienen menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca y tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa en la sección de control del tamaño de partícula.

#### Psammoturbels, pág. 150

ABG. Otros Turbels.

**Haploturbels**, pág. 149

**Anhyturbels**

**Clave para Subgrupos**

ABCA. Anhyturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Anhyturbels**

ABCB. Otros Anhyturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Glacic Anhyturbels**

ABCC. Otros Anhyturbels que tienen un horizonte petrogypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Petrogypic Anhyturbels**

ABCD. Otros Anhyturbels que tienen un horizonte gypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Gypic Anhyturbels**

ABCE. Otros Anhyturbels que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor que contiene 12 cmol(-)/L de nitrato en una relación 1:5 de suelo : agua y en el cual el producto de su espesor (en cm) y su concentración de nitratos es de 3,500 o más.

**Nitric Anhyturbels**

ABCF. Otros Anhyturbels que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Salic Anhyturbels**

ABCG. Otros Anhyturbels que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Calcic Anhyturbels**

ABCH. Otros Anhyturbels.

**Typic Anhyturbels**

**Aquiturbels**

**Clave para Subgrupos**

ABBA. Aquiturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Aquiturbels**

ABBB. Otros Aquiturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Glacic Aquiturbels**

ABBC. Otros Aquiturbels que tienen un horizonte sulfúrico o materiales sulfídicos con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Sulfuric Aquiturbels**

ABBD. Otros Aquiturbels que tienen *ya sea*:

1. Materiales orgánicos de suelo que están discontinuos en la superficie; o
2. Materiales orgánicos de suelo en la superficie que cambian en espesor cuatro veces o más dentro de un pedón.

**Ruptic-Histic Aquiturbels**

ABBE. Otros Aquiturbels que tienen menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca y una textura de arena francosa fina o más gruesa en todas las capas dentro de la sección de control del tamaño de partícula.

**Psammentic Aquiturbels**

ABBF. Otros Aquiturbels.

**Typic Aquiturbels**

**Haploturbels**

**Clave para Subgrupos**

ABGA. Haploturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Haploturbels**

ABGB. Otros Haploturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Glacic Haploturbels**

ABGC. Otros Haploturbels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo durante años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Haploturbels**

ABGD. Otros Haploturbels.

**Typic Haploturbels**

**Histoturbels**

**Clave para Subgrupos**

ABAA. Histoturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Histoturbels**

ABAB. Otros Histoturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Glacic Histoturbels**

ABAC. Otros Histoturbels que tienen más de 40 por ciento, por volumen, de materiales orgánicos de suelo de la superficie

del suelo hasta una profundidad de 50 cm en el 75 por ciento o menos del pedón.

### **Ruptic Histoturbels**

ABAD. Otros Histoturbels.

### **Typic Histoturbels**

## **Molliturbels**

### **Clave para Subgrupos**

ABDA. Molliturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### **Lithic Molliturbels**

ABDB. Otros Molliturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

### **Glacic Molliturbels**

ABDC. Otros Molliturbels que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo durante años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### **Vertic Molliturbels**

ABDD. Otros Molliturbels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### **Andic Molliturbels**

ABDE. Otros Molliturbels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

- b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### **Vitrandic Molliturbels**

ABDF. Otros Molliturbels que tienen:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor con una textura más fina que la arena francosa fina; y
2. Una pendiente menor de 25 por ciento.

### **Cumulic Molliturbels**

ABDG. Otros Molliturbels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo durante años normales (o drenaje artificial).

### **Aquic Molliturbels**

ABDH. Otros Molliturbels.

### **Typic Molliturbels**

## **Psammoturbels**

### **Clave para Subgrupos**

ABFA. Psammturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### **Lithic Psammoturbels**

ABFB. Otros Psammoturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

### **Glacic Psammoturbels**

ABFC. Otros Psammoturbels que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; o
2. Porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más y la mitad o menos de esa cantidad en el horizonte suprayacente; o
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y la mitad del valor cuando mucho o menor en el horizonte suprayacente.

### **Spodic Psammoturbels**

ABFD. Otros Psammoturbels.

### **Typic Psammoturbels**

## **Umbríturbels**

### **Clave para Subgrupos**

ABEA. Umbríturbels que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### **Lithic Umbríturbels**

ABEB. Otros Umbríturbels que tienen una capa glácica con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Glacíc Umbríturbels**

ABEC. Otros Umbríturbels que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo durante años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Umbríturbels**

ABED. Otros Umbríturbels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Umbríturbels**

ABEE. Otros Umbríturbels que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Umbríturbels**

ABEF. Otros Umbríturbels que tienen:

1. Un epipedón úmbrico de 40 cm o más de espesor con una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento.

#### **Cumulic Umbríturbels**

ABEG. Otros Umbríturbels que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo durante años normales (*o* drenaje artificial).

#### **Aquic Umbríturbels**

ABEH. Otros Umbríturbels.

#### **Typic Umbríturbels**



## CAPÍTULO 10

### *Histosols*

#### Clave para Subórdenes

BA. Histosols que están saturados con agua por menos de 30 días acumulativos en años normales (y no están artificialmente drenados).

**Folists**, pág. 154

BB. Otros Histosols que:

1. Tienen un mayor espesor de materiales fibricos de suelo que de cualquier otro tipo de material orgánico de suelo y:
  - a. En las partes orgánicas de la franja subsuperficial si no existe una capa mineral continua de 40 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de la franja subsuperficial; *o*
  - b. En el espesor *combinado* de las partes orgánicas de las franjas superficial y subsuperficial si existe una capa mineral continua de 40 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de la franja subsuperficial; *y*
2. No tienen un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; *y*
3. No tienen materiales sulfídicos dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Fibrists**, pág. 153

BC. Otros Histosols que tienen un mayor espesor de materiales sápricos de suelo que de cualquier otro tipo de material orgánico de suelo ya *sea*:

1. En las partes orgánicas de la franja subsuperficial si no existe una capa mineral continua de 40 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de la franja subsuperficial; *o*
2. En el espesor *combinado* de las partes orgánicas de las franjas superficial y subsuperficial si existe una capa mineral continua de 40 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de la franja subsuperficial

**Saprists**, pág. 156

BD. Otros Histosols.

**Hemists**, pág. 155

#### Fibrists

#### Clave para Grandes Grupos

BBA. Fibrists que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryofibrists**, pág. 153

BBB. Otros Fibrists en los cuales las fibras de *Sphagnum* constituyen las tres cuartas partes o más del volumen de una profundidad de 90 cm a partir de la superficie del suelo o hasta un contacto dénsico, lítico o paralítico, a materiales fragmentales u otros materiales minerales de suelo si están a una profundidad menor de 90 cm.

**Sphagnofibrists**, pág. 154

BBC. Otros Fibrists.

**Haplofibrists**, pág. 154

#### Cryofibrists

#### Clave para Subgrupos

BBAA. Cryofibrists que tienen una capa de agua dentro de la sección control, abajo de la franja superficial.

**Hydric Cryofibrists**

BBAB. Otros Cryofibrists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

**Lithic Cryofibrists**

BBAC. Otros Cryofibrists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor que tienen su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Cryofibrists**

BBAD. Otros Cryofibrists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Fluvaquentic Cryofibrists**

BBAE. Otros Cryofibrists en los que las tres cuartas partes o más del volumen de fibras en la franja superficial se derivaron de *Sphagnum*.

**Sphagnic Cryofibrists**

BBAF. Otros Cryofibrists.

**Typic Cryofibrists**

**Haplofibrists**

**Clave para Subgrupos**

BBCA. Haplofibrists que tienen una capa de agua dentro de la sección control, abajo de la franja superficial.

**Hydric Haplofibrists**

BBCB. Otros Haplofibrists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

**Lithic Haplofibrists**

BBC. Otros Haplofibrists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

**Limnic Haplofibrists**

BBCD. Otros Haplofibrists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Haplofibrists**

BBCE. Otros Haplofibrists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Fluvaquentic Haplofibrists**

BBCF. Otros Haplofibrists que tienen una o más capas de materiales hémicos o sápricos con un espesor total de 25 cm o más en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Hemic Haplofibrists**

BBCG. Otros Haplofibrists.

**Typic Haplofibrists**

**Sphagnofibrists**

**Clave para Subgrupos**

BBBA. Sphagnofibrists que tienen una capa de agua dentro de la sección control, abajo de la franja superficial.

**Hydric Sphagnofibrists**

BBBB. Otros Sphagnofibrists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

**Lithic Sphagnofibrists**

BBBC. Otros Sphagnofibrists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

**Limnic Sphagnofibrists**

BBBD. Otros Sphagnofibrists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Sphagnofibrists**

BBBE. Otros Sphagnofibrists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Fluvaquentic Sphagnofibrists**

BBBF. Otros Sphagnofibrists que tienen una o más capas de materiales hémicos o sápricos con un espesor total de 25 cm o más en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Hemic Sphagnofibrists**

BBBG. Otros Sphagnofibrists.

**Typic Sphagnofibrists**

**Folists**

**Clave para Grandes Grupos**

BAA. Folists que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryofolists**, pág. 154

BAB. Otros Folists que tienen un régimen de humedad del suelo arídico (o tórrido).

**Torrifolists**, pág. 155

BAC. Otros Folists que tienen un régimen de humedad del suelo ústico o xérico.

**Ustifolists**, pág. 155

BAD. Otros Folists.

**Udifolists**, pág. 155

**Cryofolists**

**Clave para Subgrupos**

BAAA. Cryofolists que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Cryofolists**

BAAB. Otros Cryofolists.

**Typic Cryofolists**

**Torrifolists****Clave para Subgrupos**

BABA. Torrifolists que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Torrifolists**

BABB. Otros Torrifolists.

**Typic Torrifolists****Udifolists****Clave para Subgrupos**

BADA. Udifolists que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Udifolists**

BADB. Otros Udifolists.

**Typic Udifolists****Ustifolists****Clave para Subgrupos**

BACA. Ustifolists que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Ustifolists**

BACB. Otros Ustifolists.

**Typic Ustifolists****Hemists****Clave para Grandes Grupos**

BDA. Hemists que tienen un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Sulfohemists, pág. 156**

BDB. Otros Hemists que tienen materiales sulfídicos dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Sulfihemists, pág. 156**

BDC. Otros Hemists que tienen un horizonte de 2 cm o más de espesor en los cuales los materiales hemilúvicos constituyen la mitad o más del volumen.

**Luvihemists, pág. 156**

BDD. Otros Hemists que tienen un régimen de temperatura cryico.

**Cryohemists, pág. 155**

BDE. Otros Hemists.

**Haplohemists, pág. 155****Cryohemists****Clave para Subgrupos**

BDDA. Cryohemists que tienen una capa de agua dentro de la sección control, abajo de la franja superficial.

**Hydric Cryohemists**

BDDB. Otros Cryohemists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

**Lithic Cryohemists**

BDDC. Otros Cryohemists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

**Limnic Cryohemists**

BDDD. Otros Cryohemists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Cryohemists**

BDDE. Otros Cryohemists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Fluvaquentic Cryohemists**

BBCG. Otros Cryohemists.

**Typic Cryohemists****Haplohemists****Clave para Subgrupos**

BDEA. Haplohemists que tienen una capa de agua dentro de la sección control, abajo de la franja superficial.

**Hydric Haplohemists**

BDEB. Otros Haplohemists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

**Lithic Haplohemists**

BDEC. Otros Haplohemists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

**Limnic Haplohemists**

BDED. Otros Haplohemists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Haplohemists**

BDEE. Otros Haplohemists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Fluvaquentic Haplohemists**

BDEF. Otros Haplohemists que tienen una o más capas de materiales fibricos con un espesor total de 25 cm o más en la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Fibric Haplohemists**

BDEG. Otros Haplohemists que tienen una o más capas de materiales sápricos con un espesor total de 25 cm o más, abajo de la franja superficial.

#### **Sapric Haplohemists**

BDEH. Otros Haplohemists.

#### **Typic Haplohemists**

### **Luvihemists**

#### **Clave para Subgrupos**

BDCA. Todos los Luvihemists (provisionalmente).

#### **Typic Luvihemists**

### **Sulfihemists**

#### **Clave para Subgrupos**

BDBA. Sulfihemists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Terric Sulfihemists**

BDBB. Otros Sulfihemists.

#### **Typic Sulfihemists**

### **Sulfohemists**

#### **Clave para Subgrupos**

BDAA. Todos los Sulfohemists (provisionalmente).

#### **Typic Sulfohemists**

### **Saprists**

#### **Clave para Grandes Grupos**

BCA. Saprists que tienen un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Sulfosaprists, pág. 157**

BCB. Otros Saprists que tienen materiales sulfídicos dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Sulfisaprists, pág. 157**

BCC. Otros Saprists que tienen un régimen de temperatura cryico.

#### **Cryosaprists, pág. 156**

BCD. Otros Saprists.

#### **Haplosaprists, pág. 156**

### **Cryosaprists**

#### **Clave para Subgrupos**

BCCA. Cryosaprists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

#### **Lithic Cryosaprists**

BCCB. Otros Cryosaprists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

#### **Limnic Cryosaprists**

BCCC. Otros Cryosaprists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Terric Cryosaprists**

BCCD. Otros Cryosaprists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Fluvaquentic Cryosaprists**

BCCE. Otros Cryosaprists.

#### **Typic Cryosaprists**

### **Haplosaprists**

#### **Clave para Subgrupos**

BCDA. Haplosaprists que tienen un contacto lítico dentro de la sección de control.

#### **Lithic Haplosaprists**

BCDB. Otros Haplosaprists que tienen una o más capas límnicas con un espesor total de 5 cm o más dentro de la sección de control.

#### **Limnic Haplosaprists**

BCDC. Otros Haplosaprists que tienen *tanto*:

1. A través de una capa de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, una conductividad eléctrica de 30 dS/m o más (1:1, suelo: agua), por 6 meses o más en años normales; y

2. Una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

#### **Halic Terric Haplosaprists**

BCDD. Otros Haplosaprists que tienen a través de una capa de 30 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de la sección de control, una conductividad eléctrica de 30 dS/m o más (1:1, suelo: agua), por 6 meses o más en años normales.

**Halic Haplosaprists**

BCDE. Otros Haplosaprists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Haplosaprists**

BCDF. Otros Haplosaprists que tienen, dentro de los materiales orgánicos, una capa mineral de 5 cm o más de espesor o dos o más capas minerales de cualquier espesor en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Fluvaquentic Haplosaprists**

BCDG. Otros Haplosaprists que tienen una o más capas de materiales fibricos o hémicos con un espesor total de 25 cm o más en la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Hemic Haplosaprists**

BCDH. Otros Haplosaprists.

**Typic Haplosaprists**

**Sulfisaprists**

**Clave para Subgrupos**

BCBA. Sulfisaprists que tienen una capa mineral de 30 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de la sección de control, abajo de la franja superficial.

**Terric Sulfisaprists**

BCBB. Otros Sulfisaprists.

**Typic Sulfisaprists**

**Sulfosaprists**

**Clave para Subgrupos**

BCAA. Todos los Sulfosaprists (provisionalmente)

**Typic Sulfosaprists**



## CAPÍTULO 11

### *Inceptisols*

#### Clave para Subórdenes

KA. Inceptisols que tienen *una o más* de las siguientes:

1. En una capa encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa a una profundidad entre 40 y 50 cm a partir de la superficie de un suelo mineral, cualquiera que esté más somero, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenado) y *una o más* de las siguientes:

- a. Un epipedón hístico; *o*
- b. Un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- c. Una capa directamente abajo del epipedón, o dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene, sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes, 50 por ciento o más de un chroma que es *ya sea*:

- (1) 2 o menos si existen concentraciones redox; *o*
- (2) 1 o menos; *o*

d. Dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa en el tiempo cuando el suelo no esta siendo irrigado; *o*

2. Un porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio [RAS] de 13 o más) en la mitad o más del volumen del suelo dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, un decrecimiento de los valores de PSI (o RAS) con el incremento de la profundidad abajo de los 50 cm, y nivel del agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por algún tiempo durante el año.

**Aquepts**, pág. 159

KB. Otros Inceptisols que tienen un epipedón plaggen o antrópico.

**Anthrepts**, pág. 159

KC. Otros Inceptisols que tienen, en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura media de verano del suelo que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

**Gelepts**, pág. 171

KD. Otros Inceptisols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryepts**, pág. 166

KE. Otros Inceptisols que tienen un régimen de humedad del suelo ústico.

**Ustepts**, pág. 177

KF. Otros Inceptisols que tienen un régimen de humedad del suelo xérico.

**Xerepts**, pág. 184

KG. Otros Inceptisols.

**Udepts**, pág. 172

#### Anthrepts

##### Clave para Grandes Grupos

KBA. Anthrepts que tienen un epipedón plaggen.

**Plagganthrepts**, pág. 159

KBB. Otros Anthrepts.

**Haplanthrepts**, pág. 159

#### Haplanthrepts

##### Clave para Subgrupos

KBBA. Todos los Haplanthrepts (provisionalmente).

**Typic Haplanthrepts**

#### Plagganthrepts

##### Clave para Subgrupos

KBAA. Todos los Plagganthrepts (provisionalmente).

**Typic Plagganthrepts**

#### Aquepts

##### Clave para Grandes Grupos

KAA. Aquepts que tienen un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Sulfaquepts**, pág. 165

KAB. Otros Aquepts que tienen, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes que tienen plintita o un horizonte de diagnóstico cementado o endurecido formando una fase continua o constituyendo la mitad o más del volumen.

**Petraquepts**, pág. 165

KAC. Otros Aquepts que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte sálico; *o*
2. En uno o más horizontes con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio [RAS] de 13 o más) y una disminución de los valores de PSI (o RAS) con el incremento de la profundidad abajo de los 50 cm.

**Halaquepts**, pág. 164

KAD. Otros Aquepts que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiaquepts**, pág. 163

KAE. Otros Aquepts que tienen, en años normales, una temperatura media anual del suelo de 0 °C o más fría y una temperatura del suelo media de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

**Gelaquepts**, pág. 163

KAF. Otros Aquepts que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryaquepts**, pág. 160

KAG. Otros Aquepts que tienen, en una o más capas de al menos 25 cm de espesor (acumulativo) dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral y 25 por ciento o más (por volumen) de bioturbación reconocible, como madrigueras de animales rellenas, hoyos y deposiciones de lombrices.

**Vermaquepts**, pág. 165

KAH. Otros Aquepts que tienen un epipedón hístico, melánico, mólico o úmbrico.

**Humaquepts**, pág. 164

KAI. Otros Aquepts que tienen episaturación.

**Epiaquepts**, pág. 162

KAJ. Otros Aquepts.

**Endoquepts**, pág. 161

**Cryaquepts**

**Clave para Subgrupos**

KAFA. Cryaquepts que tienen, dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Un horizonte sulfúrico; *o*
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene todas las características de un horizonte sulfúrico, excepto que tiene un valor de pH entre 3.5 y 4.0; *o*
3. Materiales sulfídicos.

**Sulfic Cryaquepts**

KAFB. Otros Cryaquepts que tienen un epipedón hístico y un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Histic Lithic Cryaquepts**

KAFC. Otros Cryaquepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Cryaquepts**

KAFD. Otros Cryaquepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Vertic Cryaquepts**

KAFE. Otros Cryaquepts que tienen un epipedón hístico.

**Histic Cryaquepts**

KAFF. Otros Cryaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

**Aquandic Cryaquepts**

KAFG. Otros Cryaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Cryaquepts**

KAFH. Otros Cryaquepts que tienen:

1. Un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz de uno o más horizontes a una profundidad entre 15 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Aeric Humic Cryaquepts**

KAFI. Otros Cryaquepts que tienen un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz de uno o más horizontes a una profundidad entre 15 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Aeric Cryaquepts**

KAFJ. Otros Cryaquepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Cryaquepts**

KAFK. Otros Cryaquepts.

#### **Typic Cryaquepts**

### **Endoquepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KAJA. Endoquepts que tienen, dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Un horizonte sulfúrico; *o*
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor que tiene todas las características de un horizonte sulfúrico, excepto que tiene un valor de pH entre 3.5 y 4.0; *o*
3. Materiales sulfídicos.

#### **Sulfic Endoquepts**

KAJB. Otros Endoquepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Endoquepts**

KAJC. Otros Endoquepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y

caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Endoquepts**

KAJD. Otros Endoquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Endoquepts**

KAJE. Otros Endoquepts que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral *uno* de los siguientes colores:

1. Un hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más sobre 50 por ciento de los exteriores de los agregados o no hay empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
2. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento; *y ya sea*:
  - a. Tanto un color del value, en húmedo, y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un chroma de 2 o más si no existen concentraciones redox; *y*
3. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un

contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Fluventic Endoaquepts

KAJF. Otros Endoaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Fluvaquentic Endoaquepts

KAJG. Otros Endoaquepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### Fragic Endoaquepts

KAJH. Otros Endoaquepts que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral *uno* de los siguientes colores:

1. Un hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más sobre 50 por ciento de los exteriores de los agregados o no hay empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
2. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento; *y ya sea*:
  - a. Tanto un color del value, en húmedo, y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un chroma de 2 o más si no existen concentraciones redox.

#### Aeric Endoaquepts

KAJI. Otros Endoaquepts que tienen:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral, o en materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm tienen esos colores después de mezclados; *y*
2. Una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de menos de 50 por ciento en alguna parte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Humic Endoaquepts

KAJJ. Otros Endoaquepts que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### Mollic Endoaquepts

KAJK. Otros Endoaquepts.

#### Typic Endoaquepts

#### Epiaquepts

##### Clave para Subgrupos

KAIA. Epiaquepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Epiaquepts

KAIB. Otros Epiaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con

oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Epiaquepts**

KAIC. Otros Epiaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Epiaquepts**

KAID. Otros Epiaquepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Epiaquepts**

KAIE. Otros Epiaquepts que tienen, en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral *uno* de los siguientes colores:

1. Un hue de 7.5YR o más rojizo en 50 por ciento o más de la matriz; *y*
  - a. Si los agregados están presentes, un chroma de 2 o más sobre 50 por ciento de los exteriores de los agregados o no hay empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos en los interiores de los agregados; *o*
  - b. Si los agregados están ausentes, un chroma de 2 o más en 50 por ciento o más de la matriz; *o*
2. En 50 por ciento o más de la matriz, un hue de 10YR o más amarillento; *y ya sea*:
  - a. Tanto un color del value, en húmedo, y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un chroma de 2 o más si no existen concentraciones redox.

#### **Aeric Epiaquepts**

KAIF. Otros Epiaquepts que tienen:

1. Un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) a través de los 15 cm superiores del suelo mineral, o en materiales entre la superficie del suelo mineral y

una profundidad de 15 cm tienen esos colores después de mezclados; *y*

2. Una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de menos de 50 por ciento en alguna parte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Epiaquepts**

KAIG. Otros Epiaquepts que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestra molida y homogeneizada), a través de los 15 cm superiores del suelo mineral o tienen materiales entre la superficie del suelo mineral una profundidad de 15 cm que tienen esos colores del value después de mezclados.

#### **Mollic Epiaquepts**

KAIH. Otros Epiaquepts.

#### **Typic Epiaquepts**

### **Fragiaquepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KADA. Fragiaquepts que tienen, en 50 por ciento o más de la matriz de uno o más horizontes ya sea entre la capa arable y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral o, si no existe capa arable, entre las profundidades de 15 y 75 cm, un chroma de:

1. 3 o más; *o*
2. 2 o más si no hay concentraciones redox.

#### **Aeric Fragiaquepts**

KADB. Otros Fragiaquepts que tienen un epipedón hístico, mólico o úmbrico.

#### **Humic Fragiaquepts**

KADC. Otros Fragiaquepts.

#### **Typic Fragiaquepts**

### **Gelaquepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KAEA. Gelaquepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Gelaquepts**

KAEB. Otros Gelaquepts que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Gelaquepts**

KAEC. Otros Gelaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Gelaquepts**

KAED. Otros Gelaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Gelaquepts**

KAEE. Otros Gelaquepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Gelaquepts**

KAEF. Otros Gelaquepts.

#### **Typic Gelaquepts**

### **Halaquepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KACA. Halaquepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Halaquepts**

KACB. Otros Halaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o mas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Halaquepts**

KACC. Otros Halaquepts que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de materiales de suelo cementados o endurecidos y tiene su límite superior dentro de los 100 cm, de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Duric Halaquepts**

KACD. Otros Halaquepts que tienen un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz de uno o más horizontes a una profundidad entre 15 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Aeric Halaquepts**

KACE. Otros Halaquepts.

#### **Typic Halaquepts**

### **Humaquepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KAHA. Humaquepts que tienen un valor de *n* de *ya sea*:

1. Más de 0.7 (y menos de 8 por ciento de arcilla) en una o más capas a una profundidad entre 20 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Más de 0.9 en una o más capas a una profundidad entre 50 y 100 cm.

#### **Hydraquentic Humaquepts**

KAHB. Otros Humaquepts que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Humaquepts**

KAHC. Otros Humaquepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o mas* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Humaquepts**

KAHD. Otros Humaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. Un epipedón mólico o úmbrico con 60 cm o más de espesor; *y ya sea*
2. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
3. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Cumulic Humaquepts**

KAHE. Otros Humaquepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Humaquepts**

KAHF. Otros Humaquepts que tienen un hue de 5Y o más rojizo y un chroma de 3 o más en 40 por ciento o más de la matriz de uno o más subhorizontes a una profundidad entre 15 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Aeric Humaquepts**

KAHG. Otros Humaquepts.

#### **Typic Humaquepts**

#### **Petraquepts**

##### **Clave para Subgrupos**

KABA. Petraquepts que tienen *ambos*:

1. Un epipedón hístico; *y*
2. Un horizonte plácico.

#### **Histic Placic Petraquepts**

KABB. Otros Petraquepts que tienen un horizonte plácico.

#### **Placic Petraquepts**

KABC. Otros Petraquepts que tienen uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, en los cuales la plintita forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

#### **Plinthic Petraquepts**

KABD. Otros Petraquepts.

#### **Typic Petraquepts**

#### **Sulfaquepts**

##### **Clave para Subgrupos**

KAAA. Sulfaquepts que tienen un horizonte sálico dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Salidic Sulfaquepts**

KAAB. Otros Sulfaquepts que tienen un valor de *n* de *ya sea*:

1. Más de 0.7 (y menos de 8 por ciento de arcilla) en una o más capas a una profundidad entre 20 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Más de 0.9 en una o más capas a una profundidad entre 50 y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Hydraquentic Sulfaquepts**

KAAC. Otros Sulfaquepts.

#### **Typic Sulfaquepts**

#### **Vermaquepts**

##### **Clave para Subgrupos**

KAGA. Vermaquepts que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 7 o más (o una relación de adsorción de sodio [RAS] de 6 o más) en uno o más subhorizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Sodic Vermaquepts**

KAGB. Otros Vermaquepts.

### Typic Vermaquepts

## Cryepts

### Clave para Grandes Grupos

KDA. Cryepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Humicryepts, pág. 169

KDB. Otros Cryepts que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcicryepts, pág. 166

KDC. Otros Cryepts que:

1. No tienen carbonatos libres dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 50 por ciento y:
  - a. En la mitad o más del espesor entre 25 y 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral y no tienen un horizonte plácico, duripán y fragipán o un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. En una capa, de 10 cm o más de espesor, directamente encima de un horizonte plácico, duripán, fragipán o un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Dystrocryepts, pág. 166

KDD. Otros Cryepts.

#### Haplocryepts, pág. 168

## Calcicryepts

### Clave para Subgrupos

KDBA. Calcicryepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Calcicryepts

KDBB. Otros Calcicryepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Calcicryepts

KDBC. Otros Calcicryepts que tienen un régimen de humedad xérico.

#### Xeric Calcicryepts

KDBD. Otros Calcicryepts que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 o más días (acumulativos) en años normales.

#### Ustic Calcicryepts

KDBE. Otros Calcicryepts.

#### Typic Calcicryepts

## Dystrocryepts

### Clave para Subgrupos

KDCA. Dystrocryepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Dystrocryepts

KDCB. Otros Dystrocryepts que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; o
  - b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Dystrocryepts

KDCC. Otros Dystrocryepts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Haploxerandic Dystrocryepts

KDCD. Otros Dystricryepts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrixerandic Dystricryepts**

KDCE. Otros Dystricryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Dystricryepts**

KDCF. Otros Dystricryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Dystricryepts**

KDCG. Otros Dystricryepts que tienen:

1. Una pendiente menor de 25 por ciento; y *ya sea*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una

profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie de un suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; y

2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Fluvaquentic Dystricryepts**

KDCH. Otros Dystricryepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox, con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Dystricryepts**

KDCI. Otros Dystricryepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Dystricryepts**

KDCJ. Otros Dystricryepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Dystricryepts**

KDCK. Otros Dystricryepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; y

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Dystricryepts**

KDCL. Otros Dystricryepts que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio con o sin hierro; *o*
2. Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de 0.25 por ciento o más y la mitad de esa cantidad o menos en un horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más y un valor de la mitad cuando mucho o menos en un horizonte suprayacente.

#### **Spodic Dystricryepts**

KDCM. Otros Dystricryepts que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Dystricryepts**

KDCN. Otros Dystricrypts que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 o más días (acumulativos) en años normales.

#### Ustic Dystricrypts

KDCO. Otros Dystricrypts que tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 50 por ciento o más en uno o más horizontes entre 25 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### Eutric Dystricrypts

KDCP. Otros Dystricrypts.

#### Typic Dystricrypts

### Haplocrypts

#### Clave para Subgrupos

KDDA. Haplocrypts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplocrypts

KDDB. Otros Haplocrypts que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 o más; *o*

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Haplocrypts

KDDC. Otros Haplocrypts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente

de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 por ciento o más.

#### Haploxerandic Dystricrypts

KDDD. Otros Haplocrypts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrixerandic Haplocrypts

KDDE. Otros Haplocrypts que tienen:

1. Una sección de control de humedad que está seca en alguna parte por 45 o más días (acumulativos) en años normales; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Haplustandic Haplocrypts

KDDF. Otros Haplocrypts que tienen:

1. Una sección de control de humedad que está seca en alguna parte por 45 o más días (acumulativos) en años normales; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

- (2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Ustivitrantic Haplocryepts

KDDG. Otros Haplocryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 por ciento o más.

#### Andic Haplocryepts

KDDH. Otros Haplocryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrantic Haplocryepts

KDDI. Otros Haplocryepts que tienen:

1. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### Fluvaquentic Haplocryepts

KDDJ. Otros Haplocryepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### Aquic Haplocryepts

KDDK. Otros Haplocryepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Haplocryepts

KDDL. Otros Haplocryepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lamellic Haplocryepts

KDDM. Otros Haplocryepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Fluventic Haplocryepts

KDDN. Otros Haplocryepts que tienen carbonatos secundarios identificables dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Haplocryepts

KDDO. Otros Haplocryepts que tienen un régimen de humedad xérico.

#### Xeric Haplocryepts

KDDP. Otros Haplocryepts que están secos en alguna parte de la sección de control de humedad por 45 o más días (acumulativos) en años normales.

#### Ustic Haplocryepts

KDDQ. Otros Haplocryepts.

#### Typic Haplocryepts

### Humicryepts

#### Clave para Subgrupos

KDAA. Humicryepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Humicryepts

KDAB. Otros Humicryepts que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 o más; o
- b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
- c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
  - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - (2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Humicryepts**

KDAC. Otros Humicryepts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 por ciento o más.

#### **Haploxerandic Humicryepts**

KDAD. Otros Humicryepts que tienen:

1. Un régimen de humedad xérico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrikerandic Humicryepts**

KDAE. Otros Humicryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa, y Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 por ciento o más.

#### **Andic Humicryepts**

KDAF. Otros Humicryepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Humicryepts**

KDAG. Otros Humicryepts que tienen:

1. Una pendiente menor de 25 por ciento; y
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; y
2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Fluvaquentic Humicryepts**

KDAH. Otros Humicryepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Humicryepts**

KDAI. Otros Humicryepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplocryepts**

KDAJ. Otros Humicryepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lamellic Humicryepts

KDAK. Otros Humicryepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; y

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Fluventic Humicryepts

KDAL. Otros Humicryepts que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio con o sin hierro; o
2. Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 0.25 por ciento o más y la mitad de esa cantidad o menos en un horizonte suprayacente; o
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más y un valor de la mitad cuando mucho o menos en un horizonte suprayacente.

#### Spodic Humicryepts

KDAM. Otros Humicryepts que tienen un régimen de humedad xérico.

#### Xeric Humicryepts

KDAN. Otros Humicryepts que tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 50 por ciento o más en la mitad o más del espesor del suelo entre 25 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral o en alguna parte de los 10 cm directamente encima de un contacto denso, lítico o paralítico a menos de 50 cm abajo de la superficie del suelo mineral.

#### Eutric Humicryepts

KDAO. Otros Humicryepts.

#### Typic Humicryepts

### Gelepts

#### Clave para Grandes Grupos

KCA. Gelepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Carbonatos libres dentro del suelo; o
2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 60 por ciento o más en uno o más horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral o directamente

encima de una capa limitante para el desarrollo de raíces si está a menor profundidad.

**Eutrogelepts**, pág. 171

KCB. Otros Gelepts.

**Dystrogelepts**, pág. 171

### Dystrogelepts

#### Clave para Subgrupos

KCBA. Dystrogelepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Dystrogelepts

KCBB. Otros Dystrogelepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Dystrogelepts

KCBC. Otros Dystrogelepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### Aquic Dystrogelepts

KCBD. Otros Dystrogelepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Humic Dystrogelepts

KCBE. Otros Dystrogelepts.

#### Typic Dystrogelepts

### Eutrogelepts

#### Clave para Subgrupos

KCAA. Eutrogelepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Eutrogelepts

KCAB. Otros Eutrogelepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Eutrogelepts

KCAC. Otros Eutrogelepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o

menosy también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Eutrogelepts**

KCAD. Otros Eutrogelepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Humic Eutrogelepts**

KCAE. Otros Eutrogelepts.

#### **Typic Eutrogelepts**

### **Udepts**

#### **Clave para Grandes Grupos**

KGA. Udepts que tienen un horizonte sulfúrico que tiene su límite superior dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Sulfudepts, pág. 177**

KGB. Otros Udepts que tienen un duripán u otra capa de suelo cementada o endurecida que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Durudepts, pág. 172**

KGC. Otros Udepts que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Fragiudepts, pág. 177**

KGD. Otros Udepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Carbonatos libres dentro del suelo; *o*
2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 60 por ciento o más en uno o más horizontes, a una profundidad entre 25 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral o directamente encima de una capa limitante para el desarrollo de raíces, si está a menor profundidad.

#### **Eutruudepts, pág. 175**

KGE. Otros Udepts.

#### **Dystrudepts, pág. 173**

### **Durudepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KGBA. Durudepts que tienen:

1. En uno o más horizontes encima del duripán y dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 1.0 o más; *o*

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Durudepts**

KGBB. Otros Durudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Durudepts**

KGBC. Otros Durudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Durudepts**

KGBD. Otros Durudepts que tienen, en uno o más horizontes encima del duripán y dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas y prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Durudepts**

KGBE. Otros Durudepts.

#### **Typic Durudepts**

## Dystrudepts

### Clave para Subgrupos

KGEA. Dystrudepts que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un epipedón úmbrico o mólico.

### Humic Lithic Dystrudepts

KGEB. Otros Dystrudepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Dystrudepts

KGEC. Otros Dystrudepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Vertic Dystrudepts

KGED. Otros Dystrudepts que tienen:

1. En uno o más horizontes encima del duripán y dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
  - b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

- (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Aquandic Durudepts

KGEE. Otros Dystrudepts que tienen:

1. En uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *y*
2. Están saturados con agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

### Andic Oxyaquic Dystrudepts

KGEE. Otros Dystrudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### Andic Dystrudepts

KGEG. Otros Dystrudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Vitrandic Dystrudepts

KGEEH. Otros Dystrudepts que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*

2. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Fragiaquic Dystrudepts**

KGEL. Otros Dystrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*

2. *Ya sea:*

a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquic Dystrudepts**

KGEL. Otros Dystrudepts que tienen:

1. Un epipedón úmbrico o mólico; *y*

2. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Humic Dystrudepts**

KGEL. Otros Dystrudepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Dystrudepts**

KGEL. Otros Dystrudepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*

2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Dystrudepts**

KGEM. Otros Dystrudepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Dystrudepts**

KGEM. Otros Dystrudepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Dystrudepts**

KGEO. Otros Dystrudepts que tienen:

1. Un epipedón úmbrico o mólico; *y*

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa a través de la sección de control de tamaño de partícula.

#### **Humic Psammentic Dystrudepts**

KGEP. Otros Dystrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. Un epipedón úmbrico o mólico; *y*

2. *Ya sea:*

a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Humic Dystrudepts**

KGEO. Otros Dystrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Dystrudepts**

KGEM. Otros Dystrudepts que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio con o sin hierro; *o*

2. Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de 0.25 por ciento o más y la mitad de esa cantidad o menos en un horizonte suprayacente; *o*

3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más y un valor de la mitad cuando mucho o menos en un horizonte suprayacente.

#### Spodic Dystrudepts

KGES. Otros Dystrudepts que tienen 50 por ciento o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero:

1. Una CIC (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ , 1N a pH 7) de menos de 24  $\text{cmol}(+)$  por kg de arcilla; *o*
2. Tanto una relación de arcilla medida en la fracción de tierra-fina al porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa de 0.6 o más y lo siguiente: la CIC (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ , 1N a pH 7) dividida por el producto de tres veces [por ciento de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos el por ciento de carbono orgánico (pero no menor de 1.00)] es menor de 24.

#### Oxic Dystrudepts

KGET. Otros Dystrudepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico de 50 cm o más de espesor.

#### Humic Pachic Dystrudepts

KGEU. Otros Dystrudepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### Humic Dystrudepts

KGEV. Otros Dystrudepts que tienen:

1. En cada pedón un horizonte cámbico que incluye de 10 a 50 por ciento (por volumen) de partes iluviales que de otro modo reúnen los requisitos para un horizonte argílico, kándico o nátrico; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 35 por ciento o más, a una profundidad de 125 cm desde la parte superior del horizonte cámbico o directamente encima de un contacto dénsico, lítico o paralítico, si es más somero.

#### Ruptic-Alfic Dystrudepts

KGEW. Otros Dystrudepts que tienen en cada pedón un horizonte cámbico que incluye de 10 a 50 por ciento (por volumen) de partes iluviales que de otro modo reúnen los requisitos para un horizonte argílico, kándico o nátrico

#### Ruptic-Ultic Dystrudepts

KGEX. Otros Dystrudepts.

#### Typic Dystrudepts

### Eutrudepts

#### Clave para Subgrupos

KGDA. Eutrudepts que tienen:

1. Un epipedón úmbrico o mólico; *y*

2. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Humic Lithic Eutrudepts

KGDB. Otros Eutrudepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Eutrudepts

KGDC. Otros Eutrudepts que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### Aquertic Eutrudepts

KGDD. Otros Eutrudepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Vertic Eutrudepts

KGDE. Otros Eutrudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Eutrudepts

KGDF. Otros Eutrudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Eutrudepts**

KGDG. Otros Eutrudepts que tienen condiciones antrácicas.

#### **Anthraquic Eutrudepts**

KGDH. Otros Eutrudepts que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Fragiaquic Eutrudepts**

KGDI. Otros Eutrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. En uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*
2. *Ya sea:*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Eutrudepts**

KGDJ. Otros Eutrudepts que:

1. Tienen en uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*

2. No tienen carbonatos libres a través de cualquier horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Aquic Dystric Eutrudepts**

KGDK. Otros Eutrudepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Eutrudepts**

KGDL. Otros Eutrudepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas:*

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Eutrudepts**

KGDM. Otros Eutrudepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Eutrudepts**

KGDN. Otros Eutrudepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Eutrudepts**

KGDO. Otros Eutrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. No tienen carbonatos libres a través de cualquier horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Tienen, a una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
3. Tienen una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Dystric Fluventic Eutrudepts**

KGDP. Otros Eutrudepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período

Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; o

2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Eutrudepts**

KGDQ. Otros Eutrudepts que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en todos los horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Eutrudepts**

KGDR. Otros Eutrudepts que no tienen carbonatos libres a través de cualquier horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Dystric Eutrudepts**

KGDS. Otros Eutrudepts que tienen 40 por ciento o más de carbonatos libres, incluyendo fragmentos gruesos hasta de 75 mm de diámetro, en todos los horizontes entre la parte superior de un horizonte cámbico y la profundidad de 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico si está más somero.

#### **Rendollic Eutrudepts**

KGDT. Otros Eutrudepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### **Humic Eutrudepts**

KGDU. Otros Eutrudepts que tienen un horizonte cámbico que incluye de 10 a 50 por ciento (por volumen) de partes iluviales que reúnen los requisitos para un horizonte argílico, kándico o nátrico

#### **Ruptic-Alfic Eutrudepts**

KGDV. Otros Eutrudepts.

#### **Typic Eutrudepts**

### **Fragiudepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KGCA. Fragiudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Fragiudepts**

KGCB. Otros Fragiudepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una o ambas de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Fragiudepts**

KGCC. Otros Fragiudepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas y prominentes y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Fragiudepts**

KGCD. Otros Fragiudepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### **Humic Fragiudepts**

KGCE. Otros Fragiudepts.

#### **Typic Fragiudepts**

### **Sulfudepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KGAA. Todos los Sulfudepts (provisionalmente).

#### **Typic Sulfudepts**

### **Ustepts**

#### **Clave para Grandes Grupos**

KEA. Ustepts que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Durustepts, pág. 179**

KEB. Otros Ustepts que:

1. Tienen un horizonte cálcico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral o un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa en todas partes encima del horizonte cálcico o petrocálcico después de que el suelo entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 18 cm ha sido mezclada.

#### **Calciustepts, pág. 178**

KEC. Otros Ustepts que tienen las siguientes:

1. Sin carbonatos libres dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de menos de 60 por ciento en todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

**Dystrustepts**, pág. 179

KED. Otros Ustepts.

**Haplustepts**, pág. 180

## Calciustepts

### Clave para Subgrupos

KEBA. Calciustepts que tienen un horizonte petrocálcico y un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Petrocalcic Calciustepts**

KEBB. Otros Calciustepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Calciustepts**

KEBC. Otros Calciustepts que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

**Torrertic Calciustepts**

KEBD. Otros Calciustepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

**Vertic Calciustepts**

KEBE. Otros Calciustepts que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Petrocalcic Calciustepts**

KEBF. Otros Calciustepts que tienen un horizonte gypsic que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Gypsic Calciustepts**

KEBG. Otros Calciustepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Calciustepts**

KEBH. Otros Calciustepts que tienen, cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

- a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
- b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Calcustepts

KEBI. Otros Calcustepts que tienen, cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por cuatro-décimos o menos de los días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Calcustepts

KEBJ. Otros Calcustepts.

#### Typic Calcustepts

### Durustepts

#### Clave para Subgrupos

KEAA. Todos los Durustepts (provisionalmente).

#### Typic Durustepts

### Dystrustepts

#### Clave para Subgrupos

KECA. Dystrustepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Dystrustepts

KECB. Otros Dystrustepts que tienen:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

- b. Un régimen de temperatura mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

- c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

- (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
- (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### Torrertic Dystrustepts

KECC. Otros Dystrustepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y ya sea una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### Vertic Dystrustepts

KECD. Otros Dystrustepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, una fracción de tierra-fina que tiene tanto una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0 por ciento.

#### Andic Dystrustepts

KECE. Otros Dystrustepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro de las cuales el 5 por ciento o más es vidrio volcánico y [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Dystrustepts

KECF. Otros Dystrustepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Dystrustepts

KECG. Otros Dystrustepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y ya sea 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Fluventic Dystrustepts

KECH. Otros Dystrustepts que, cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

- a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
- b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Dystrustepts

KECI. Otros Dystrustepts que tienen 50 por ciento o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si esta más somero:

1. Una CIC (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) de menos de 24 cmol(+) por kg de arcilla; *o*
2. Tanto una relación de arcilla medida en la fracción de tierra-fina y el porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa de 0.6 o más y lo siguiente: la CIC (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) dividida por el producto de tres veces [Porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos porcentaje de carbono-orgánico (pero no más de 1.00)] es menor de 24.

#### Oxic Dystrustepts

KECJ. Otros Dystrustepts que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Humic Dystrustepts

KECK. Otros Dystrustepts.

#### Typic Dystrustepts

### Haplustepts

#### Clave para Subgrupos

KEDA. Haplustepts que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del

suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Lithic Haplustepts**

KEDB. Otros Haplustepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplustepts**

KEDC. Otros Haplustepts que tienen:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por menos de cuatro-décimos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Udertic Haplustepts**

KEDD. Otros Haplustepts que tienen:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Torrertic Haplustepts**

KEDE. Otros Haplustepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Haplustepts**

KEDF. Otros Haplustepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, una fracción de tierra-fina que tiene tanto una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Haplustepts

KEDG. Otros Haplustepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina conteniendo 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, el 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### Vitrandic Haplustepts

KEDH. Otros Haplustepts que tienen condiciones antrácicas.

#### Anthraquic Haplustepts

KEDI. Otros Haplustepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Haplustepts

KEDJ. Otros Haplustepts que en años normales están saturados con agua en una o mas capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *ya sea*:

1. 20 o mas días consecutivos; *o*
2. 30 o mas días acumulativos.

#### Oxyaquic Haplustepts

KEDK. Otros Haplustepts que tienen 50 por ciento o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si esta más somero:

1. Una CIC (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) de menos de 24 cmol(+) por kg de arcilla; *o*
2. Tanto una relación de arcilla medida en la fracción de tierra-fina y el porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa de 0.6 o más y lo siguiente: la CIC (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) dividida por el producto de tres veces [Porcentaje

de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos porcentaje de carbono-orgánico (pero no más de 1.00)] es menor de 24.

#### Oxic Haplustepts

KEDL. Otros Haplustepts que tienen lamelas (dos o mas) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lamellic Haplustepts

KEDM. Otros Haplustepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. *Ya sea*:
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Torrifluentic Haplustepts

KEDN. Otros Haplustepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por menos de cuatro-décimos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

2. *Ya sea:*

a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Udifluventic Haplustepts**

KEDO. Otros Haplustepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*

2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Fluventic Haplustepts**

KEDP. Otros Haplustepts que tienen un horizonte gypsic que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Gypsic Haplustepts**

KEDQ. Otros Haplustepts que tienen:

1. Un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C

**Haplocalcic Haplustepts**

KEDR. Otros Haplustepts que tienen:

1. Un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por menos de cuatro-décimos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

**Calcic Udic Haplustepts**

KEDS. Otros Haplustepts que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Calcic Haplustepts**

KEDT. Otros Haplustepts que tienen cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
  - b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C

#### Aridic Haplustepts

KEDU. Otros Haplustepts que tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de menos de 60 por ciento en algún horizonte entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que este más profundo, y una profundidad de 75 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Dystric Haplustepts

KEDV. Otros Haplustepts que tienen cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 105 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por menos de cuatro-décimos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de

humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Haplustepts

KEDW. Otros Haplustepts.

#### Typic Haplustepts

### Xerepts

#### Clave para Grandes Grupos

KFA. Xerepts que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Durixerepts**, pág. 185

KFB. Otros Xerepts que:

1. Tienen un horizonte cálcico con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral o un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Son calcáreos en todas partes arriba del horizonte cálcico o petrocálcico, después de que el suelo entre la superficie del suelo mineral y los 18 cm ha sido mezclado.

**Calcixerepts**, pág. 184

KFC. Otros Xerepts que tienen un fragipán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragixerepts**, pág. 187

KFD. Otros Xerepts que tienen las siguientes:

1. Sin carbonatos libres dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de menos de 60 por ciento en todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 75 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

**Dystroxerepts**, pág. 186

KFE. Otros Xerepts.

**Haploxerepts**, pág. 188

### Calcixerepts

#### Clave para Subgrupos

KFBA. Calcixerepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Calcixerepts**

KFBB. Otros Calcixerepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tienen su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Calcixerepts**

KFBC. Otros Calcixerepts que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### **Petrocalcic Calcixerepts**

KFBD. Otros Calcixerepts que tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio [RAS] de 13 o más) en uno o más subhorizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Sodic Calcixerepts**

KFBE. Otros Calcixerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina conteniendo 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, el 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), es de 30 o más.

#### **Vitrandic Calcixerepts**

KFBF. Otros Calcixerepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Calcixerepts**

KFBG. Otros Calcixerepts.

#### **Typic Calcixerepts**

### **Durixerepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KFAA. Durixerepts que tienen:

1. En uno o más horizontes encima del duripán y dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas y prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
    - (2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Durixerepts**

KFAB. Otros Durixerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Durixerepts**

KFAC. Otros Durixerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, encima del duripán y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Durixerepts**

KFAD. Otros Durixerepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas y prominentes *y*

también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Durixerepts

KFAE. Otros Durixerepts que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### Entic Durixerepts

KFAF. Otros Durixerepts.

#### Typic Durixerepts

### Dystroxerepts

#### Clave para Subgrupos

KFDA. Dystroxerepts que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un epipedón úmbrico o mólico.

#### Humic Lithic Dystroxerepts

KFDB. Otros Dystroxerepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Dystroxerepts

KFDC. Otros Dystroxerepts que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

- a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
- b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Dystroxerepts

KFDD. Otros Dystroxerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Dystroxerepts

KFDE. Otros Dystroxerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Dystroxerepts

KFDF. Otros Dystroxerepts que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Fragiaquic Dystroxerepts

KFDG. Otros Dystroxerepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados); *y*
2. *Ya sea*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie de

un suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluvaquentic Dystroxepts**

KFDH. Otros Dystroxepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o artificialmente drenados).

#### **Aquic Dystroxepts**

KFDI. Otros Dystroxepts que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Dystroxepts**

KFDJ. Otros Dystroxepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Dystroxepts**

KFDK. Otros Dystroxepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

1. Un epipedón úmbrico o mólico; *y*
2. *Ya sea*
  - a. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Humic Dystroxepts**

KFDL. Otros Dystroxepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (período Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (período Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un

contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Fluventic Dystroxepts**

KFDM. Otros Dystroxepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### **Humic Dystroxepts**

KFDN. Otros Dystroxepts.

#### **Typic Dystroxepts**

### **Fragixerepts**

#### **Clave para Subgrupos**

KFCA. Fragixerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Fragixerepts**

KFCB. Otros Fragixerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Fragixerepts**

KFCC. Otros Fragixerepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas y prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Fragixerepts**

KFCD. Otros Fragixerepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### **Humic Fragixerepts**

KFCE. Otros Fragixerepts.

#### **Typic Fragixerepts**

## Haploxerepts

### Clave para Subgrupos

KFEA. Haploxerepts que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Un epipedón úmbrico o mólico.

### Humic Lithic Haploxerepts

KFEB. Otros Haploxerepts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Haploxerepts

KFEC. Otros haploxerepts que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Vertic Haploxerepts

KFED. Otros Haploxerepts que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Aquandic Haploxerepts

KFEE. Otros Haploxerepts que tienen:

1. En uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; y
2. Saturación con agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; o
  - b. 30 o más días acumulativos.

### Andic Oxyaquic Haploxerepts

KFEF. Otros Haploxerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### Andic Haploxerepts

KFEG. Otros Haploxerepts que tienen:

1. Saturación con agua dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; o
  - b. 30 o más días acumulativos; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Oxyaquic Vitrandic Haploxerepts

KFEH. Otros Haploxerepts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
- En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Haploxerepts**

KFEL. Otros Haploxerepts que tienen un horizonte gypstico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Gypsic Haploxerepts**

KFEJ. Otros Haploxerepts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haploxerepts**

KFEK. Otros Haploxerepts que tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Haploxerepts**

KFEL. Otros Haploxerepts que tienen propiedades frágicas de suelo:

- En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fraglic Haploxerepts**

KFEM. Otros Haploxerepts que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y*

- A una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral, un contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno) de 0.2 por ciento o más y no existe un contacto denso, lítico o paralítico dentro de esa profundidad; *o*
- Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico (periodo Holoceno), entre una profundidad de 25 cm y 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluventic Haploxerepts**

KFEN. Otros Haploxerepts que tienen un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de *una* de las siguientes combinaciones de clase de tamaño de partícula y profundidades:

- Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- Una clase de tamaño de partícula arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- Cualquier otra clase de tamaño de partícula y dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Haploxerepts**

KFEO. Otros Haploxerepts que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

#### **Humic Haploxerepts**

KFEP. Otros Haploxerepts.

#### **Typic Haploxerepts**



## CAPÍTULO 12

### *Mollisols*

#### Clave para Subórdenes

##### IA. Mollisols que tienen:

1. Un horizonte argílico o nátrico; *y*
2. Un horizonte álbico con un chroma de 2 o menos y tiene 2.5 cm o más de espesor, con su límite inferior a 18 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral y que subyace directamente abajo de un epipedón mólico o que separe horizontes que en conjunto satisfacen todos los requisitos para un epipedón mólico; *y*
3. En uno o más subhorizontes del horizonte álbico y/o del argílico o nátrico y dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox en forma de masas o concreciones o ambas, y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

Albolls, pág. 192

IB. Otros Mollisols que tienen, sobre un contacto dénsico, lítico o paralítico o en una capa a una profundidad entre 40 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más somero, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial), y *una o más* de las siguientes:

1. Un epipedón hístico encima del epipedón mólico; *o*
2. Un porcentaje de sodio intercambiable (PSI) de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio [RAS] de 13 o más) en la parte superior del epipedón mólico, y una disminución en los valores de PSI (o RAS) con el incremento de la profundidad abajo de los 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
3. Un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
4. *Uno* de los siguientes colores:
  - a. Un chroma de 1 o menos en la parte inferior del epipedón mólico<sup>1</sup>, y *ya sea*:
    - (1) Concentraciones redox distintivas o prominentes en la parte inferior del epipedón mólico; *o*

(2) Directamente abajo del epipedón mólico o dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral si interviene un horizonte cálcico, un color del value, en húmedo, de 4 o más y *uno* de los siguientes:

- (a) 50 por ciento o más de chroma de 1 sobre las caras de los agregados o en la matriz, un hue de 10YR o más rojizo, y concentraciones redox; *o*
- (b) 50 por ciento o más de chroma de 2 o menos sobre las caras de los agregados o en la matriz un hue de 2.5Y, y concentraciones redox; *o*
- (c) 50 por ciento o más de chroma de 1 sobre las caras de los agregados o en la matriz, y un hue de 2.5Y, o más amarillento; *o*
- (d) 50 por ciento o más de chroma de 3 o menos sobre las caras de los agregados o en la matriz un hue de 5Y, y concentraciones redox; *o*
- (e) 50 por ciento o más de chroma de 0 sobre las caras de los agregados o en la matriz; *o*
- (f) Un hue de 5GY, 5G. 5BG, o 5B; *o*
- (g) Cualquier color si es el resultado de granos de arena no recubiertos; *o*

b. Un chroma de 2 en la parte inferior del epipedón mólico, *ya sea*:

- (1) Con concentraciones redox distintivas o prominentes en la parte inferior del epipedón mólico; *o*
- (2) Directamente abajo del epipedón mólico, uno de los siguientes colores, en la matriz:
  - (a) Un color del value, en húmedo de 4, un chroma de 2, y algunos empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 1 o menos; *o*
  - (b) Un color del value, en húmedo, de 5 o más, un chroma de 2 o menos, y concentraciones redox; *o*
  - (c) Un color del value, en húmedo, de 4 y un chroma de 1 o menos; *o*

6. A una profundidad entre 40 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

Aquolls, pág. 193

<sup>1</sup> Si el epipedón mólico se extiende hacia un contacto lítico dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, se obvian los requisitos para los rasgos redoximórficos.

IC. Otros Mollisols que:

1. Tienen un epipedón mólico menor de 50 cm de espesor; *y*
2. No tienen un horizonte argílico o cálcico; *y*
3. Tienen, dentro o directamente abajo de un epipedón mólico, materiales minerales de suelo menores de 7.5 cm de diámetro que tienen un porcentaje de CaCO<sub>3</sub> equivalente de 40 o más; *y*
4. Tienen un régimen de humedad údico o un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Rendolls**, pág. 201

ID. Otros Mollisols que tienen, en años normales, una temperatura del suelo media anual de 0 °C o más fría y una temperatura del suelo media de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O

**Gelolls**, pág. 200

IE. Otros Mollisols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryolls**, pág. 197

IF. Otros Mollisols que tienen un régimen de humedad xérico o un régimen de humedad arídico que limita con un xérico.

**Xerolls**, pág. 224

IG. Otros Mollisols que tienen un régimen de humedad ústico o un régimen de humedad arídico que limita con un ústico.

**Ustolls**, pág. 209

IH. Otros Mollisols.

**Udolls**, pág. 201

## Albolls

### Clave para Grandes Grupos

IAA. Albolls que tienen un horizonte nátrico.

**Natralbolls**, pág. 193

IAB. Otros Albolls.

**Argialbolls**, pág. 192

## Argialbolls

### Clave para Subgrupos

IABA. Argialbolls que tienen *ambos*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años

normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*

2. Si no está irrigado, una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por 45 o más días consecutivos durante los 120 días siguientes al solsticio de verano.

### Xerertic Argialbolls

IABB. Otros Argialbolls los cuales tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

### Vertic Argialbolls

IABC. Otros Argialbolls que:

1. No tienen un cambio textural abrupto del horizonte albico al horizonte argílico; *y*

2. Si no están irrigados, tienen una sección de control de humedad que en años normales, está seca en todas partes por 45 o más días consecutivos durante los 120 días siguientes al solsticio de verano.

### Argiaquic Xeric Argialbolls

IABD. Otros Argialbolls que no tienen un cambio textural abrupto del horizonte albico al argílico.

### Argiaquic Argialbolls

IABE. Otros Argialbolls que, si no están irrigados, tienen una sección de control de humedad que en años normales, está seca en todas partes por 45 o más días consecutivos durante los 120 días siguientes al solsticio de verano.

### Xeric Argialbolls

IABF. Otros Argialbolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Argialbolls

IABG. Otros Argialbolls.

#### Typic Argialbolls

### Natralbolls

#### Clave para Subgrupos

IAAA. Natralbolls que tienen cristales visibles de yeso *y/o* sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Natralbolls

IAAB. Otros Natralbolls.

#### Typic Natralbolls

### Aquolls

#### Clave para Grandes Grupos

IBA. Aquolls que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

#### Cryaquolls, pág. 194

IBB. Otros Aquolls que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Duraquolls, pág. 194

IBC. Otros Aquolls que tienen un horizonte nátrico.

#### Natraquolls, pág. 196

IBD. Otros Aquolls que tienen un horizonte cálcico o gypsico que tiene su límite superior dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral pero no tienen un horizonte argílico a menos que este enterrado.

#### Calciquolls, pág. 193

IBE. Otros Aquolls que tienen un horizonte argílico.

#### Argiaquolls, pág. 193

IBF. Otros Aquolls que tienen episaturación.

#### Epiaquolls, pág. 195

IBG. Otros Aquolls.

#### Endoaquolls, pág. 194

### Argiaquolls

#### Clave para Subgrupos

IBEA. Argiaquolls que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Argiaquolls

IBEB. Otros Argiaquolls que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Argiaquolls

IBEC. Otros Argiaquolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Argiaquolls

IBED. Otros Argiaquolls que tienen un horizonte argílico que, con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) dentro de sus 7.5 cm superiores.

#### Abruptic Argiaquolls

IBEE. Otros Argiaquolls.

#### Typic Argiaquolls

### Calciquolls

#### Clave para Subgrupos

IBDA. Calciquolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petrocalcic Calciquolls

IBDB. Otros Calciquolls que tienen 50 por ciento o más de chroma de 3 o más sobre las caras de los agregados o en la matriz de uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o que tienen los siguientes colores directamente abajo del epipedón mólico:

1. Un hue de 2.5Y o más amarillento y un chroma de 3 o más; *o*

2. Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o más; *o*

3. Un hue de 2.5Y o más amarillento y un chroma de 2 o más, si no existen concentraciones redox distintivas o prominentes.

#### Aeric Calciquolls

IBDC. Otros Calciaquolls.

### Typic Calciaquolls

## Cryaquolls

### Clave para Subgrupos

IBAA. Cryaquolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

### Vertic Cryaquolls

IBAB. Otros Cryaquolls que tienen un epipedón hístico.

### Histic Cryaquolls

IBAC. Otros Cryaquolls que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

### Thapto-Histic Cryaquolls

IBAD. Otros Cryaquolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Aquandic Cryaquolls

IBAE. Otros Cryaquolls que tienen un horizonte argílico.

### Argic Cryaquolls

IBAF. Otros Cryaquolls que tienen un horizonte cálcico dentro o directamente abajo del epipedón mólico.

### Calcic Cryaquolls

IBAG. Otros Cryaquolls que tienen un epipedón mólico de 50 cm o más de espesor.

### Cumulic Cryaquolls

IBAH. Otros Cryaquolls.

### Typic Cryaquolls

## Duraquolls

### Clave para Subgrupos

IBBA. Duraquolls que tienen un horizonte nátrico.

### Natric Duraquolls

IBBB. Otros Duraquolls que tienen, encima del duripán, *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más.

### Vertic Duraquolls

IBBC. Otros Duraquolls que tienen un horizonte argílico.

### Argic Duraquolls

IBBD. Otros Duraquolls.

### Typic Duraquolls

## Endoquolls

### Clave para Subgrupos

IBGA. Endoquolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Endoquolls

IBGB. Otros Endoquolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico cualquiera que sea más somero; *y*

2. Un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor.

#### Cumulic Vertic Endoaquolls

IBGC. Otros Endoaquolls que tienen las siguientes:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Fluvaquentic Vertic Endoaquolls

IBGD. Otros Endoaquolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Endoaquolls

IBGE. Otros Endoaquolls que tienen un epipedón hístico.

#### Histic Endoaquolls

IBGF. Otros Endoaquolls que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Thapto-Histic Endoaquolls

IBGG. Otros Endoaquolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Endoaquolls

IBGH. Otros Endoaquolls que tienen un horizonte, de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando está húmedo.

#### Duric Endoaquolls

IBGI. Otros Endoaquolls que tienen un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor.

#### Cumulic Endoaquolls

IBGJ. Otros Endoaquolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Fluvaquentic Endoaquolls

IBGK. Otros Endoaquolls.

#### Typic Endoaquolls

#### Epiaquolls

#### Clave para Subgrupos

IBFA. Epiaquolls que tienen ambas de las siguientes:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*

- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. Un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor.

#### Cumulic Vertic Epiaquolls

IBFB. Otros Epiaquolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Fluvaquentic Vertic Epiaquolls

IBFC. Otros Epiaquolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Epiaquolls

IBFD. Otros Epiaquolls que tienen un epipedón hístico.

#### Histic Epiaquolls

IBFE. Otros Epiaquolls que tienen una capa enterrada de materiales orgánicos de suelo, de 20 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Thapto-Histic Epiaquolls

IBFF. Otros Epiaquolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los

75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*
2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejan a pómez; *o*
3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Aquandic Epiaquolls

IBFG. Otros Epiaquolls que tienen un horizonte, de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando está húmedo.

#### Duric Epiaquolls

IBFH. Otros Epiaquolls que tienen un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor.

#### Cumulic Epiaquolls

IBFI. Otros Epiaquolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### Fluvaquentic Epiaquolls

IBFJ. Otros Epiaquolls.

#### Typic Epiaquolls

#### Natraquolls

#### Clave para Subgrupos

IBCA. Natraquolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Natraquolls

IBCB. Otros Natraquolls que tienen un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico.

#### Glossic Natraquolls

IBCC. Otros Natraquolls.

#### Typic Natraquolls

### Cryolls

#### Clave para Grandes Grupos

IEA. Cryolls que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duricryolls**, pág. 198

IEB. Otros Cryolls que tienen un horizonte nátrico.

**Natricryolls**, pág. 200

IEC. Otros Cryolls que tiene *ambas*:

1. Un horizonte argílico que tiene su límite superior 60 cm o más, abajo de la superficie del suelo mineral; y

2. Una textura más fina que la arena francosa fina en todos los horizontes encima del horizonte argílico.

**Palecryolls**, pág. 200

IED. Otros Cryolls que tienen un horizonte argílico.

**Argicryolls**, pág. 197

IEE. Otros Cryolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. En todas partes encima del horizonte cálcico o petrocálcico, después de que los materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm han sido mezclados, son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa.

**Calcicryolls**, pág. 198

IEF. Otros Cryolls.

**Haplocryolls**, pág. 199

### Argicryolls

#### Clave para Subgrupos

IEDA. Argicryolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Argicryolls

IEDB. Otros Argicryolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 m de la superficie del suelo mineral; o

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Argicryolls

IEDC. Otros Argicryolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Argicryolls

IEDD. Otros Argicryolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Argicryolls

IEDE. Otros Argicryolls que tienen un horizonte argílico que, con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) dentro de sus 7.5 cm superiores.

#### Abruptic Argicryolls

IEDF. Otros Argicryolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo

mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Argicryolls**

IEDG. Otros Argicryolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Argicryolls**

IEDH. Otros Argicryolls que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Pachic Argicryolls**

IEDI. Otros Argicryolls que tienen un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Argicryolls**

IEDJ. Otros Argicryolls que tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Argicryolls**

IEDK. Otros Argicryolls que tienen *ya sea*:

1. Encima del horizonte argílico, un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para un epipedón mólico y un chroma tan alto para un horizonte álbico; *o*
2. Un horizonte glóssico *o* interdigitaciones de materiales álbicos dentro de la parte superior del horizonte argílico *o* esqueletanes de limo y arena limpios que cubren 50 por ciento o más de las caras de los agregados en los 5 cm superiores del horizonte argílico.

#### **Alfic Argicryolls**

IEDL. Otros Argicryolls que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustic Argicryolls**

IEDM. Otros Argicryolls que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Argicryolls**

IEDN. Otros Argicryolls.

#### **Typic Argicryolls**

## **Calcicryolls**

### **Clave para Subgrupos**

IEEA. Calcicryolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Calcicryolls**

IEEB. Otros Calcicryolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Calcicryolls**

IEEC. Otros Calcicryolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Calcicryolls**

IEED. Otros Calcicryolls que tienen un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Calcicryolls**

IEEE. Otros Calcicryolls que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustic Calcicryolls**

IEEF. Otros Calcicryolls que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Calcicryolls**

IEEG. Otros Calcicryolls.

#### **Typic Calcicryolls**

## **Duricryolls**

### **Clave para Subgrupos**

IEAA. Duricryolls que tienen un horizonte argílico.

#### **Argic Duricryolls**

IEAB. Otros Duricryolls que tienen un horizonte cálcico encima del duripán.

#### **Calcic Duricryolls**

IEAC. Otros Duricryolls.

### Typic Duricryolls

## Haplocryolls

### Clave para Subgrupos

IEFA. Haplocryolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Haplocryolls

IEFB. Otros Haplocryolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

### Vertic Haplocryolls

IEFC. Otros Haplocryolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

### Andic Haplocryolls

IEFD. Otros Haplocryolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

### Vitrandic Haplocryolls

IEFE. Otros Haplocryolls que tienen:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico de una profundidad de 25 cm abajo de la superficie

del suelo mineral y 125 de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico si esta más somero; *y*

3. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y*
4. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintas o prominentes y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Cumulic Haplocryolls

IEFF. Otros Haplocryolls que tienen:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico de una profundidad de 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral y 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
3. Una pendiente menor de 25 por ciento.

### Cumulic Haplocryolls

IEFG. Otros Haplocryolls que tienen *ambos*:

1. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintas o prominentes y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Fluvaquentic Haplocryolls

IEFH. Otros Haplocryolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintas o prominentes y también condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Haplocryolls

IEFI. Otros Haplocryolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Haplocryolls

IEFJ. Otros Haplocryolls que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*

2. Un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Pachic Haplocryolls**

IEFK. Otros Haplocryolls que tienen un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Haplocryolls**

IEFL. Otros Haplocryolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluventic Haplocryolls**

IEFM. Otros Haplocryolls que tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Haplocryolls**

IEFN. Otros Haplocryolls que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustic Haplocryolls**

IEFO. Otros Haplocryolls que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Haplocryolls**

IEFP. Otros Haplocryolls.

#### **Typic Haplocryolls**

### **Natricryolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IEBA. Todos los Natricryolls.

#### **Typic Natricryolls**

### **Palecryolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IECA. Palecryolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Palecryolls**

IECB. Otros Palecryolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Palecryolls**

IECC. Otros Palecryolls que tienen un horizonte argílico que, con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) dentro de sus 7.5 cm superiores.

#### **Abruptic Palecryolls**

IECD. Otros Palecryolls que tienen un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Palecryolls**

IECE. Otros Palecryolls que tienen un régimen de humedad ústico.

#### **Ustic Palecryolls**

IECF. Otros Palecryolls que tienen un régimen de humedad xérico.

#### **Xeric Palecryolls**

IECG. Otros Palecryolls.

#### **Typic Palecryolls**

### **Gelolls**

#### **Clave para Grandes Grupos**

IDA. Todos los Gelolls.

**Haplogelolls**, pág. 200

### **Haplogelolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IDAA. Haplogelolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplogelolls**

IDAB. Otros Haplogelolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Haplogelolls**

IDAC. Otros Haplogelolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox distintivas o prominentes y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplogelolls**

IDAD. Otros Haplogelolls que tienen:

1. Un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un

contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

### Cumulic Haplogelolls

IDAE. Otros Haplogelolls.

### Typic Haplogelolls

## Rendolls

### Clave para Grandes Grupos

ICA. Rendolls que tienen un régimen de temperatura cryico.

Cryrendolls, pág. 201

ICB. Otros Rendolls.

Haprendolls, pág. 201

### Cryrendolls

#### Clave para Subgrupos

ICAA. Cryrendolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

Lithic Cryrendolls

ICAB. Otros Cryrendolls.

Typic Cryrendolls

### Haprendolls

#### Clave para Subgrupos

ICBA. Haprendolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

Lithic Haprendolls

ICBB. Otros Haprendolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

Vertic Haprendolls

ICBC. Otros Haprendolls que tienen un horizonte cámbico.

Inceptic Haprendolls

ICBD. Otros Haprendolls que tienen un color del value, en seco, de 6 o más en los 18 cm superiores del epipedón mólico,

después de mezclados, o en un horizonte Ap de 18 cm o más de espesor.

Entic Haprendolls

ICBE. Otros Haprendolls.

Typic Haprendolls

## Udolls

### Clave para Grandes Grupos

IHA. Udolls que tienen un horizonte nátrico.

Natriudolls, pág. 207

IHB. Otros Udolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. No tiene un horizonte argílico sobre el horizonte cálcico o petrocálcico; *y*
3. En todas partes encima del horizonte cálcico o petrocálcico, después de que los materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm han sido mezclados, son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa.

Calciudolls, pág. 204

IHC. Otros Udolls que tienen *una o más* de las siguientes:

1. Un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. *Todas* las siguientes:
  - a. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
  - b. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, una disminución de arcilla, con el incremento de la profundidad, de menos de 20 por ciento (relativo) del máximo contenido de arcilla (arcilla no carbonatada); *y*
  - c. Un horizonte argílico con una o más de las siguientes:
    - (1) En 50 por ciento o más de la matriz de uno o más subhorizontes en su mitad inferior, un hue de 7.5YR o más rojizo y un chroma de 5 o más; *o*
    - (2) En 50 por ciento o más de la matriz de horizontes que en total más de la mitad de su espesor, un hue de 2.5YR o más rojizo, un value, en húmedo, de 3 o menos y un value, en seco, de 4 o menos; *o*
    - (3) Muchas concentraciones redox con un hue de 5YR o más rojizo; o un chroma de 6 o más, o ambos, en uno o más o ambos, en uno o más subhorizontes; *o*
3. Un régimen de temperatura frígido; *y ambas*

- a. Un horizonte argílico que tiene su límite superior 60 cm o más, abajo de la superficie del suelo mineral; *y*
- b. Una textura más fina que la arena francosa fina en todos los horizontes encima del horizonte argílico.

**Paleudolls**, pág. 208

IHD. Otros Udolls que tienen un horizonte argílico.

**Argiudolls**, pág. 202

IHE. Otros Udolls que tienen un epipedón mólico que:

1. Abajo de un horizonte Ap o abajo de una profundidad de 18 cm a partir de la superficie del suelo mineral, contiene 50 por ciento o más (por volumen) hoyos o deposiciones de lombrices o rellenos de madrigueras de animales; *y*
2. Restos sobre un contacto lítico o en una zona de transición a horizontes subyacentes en los que 25 por ciento o más del volumen del suelo consiste de hoyos o deposiciones de lombrices o rellenos de madrigueras de animales discretos con materiales del epipedón mólico y del horizonte subyacente.

**Vermudolls**, pág. 208

IHF. Otros Udolls.

**Hapludolls**, pág. 205

## Argiudolls

### Clave para Subgrupos

IHDA. Argiudolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Argiudolls

IHDB. Otros Argiudolls que tienen *ambos*:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *y ya sea*:
  - a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*
    - (3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15

cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

**Aquertic Argiudolls**

IHDC. Otros Argiudolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. En años normales saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

**Oxyaquic Vertic Argiudolls**

IHDD. Otros Argiudolls que tienen:

1. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea*:
  - a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
  - b. 50 cm o más de espesor; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

**Pachic Vertic Argiudolls**

IHDE. Otros Argiudolls que tienen:

1. Encima de un horizonte argílico, un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para ser un epipedón mólico y un chroma tan alto para ser un horizonte álbico; *o*

2. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro de la parte superior del horizonte argílico, o esqueletanos de limos y arenas limpios que cubren 50 por ciento o más de las caras de los agregados en los 5 cm superiores del horizonte argílico; y

3. *Ya sea:*

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Alfic Vertic Argiudolls**

IHDF. Otros Argiudolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Vertic Argiudolls**

IHDG. Otros Argiudolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Argiudolls**

IHDH. Otros Argiudolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o

2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; y

b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Argiudolls**

IHDI. Otros Argiudolls que tienen:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea:*

a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; o

b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:

(1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; o

(2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; o

(3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; y

2. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea:*

a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; o

b. 50 cm o más de espesor.

#### **Aquic Pachic Argiudolls**

IHDJ. Otros Argiudolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea:*

1. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; o

2. 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Argiudolls**

IHDK. Otros Argiudolls que tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *y ya sea:*

1. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; o

2. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:

a. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; o

b. Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; o

c. Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos.

#### **Aquic Argiudolls**

IHDL. Otros Argiudolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas:*

1. 20 o más días consecutivos; o

2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Argiudolls

IHDM. Otros Argiudolls que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente, y encima de esos horizontes existen *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

### Lamellic Argiudolls

IHDN. Otros Argiudolls que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o de todo el horizonte argílico si es menor de 75 cm de espesor.

### Psammentic Argiudolls

IHDO. Otros Argiudolls que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más.

### Arenic Argiudolls

IHDP. Otros Argiudolls que tienen un horizonte argílico que, con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) dentro de sus 7.5 cm superiores.

### Abruptic Argiudolls

IHDQ. Otros Argiudolls que tienen:

1. Encima de un horizonte argílico, un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para ser un epipedón mólico y un chroma tan alto para ser un horizonte álbico; *o*
2. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro de la parte superior del horizonte argílico, o esqueletanos de limos y arenas limpios que cubren 50 por ciento o más de las caras de los agregados en los 5 cm superiores del horizonte argílico.

### Alfic Argiudolls

IHDR. Otros Argiudolls que tienen una CIC aparente de menos de 24 cmol(+)/kg de arcilla (por NH<sub>4</sub>OAc 1 N a pH 7)

en 50 por ciento o más de ya sea el horizonte argílico si es menor de 100 cm de espesor o de sus 100 cm superiores.

### Oxic Argiudolls

IHDS. Otros Argiudolls que tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

### Calcic Argiudolls

IHDT. Otros Argiudolls.

### Typic Argiudolls

## Calciudolls

### Clave para Subgrupos

IHBA. Calciudolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

### Lithic Calciudolls

IHBB. Otros Calciudolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

### Vertic Calciudolls

IHBC. Otros Calciudolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Calciudolls

IHBD. Otros Calciudolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*:

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más a una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto lítico o paralítico, si está más somero.

### Fluventic Calciudolls

IHBE. Otros Calciudolls

### Typic Calciudolls

## Hapludolls

### Clave para Subgrupos

IHFA. Hapludolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Hapludolls

IHFB. Otros Hapludolls que tienen *ambas*:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*
    - (3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Aquertic Hapludolls

IHFC. Otros Hapludolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*
2. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea*:
  - a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*

- b. 50 cm o más de espesor.

#### Pachic Vertic Hapludolls

IHFD. Otros Hapludolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### Vertic Hapludolls

IHFE. Otros Hapludolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Hapludolls

IHFF. Otros Hapludolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos por oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrandic Hapludolls

IHFG. Otros Hapludolls que tienen:

1. *Ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor, de los cuales menos de 50 por ciento tiene una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa y si no existe un contacto denso o paralítico no tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a una profundidad entre 40 y 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor, de los cuales 50 por ciento o más de ese espesor tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*

2. Un 0.3 por ciento o más de carbono-orgánico a una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
3. Una pendiente de 25 por ciento o menos; *y*
4. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Cumulic Hapludolls**

IHFH. Otros Hapludolls que tienen:

1. *Ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor, de los cuales menos de 50 por ciento tiene una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa y si no existe un contacto denso o paralítico no tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a una profundidad entre 40 y 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor, de los cuales 50 por ciento o más de ese espesor tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Un 0.3 por ciento o más de carbono-orgánico a una profundidad de 125 cm abajo de la superficie del suelo mineral o una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
3. Una pendiente de 25 por ciento o menos.

#### **Cumulic Hapludolls**

IHFI. Otros Hapludolls que tienen *ambos*:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*
    - (3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

- a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluvaquentic Hapludolls**

IHFJ. Otros Hapludolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluventic Hapludolls**

IHFK. Otros Hapludolls que tienen:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial):
  - a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*
    - (3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; *y*
2. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene:
  - a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
  - b. 50 cm o más de espesor.

#### **Aquic Pachic Hapludolls**

IHFL. Otros Hapludolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene:

1. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
2. 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Hapludolls**

IHFM. Otros Hapludolls que tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial):

1. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
2. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
  - a. Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
  - b. Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*
  - c. Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos.

#### **Aquic Hapludolls**

IHFN. Otros Hapludolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Hapludolls**

IHFO. Otros Hapludolls que tienen:

1. Un epipedón mólico de 60 cm o más de espesor, que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y contiene 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos o deposiciones de lombrices o madrigueras de animales rellenas abajo de un horizonte Ap o abajo de una profundidad de 18 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Que no tengan un horizonte cámbico y que en la parte inferior del epipedón mólico no reúnen todos los requisitos para un horizonte cámbico excepto para el color o tengan carbonatos a través del horizonte cámbico o en la parte inferior del epipedón mólico.

#### **Vermic Hapludolls**

IHFV. Otros Hapludolls que tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Hapludolls**

IHFQ. Otros Hapludolls que, *ya sea*:

1. No tienen un horizonte cámbico y en cualquier parte del epipedón mólico abajo de los 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, no reúnen todos los requisitos para un horizonte cámbico, excepto para el color; *o*
2. Tengan carbonatos libres a través del horizonte cámbico o en todas partes del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Hapludolls**

IHFR. Otros Hapludolls.

#### **Typic Hapludolls**

## **Natrudolls**

### **Clave para Subgrupos**

IHAA. Natrudolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Natrudolls**

IHAB. Otros Natrudolls que tienen *ambos*:

1. Cristales visibles de yeso y/o sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Leptic Vertic Natrudolls**

IHAC. Otros Natrudolls que tienen:

1. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Glossic Vertic Natrudolls**

IHAD. Otros Natrudolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a

un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Vertic Natrudolls**

IHAE. Otros Natrudolls que tienen cristales visibles de yeso y/o sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Leptic Natrudolls**

IHAF. Otros Natrudolls que tienen un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro del horizonte nátrico.

#### **Glossic Natrudolls**

IHAG. Otros Natrudolls que tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Natrudolls**

IHAH. Otros Natrudolls.

#### **Typic Natrudolls**

### **Paleudolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IHCA. Paleudolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Vertic Paleudolls**

IHCB. Otros Paleudolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Paleudolls**

IHCC. Otros Paleudolls que tienen:

1. Condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) *ya sea*:
  - a. Dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, horizontes que tienen rasgos redoximórficos; *o*
  - b. Dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, uno o más horizontes con un espesor total de 15 cm o más que tienen *una o más* de las siguientes:
    - (1) Un color del value, en húmedo, de 4 o más y empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos; *o*
    - (2) Un hue de 10YR o más rojizo y un chroma de 2 o menos; *o*

- (3) Un hue de 2.5YR o más amarillento y un chroma de 3 o menos; *y*

2. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea*:

- a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
- b. 50 cm o más de espesor.

#### **Aquic Pachic Paleudolls**

IHCD. Otros Paleudolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Paleudolls**

IHCE. Otros Paleudolls que tienen, en uno o más subhorizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Paleudolls**

IHCF. Otros Paleudolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Paleudolls**

IHCG. Otros Paleudolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. En todas partes encima del horizonte cálcico, después de que los materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm han sido mezclados, son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa.

#### **Calcic Paleudolls**

IHCH. Otros Paleudolls.

#### **Typic Paleudolls**

### **Vermudolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IHEA. Vermudolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Vermudolls**

IHEB. Otros Vermudolls que tienen un epipedón mólico de menos de 75 cm de espesor.

#### **Haplic Vermudolls**

IHEC. Otros Vermudolls.

#### **Typic Vermudolls**

## Ustolls

### Clave para Grandes Grupos

IGA. Ustolls que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Durustolls**, pág. 214

IGB. Otros Ustolls que tienen un horizonte nátrico.

**Natrustolls**, pág. 220

IGC. Otros Ustolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico o gypsico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral o un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. No tienen un horizonte argílico sobre el horizonte cálcico, gypsico o petrocálcico; y

3. En todas partes encima del horizonte cálcico, gypsico o petrocálcico, después de que los materiales entre la superficie del suelo y una profundidad de 18 cm han sido mezclados, son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa.

**Calciustolls**, pág. 213

IGD. Otros Ustolls que tienen, *ya sea*:

1. Un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; o

2. Un horizonte argílico que tiene *una o ambas* de las siguientes:

a. Con el incremento de la profundidad, la arcilla no decrece de 20 por ciento o más (relativo) del máximo contenido de arcilla (arcilla no carbonatada) dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral (y no tiene un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de esa profundidad); y *ya sea*:

(1) Un hue de 7.5YR o más rojizo y un chroma de 5 o más en la matriz; o

(2) Concentraciones redox comunes con un hue de 7.5YR o más rojizo o un chroma de 6 o más, o ambos; o

b. 35 por ciento o más de arcilla en su parte superior y un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm en la fracción de tierra-fina (y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral).

**Paleustolls**, pág. 222

IGE. Otros Ustolls que tienen un horizonte argílico.

**Argiustolls**, pág. 209

IGF. Otros Ustolls que tienen un epipedón mólico que:

1. Abajo de un horizonte Ap o abajo de una profundidad de 18 cm a partir de la superficie del suelo mineral, que contiene 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos o deposiciones de lombrices o madrigueras de animales rellenas; y

2. Restos sobre un contacto lítico o tiene una zona de transición a horizontes subyacentes en los cuales 25 por ciento o más del volumen del suelo consiste de hoyos o deposiciones de lombrices o rellenos de madrigueras de animales discretos con materiales del epipedón mólico y del horizonte subyacente.

**Vermustolls**, pág. 224

IGG. Otros Ustolls.

**Haplustolls**, pág. 215

## Argiustolls

### Clave para Subgrupos

IGEA. Argiustolls que tienen:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; o

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; o

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; y

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

**Aridic Lithic Argiustolls**

IGEB. Otros Argiustolls que tienen *ambos*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Encima de un horizonte argílico, ya sea un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para ser un

epipedón mólico y un chroma tan alto para ser un horizonte álbico.

#### **Alfic Lithic Argiustolls**

IGEC. Otros Argiustolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Argiustolls**

IGED. Otros Argiustolls que tienen:

1. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Aquertic Argiustolls**

IGEE. Otros Argiustolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; y
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

- (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; y
- (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Torrertic Argiustolls**

IGEF. Otros Argiustolls que tienen las siguientes:

1. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que es *ya sea*:
  - a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
  - b. 50 cm o más de espesor; y
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; y
3. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por cuatro-décimos o menos de los días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Pachic Udertic Argiustolls**

IGEG. Otros Argiustolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña,

en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:

a. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udertic Argiustolls

IGEH. Otros Argiustolls que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

2. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que es *ya sea*:

a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*

b. 50 cm o más de espesor.

#### Pachic Vertic Argiustolls

IGEI. Otros Argiustolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### Vertic Argiustolls

IGEJ. Otros Argiustolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Argiustolls

IGEK. Otros Argiustolls que tienen *ambos*:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos que 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### Vitrorrandic Argiustolls

IGEL. Otros Argiustolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos que 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas con 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Vitrandic Argiustolls**

IGEM. Otros Argiustolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos *y* también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Argiustolls**

IGEN. Otros Argiustolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Argiustolls**

IGEO. Otros Argiustolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina *y* que tiene *ya sea*:

1. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
2. 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Argiustolls**

IGEP. Otros Argiustolls que tienen *ya sea*:

1. Encima de un horizonte argílico, un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para ser un epipedón mólico *y* un chroma tan alto para ser un horizonte álbico; *o*
2. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro de la parte superior del horizonte argílico, o esqueletanes de limos *y* arenas limpios que cubren 50 por ciento o más de las caras de los agregados en los 5 cm superiores del horizonte argílico.

#### **Alfic Argiustolls**

IGEQ. Otros Argiustolls que tienen *ambos*:

1. Un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido *y* una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico *y* una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente *y* una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Calcídico Argiustolls**

IGER. Otros Argiustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido *y* una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico *y* una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente *y* una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Argiustolls

IGES. Otros Argiustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Argiustolls

IGET. Otros Argiustolls que tienen un horizonte quebradizo que está dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, de 15 cm o más de espesor, y tiene recubrimientos opalinos o 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides.

#### Duric Argiustolls

IGEU. Otros Argiustolls.

#### Typic Argiustolls

### Calciustolls

#### Clave para Subgrupos

IGCA. Calciustolls que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Salidic Calciustolls

IGCB. Otros Calciustolls que tienen un horizonte petrocálcico y un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Petrocalcic Calciustolls

IGCC. Otros Calciustolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Calciustolls

IGCD. Otros Calciustolls que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña,

en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

- (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
- (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Torrertic Calciustolls

IGCE. Otros Calciustolls que tienen:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la

temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udertic Calciustolls

IGCF. Otros Calciustolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### Vertic Calciustolls

IGCG. Otros Calciustolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petrocalcic Calciustolls

IGCH. Otros Calciustolls que tienen un horizonte gypico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Gypsic Calciustolls

IGCI. Otros Calciustolls que tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Calciustolls

IGCJ. Otros Calciustolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Calciustolls

IGCK. Otros Calciustolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea*:

1. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
2. 50 cm o más de espesor.

#### Pachic Calciustolls

IGCL. Otros Calciustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
  - b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Calciustolls

IGCM. Otros Calciustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Calciustolls

IGCN. Otros Calciustolls.

#### Typic Calciustolls

#### Durustolls

#### Clave para Subgrupos

IGAA. Durustolls que tienen un horizonte nátrico encima del duripán.

#### Natric Durustolls

IGAB. Otros Durustolls que:

1. No tienen un horizonte argílico encima del duripán; *y*

2. Tienen un régimen de humedad arídico que limita con un ústico.

#### **Haploduridic Durustolls**

IGAC. Otros Durustolls que tienen un régimen de humedad arídico que limita con un ústico

#### **Argiduridic Durustolls**

IGAD. Otros Durustolls que no tienen un horizonte argílico encima del duripán.

#### **Entic Durustolls**

IGAE. Otros Durustolls que tienen un duripán que está fuertemente cementado o menos cementado en todos los subhorizontes.

#### **Haplic Durustolls**

IGAF. Otros Durustolls.

#### **Typic Durustolls**

### **Haplustolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IGGA. Haplustolls que tienen un horizonte sálico que tiene su límite superior dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Salidic Haplustolls**

IGGB. Otros Haplustolls que tienen, en partes de cada pedón, un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Ruptic-Lithic Haplustolls**

IGGC. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

- (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Aridic Lithic Haplustolls**

IGGD. Otros Haplustolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplustolls**

IGGE. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Aquertic Haplustolls**

IGGF. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la

temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

### **Torrertic Haplustolls**

IGGG. Otros Haplustolls que tienen las siguientes:

1. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que es *ya sea*:

- a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
- b. 50 cm o más de espesor; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

3. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:

- a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por cuatro-décimos o menos de los días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
- b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

### **Pachic Udertic Haplustolls**

IGGH. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*

- a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
- b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

### **Udertic Haplustolls**

IGGI. Otros Haplustolls que tienen:

1. Un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que es *ya sea*:

- a. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
- b. 50 cm o más de espesor; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

- a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

### **Pachic Vertic Haplustolls**

IGGJ. Otros Haplustolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

- 1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o

más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### Vertic Haplustolls

IGGK. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales permanece húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
2. Una CIC aparente (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) de menos de 24 cmol(+) por kg de arcilla en 50 por ciento o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero (si la relación de [porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos el porcentaje de carbono-orgánico] al porcentaje de arcilla medida es de 0.6 o más, entonces el porcentaje de arcilla se considera igual al porcentaje de arcilla medida o a tres veces el [Porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos porcentaje de carbono-orgánico] pero no mayor de 100).

#### Torroxic Haplustolls

IGGL. Otros Haplustolls que tienen una CIC aparente (por NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7) de menos de 24 cmol(+) por kg de arcilla en 50 por ciento o más del volumen del suelo entre una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero (si la relación de [porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos el porcentaje de carbono-orgánico] al porcentaje de arcilla medida es de 0.6 o más, entonces el porcentaje de arcilla se considera igual al porcentaje de arcilla medida o a tres veces el [Porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa menos porcentaje de carbono-orgánico] pero no mayor de 100).

#### Oxic Haplustolls

IGGM. Otros Haplustolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, una fracción de tierra-fina que tiene tanto una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Haplustolls

IGGN. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. Una fracción de tierra-fina conteniendo 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### Vitrorrandic Haplustolls

IGGO. Otros Haplustolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. Una fracción de tierra-fina conteniendo 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Haplustolls**

IGGP. Otros Haplustolls que tienen:

1. *Ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor, de los cuales menos de 50 por ciento tiene una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa y no existe un contacto denso o paralítico y no hay una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a una profundidad entre los 40 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Un epipedón mólico de 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral y 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
3. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y*
4. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Cumulic Haplustolls**

IGGQ. Otros Haplustolls que tienen:

1. *Ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo frígido y un epipedón mólico de 40 cm o más de espesor, de los cuales menos de 50 por ciento tiene una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética arenosa y no existe un contacto denso o paralítico y no hay una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética arenosa a una profundidad entre los 40 y 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Un epipedón mólico de 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral y 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

3. Una pendiente menor de 25 por ciento.

#### **Cumulic Haplustolls**

IGGR. Otros Haplustolls que tienen condiciones antrácuicas.

#### **Anthraquic Haplustolls**

IGGS. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluvaquentic Haplustolls**

IGGT. Otros Haplustolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplustolls**

IGGU. Otros Haplustolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y que tiene *ya sea*:

1. 40 cm o más de espesor en un régimen de temperatura frígido; *o*
2. 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Haplustolls**

IGGV. Otros Haplustolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplustolls**

IGGW. Otros Haplustolls que tienen *ambos*:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales

está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Torrifluventic Haplustolls**

IGGX. Otros Haplustolls que:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *y*

2. *Ya sea*:

a. No tienen un horizonte cámbico y no cumplen, en cualquier parte del epipedón mólico abajo de los 25 cm de la superficie del suelo mineral, todos los requisitos para un horizonte cámbico excepto el color; *o*

b. Tienen carbonatos libres a través del horizonte cámbico o en todas partes del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Torriorthentic Haplustolls**

IGGX. Otros Haplustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Haplustolls**

IGGZ. Otros Haplustolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico desde una profundidad de 25 cm a 125 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Fluventic Haplustolls**

IGGZa. Otros Haplustolls que tienen un horizonte quebradizo que está dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, con 15 cm o más de espesor y tiene recubrimientos opalinos o 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides.

#### **Duric Haplustolls**

IGGZb. Otros Haplustolls que:

1. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen, *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
2. Ya sea que no tienen un horizonte cámbico y no cumplen, en la parte inferior del epipedón mólico, todos los requisitos para un horizonte cámbico excepto el color; o tienen carbonatos a través del horizonte cámbico o de la parte inferior del epipedón mólico.

#### **Udorthentic Haplustolls**

IGGZc. Otros Haplustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *tienen ya sea*

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Udic Haplustolls**

IGGZd. Otros Haplustolls que:

1. No tienen un horizonte cámbico y no cumplen, en cualquier parte del epipedón mólico abajo de los 25 cm de la superficie del suelo mineral, todos los requisitos para un horizonte cámbico excepto el color; *o*
2. Tienen carbonatos libres a través del horizonte cámbico o en todas partes del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Haplustolls**

IGGZe. Otros Haplustolls.

#### **Typic Haplustolls**

## **Natrustolls**

### **Clave para Subgrupos**

IGBA. Natrustolls que tienen todas las siguientes:

1. Cristales visibles de yeso y/o sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero;
3. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Leptic Torrertic Natrustolls**

IGBB. Otros Natrustolls que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través

de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Torrertic Natrustolls**

IGBC. Otros Natrustolls que tienen *ambas* de las siguientes:

1. Cristales visibles de yeso y/o sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Leptic Vertic Natrustolls**

IGBD. Otros Natrustolls que tienen *ambos*:

1. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales albcos dentro de un horizonte nátrico; *y*

2. *Una o ambas* de las siguientes:

a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Glossic Vertic Natrustolls**

IGBE. Otros Natrustolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que sea más somero.

#### **Vertic Natrustolls**

IGBF. Otros Natrustolls que tienen *ambas*:

1. Cristales visibles de yeso y/o sales más solubles dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

(1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura

del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

(2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Leptic Natrustolls

IGBG. Otros Natrustolls que tienen cristales visibles de yeso o sales más solubles, o ambas, dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Natrustolls

IGBH. Otros Natrustolls que tienen, en uno o más horizontes a una profundidad entre 50 y 100 cm a partir de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una* de las siguientes:

1. 50 por ciento o más con chroma de 1 o menos y un hue de 2.5YR o más amarillento; *o*
2. 50 por ciento o más con chroma de 2 o menos y concentraciones redox; *o*
3. 50 por ciento o más con chroma de 2 o menos y también un porcentaje de sodio intercambiable (o una relación de adsorción de sodio) muy alto entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 25 cm en el horizonte subsiguiente.

#### Aquic Natrustolls

IGBI. Otros Natrustolls que cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
  - a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
  - b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Natrustolls

IGBJ. Otros Natrustolls que tienen un horizonte, de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando está húmedo.

#### Duric Natrustolls

IGBK. Otros Natrustolls que tienen un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro de un horizonte nátrico.

#### Glossic Natrustolls

IGBL. Otros Natrustolls.

#### Typic Natrustolls

### Paleustolls

#### Clave para Subgrupos

IGDA. Paleustolls que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando

la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Torrertic Paleustolls**

IGDB. Otros Paleustolls que tienen *ambas*:

1. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *ya sea*:
  - a. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Udertic Paleustolls**

IGDC. Otros Paleustolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Paleustolls**

IGDD. Otros Paleustolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Paleustolls**

IGDE. Otros Paleustolls que tienen un epipedón mólico que tiene una textura más fina que la arena francosa fina y con 50 cm o más de espesor.

#### **Pachic Paleustolls**

IGDF. Otros Paleustolls que tienen un horizonte petrocálcico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Paleustolls**

IGDG. Otros Paleustolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:
  - a. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - c. Cualquier otra clase y dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:
  - a. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - b. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
  - c. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:
    - (1) Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*
    - (2) Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Calcic Paleustolls**

IGDH. Otros paleustolls que, cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura frígido y una sección de control de humedad que en años normales está seca en todas partes por cuatro-décimos o más de los días acumulativos por

año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

3. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; *y*

b. Está seca en alguna o en todas partes por seis-décimos o más de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### Aridic Paleustolls

IGDI. Otros Paleustolls que, cuando no están siendo irrigados ni barbechados para almacenar humedad, *una* de las siguientes:

1. Un régimen de temperatura del suelo méxico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por cuatro-décimos o menos de los días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isoméxico, o un *iso* más caliente y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Paleustolls

IGDJ. Otros Paleustolls que tienen un horizonte cálcico dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

1. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
3. Cualquier otra clase y dentro de los 60 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcic Paleustolls

IGDK. Otros Paleustolls que son calcáreos en todas partes después de que la superficie del suelo ha sido mezclada a una profundidad de 18 cm.

#### Entic Paleustolls

IGDL. Otros Paleustolls.

#### Typic Paleustolls

#### Vermustolls

##### Clave para Subgrupos

IGFA. Vermustolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

##### Lithic Vermustolls

IGFB. Otros Vermustolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

##### Aquic Vermustolls

IGFC. Otros Vermustolls que tienen un epipedón mólico de 75 cm o más de espesor.

##### Pachic Vermustolls

IGFD. Otros Vermustolls que tienen un epipedón mólico de menos de 50 cm de espesor.

##### Entic Vermustolls

IGFE. Otros Vermustolls.

##### Typic Vermustolls

#### Xerolls

##### Clave para Grandes Grupos

IFA. Xerolls que tienen un duripán dentro de los 100 de la superficie del suelo.

##### Durixerolls, pág. 227

IFB. Otros Xerolls que tienen un horizonte nátrico.

##### Natrxerolls, pág. 232

IFC. Otros Xerolls que tienen *ya sea*:

1. Un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Un horizonte argílico que tiene *una o ambas* de las siguientes:

a. Con el incremento de la profundidad, la arcilla no decrece 20 por ciento o más (relativo) a partir del máximo contenido de arcilla (no carbonatada) dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral (y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico a esa profundidad); *y ya sea*

(1) Un hue de 7.5YR o más rojizo y un chroma de 5 o más en la matriz; *o*

(2) Concentraciones redox comunes con un hue de 7.5YR o más rojizo y un chroma de 6 o más, o ambos; *o*

b. Una clase de tamaño de partícula arcillosa o esquelética-arcillosa en su parte superior y en su límite superior, un

incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm, en la fracción de tierra-fina (y no existe un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo).

**Palexerolls**, pág. 232

IFD. Otros Xerolls que:

1. Tienen un horizonte cálcico o gypico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. En todas partes encima del horizonte cálcico o gypico, después de que la superficie del suelo ha sido mezclada a una profundidad de 18 cm, son calcáreos o tienen una textura de arena francosa fina o más gruesa.

**Calcixerolls**, pág. 227

IFE. Otros Xerolls que tienen un horizonte argílico.

**Argixerolls**, pág. 225

IFF. Otros Xerolls.

**Haploxerolls**, pág. 229

## Argixerolls

### Clave para Subgrupos

IFEA. Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre la superficie del suelo mineral o un horizonte Ap, cualquiera que sea más profundo y el contacto lítico.

**Lithic Ultic Argixerolls**

IFEB. Otros Argixerolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

**Lithic Argixerolls**

IFEC. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; y
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o

- b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

**Torrertic Argixerolls**

IFED. Otros Argixerolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; o
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

**Vertic Argixerolls**

IFEE. Otros Argixerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0 por ciento.

**Andic Argixerolls**

IFEF. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; y
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

**Vitritrandic Argixerolls**

IFEG. Otros Argixerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; o
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; y

- a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; y
- b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Argixerolls**

IFEH. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Aquultic Argixerolls**

IFEI. Otros Argixerolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Argixerolls**

IFEJ. Otros Argixerolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Argixerolls**

IFEK. Otros Argixerolls que tienen *ya sea*:

1. Encima del horizonte argílico, un horizonte álbico o un horizonte que tiene un color del value tan alto para un epipedón mólico y un chroma tan alto para un horizonte álbico; o
2. Un horizonte glóssico o interdigitaciones de materiales álbicos dentro de la parte superior del horizonte argílico o esqueletanes de limo y arena limpios que cubren 50 por ciento o más de las caras de los agregados en los 5 cm superiores del horizonte argílico.

#### **Alfic Argixerolls**

IFEL. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:
  - a. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; o

c. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Calcic Pachic Argixerolls**

IFEM. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; y

2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Pachic Ultic Argixerolls**

IFEN. Otros Argixerolls que tienen un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Argixerolls**

IFEQ. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad árido; y

2. Un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral con 15 cm o más de espesor, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando está húmedo.

#### **Argiduridic Argixerolls**

IFEP. Otros Argixerolls que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral con 15 cm o más de espesor, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando está húmedo.

#### **Duric Argixerolls**

IFEQ. Otros Argixerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad árido; y

2. Un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

a. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; o

b. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; o

c. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calciargidic Argixerolls**

IFER. Otros Argixerolls que tienen un régimen de humedad arídico.

#### **Aridic Argixerolls**

IFES. Otros Argixerolls que tienen un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

1. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
3. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Argixerolls**

IFET. Otros Argixerolls que tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Ultic Argixerolls**

IFEU. Otros Argixerolls.

#### **Typic Argixerolls**

### **Calcixerolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IFDA. Calcixerolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Calcixerolls**

IFDB. Otros Calcixerolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Calcixerolls**

IFDC. Otros Calcixerolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (*o* drenaje artificial).

#### **Aquic Calcixerolls**

IFDD. Otros Calcixerolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Calcixerolls**

IFDE. Otros Calcixerolls que tienen un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Calcixerolls**

IFDF. Otros Calcixerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, de las cuales 5 por ciento o más es vidrio volcánico, y [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Calcixerolls**

IFDG. Otros Calcixerolls que tienen un régimen de humedad arídico.

#### **Aridic Calcixerolls**

IFDH. Otros Calcixerolls que tienen un epipedón mólico que tiene, abajo de cualquier horizonte Ap, 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos y deposiciones de lombrices o madrigueras de animales rellenas.

#### **Vermic Calcixerolls**

IFDI. Otros Calcixerolls.

#### **Typic Calcixerolls**

### **Durixerolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IFAA. Durixerolls que tienen encima del duripán, una o ambas de las siguientes:

1. Grietas de 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más.

#### **Vertic Durixerolls**

IFAB. Otros Durixerolls que tienen ambos:

1. Un régimen de humedad arídico; y

2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitritorrandic Durixerolls**

IFAC. Otros Durixerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Durixerolls**

IFAD. Otros Durixerolls que tienen, en uno o más horizontes, encima del duripán, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Durixerolls**

IFAE. Otros Durixerolls que tienen:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*

2. Un horizonte argílico que con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm; *y*

3. Un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte.

#### **Paleargidic Durixerolls**

IFAF. Otros Durixerolls que tienen ambos:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*

2. Un horizonte argílico que con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm.

#### **Abruptic Argiduric Durixerolls**

IFAG. Otros Durixerolls que:

1. Tienen un régimen de humedad arídico; *y*

2. No tienen un horizonte argílico encima del duripán; *y*

3. Tienen un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte.

#### **Cambidic Durixerolls**

IFAH. Otros Durixerolls que:

1. Tienen un régimen de humedad arídico; *y*

2. No tienen un horizonte argílico encima del duripán.

#### **Haploduridic Durixerolls**

IFAI. Otros Durixerolls que tienen:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*

2. Un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte.

#### **Argidic Durixerolls**

IFAJ. Otros Durixerolls que tienen un régimen de humedad arídico.

#### **Argiduridic Durixerolls**

IFAK. Otros Durixerolls que tienen ambos:

1. Un horizonte argílico que con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm; *y*

2. Un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte.

#### **Haplic Palexerollic Durixerolls**

IFAL. Otros Durixerolls que tienen un horizonte argílico que con el incremento de la profundidad, tiene un incremento de arcilla de 20 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm o de 15 por ciento o más (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm.

#### **Palexerollic Durixerolls**

IFAM. Otros Durixerolls que:

1. Tienen un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte; *y*

2. No tienen un horizonte argílico encima del duripán.

#### **Haplic Haploxerollic Durixerolls**

IFAN. Otros Durixerolls que no tienen un horizonte argílico encima del duripán.

#### **Haploxerollic Durixerolls**

IFAO. Otros Durixerolls que tienen un duripán que ni está muy fuertemente cementado ni endurecido en cualquier subhorizonte.

#### **Haplic Durixerolls**

IFAP. Otros Durixerolls.

#### **Typic Durixerolls**

### **Haploxerolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IFFA. Haploxerolls que tienen ambos:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes desde la superficie del suelo mineral o un horizonte Ap, cualquiera que sea más profundo y el contacto lítico.

#### **Lithic Ultic Haploxerolls**

IFFB. Otros Haploxerolls que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo.

#### **Lithic Haploxerolls**

IFFC. Otros Haploxerolls que tienen ambos:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. *Una o ambas* de las siguientes:
  - a. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
  - b. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Torrertic Haploxerolls**

IFFD. Otros Haploxerolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Haploxerolls**

IFFE. Otros Haploxerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua a 33 kPa, y Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0 por ciento.

#### **Andic Haploxerolls**

IFFF. Otros Haploxerolls que tienen ambos:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:
  - a. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
  - b. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
    - (1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
    - (2) [(El Al más ½ Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrorrandic Haploxerolls**

IFFG. Otros Haploxerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más ½ Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Haploxerolls**

IFFH. Otros Haploxerolls que tienen:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero; *y*

3. Una pendiente menor de 25 por ciento; y
4. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Cumulic Haploxerolls**

IFFI. Otros Haploxerolls que tienen:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; y
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; y
3. Una pendiente menor de 25 por ciento; y
4. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Cumulic Ultic Haploxerolls**

IFFJ. Otros Haploxerolls que tienen:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; y
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero; y
3. Una pendiente menor de 25 por ciento.

#### **Cumulic Haploxerolls**

IFFK. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; y *ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; o
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de

profundidad o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Fluvaquentic Haploxerolls**

IFFL. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Aquic Duric Haploxerolls**

IFFM. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Aquiltic Haploxerolls**

IFFN. Otros Haploxerolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haploxerolls**

IFFO. Otros Haploxerolls que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; o
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haploxerolls**

IFFP. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; y
2. Un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

- a. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- c. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Pachic Haploxerolls**

IFFQ. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. Un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y tiene una textura más fina que la arena francosa fina; *y*
2. Una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Pachic Ultic Haploxerolls**

IFFR. Otros Haploxerolls que tienen un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Haploxerolls**

IFFS. Otros Haploxerolls que tienen:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. Una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*
  - a. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Torrifluventic Haploxerolls**

IFFT. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. Un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral que tiene 15 cm o más de espesor y 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duridic Haploxerolls**

IFFU. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. Un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

- a. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- b. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
- c. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Haploxerolls**

IFFV. Otros Haploxerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa en todos los horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Torrripsammentic Haploxerolls**

IFFW. Otros Haploxerolls que tienen:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*
2. *Ya sea*:
  - a. No tienen un horizonte cámbico y no reúnen, en cualquier parte del epipedón mólico abajo de los 25 cm de la superficie del suelo mineral, todos los requisitos para un horizonte cámbico, excepto el color; *o*
  - b. Tienen carbonatos libres a través del horizonte cámbico o en todas partes del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Torriorthentic Haploxerolls**

IFFX. Otros Haploxerolls que tienen un régimen de humedad arídico.

#### **Aridic Haploxerolls**

IFFY. Otros Haploxerolls que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral que tiene 15 cm o más de espesor y 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duric Haploxerolls**

IFFZ. Otros Haploxerolls que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa en todos los horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Psammentic Haploxerolls**

IFFZa. Otros Haploxerolls que tienen una pendiente menor de 25 por ciento; *y ya sea*

1. Un contenido de carbono-orgánico de 0.3 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una disminución irregular en el contenido de carbono-orgánico a partir de los 25 cm abajo de la superficie del suelo mineral hasta los 125 cm de profundidad o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Fluventic Haploxerolls**

IFFZb. Otros Haploxerolls que tienen un epipedón mólico que tiene una estructura granular y que tiene, abajo de cualquier horizonte Ap, 50 por ciento o más (por volumen) de hoyos o deposiciones de lombrices o madrigueras de animales rellenas.

#### **Vermic Haploxerolls**

IFFZc. Otros Haploxerolls que tienen un horizonte cálcico o carbonatos secundarios identificables dentro de una de las siguientes combinaciones de clases de tamaño de partícula (por promedio ponderado de la sección de control del tamaño de partícula) y profundidades:

1. Arenosa o esquelética-arenosa y dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina y dentro de los 90 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
3. Cualquier otra clase dentro de los 110 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Calcic Haploxerolls**

IFFZd. Otros Haploxerolls que:

1. No tienen un horizonte cámbico y no reúnen, en la parte inferior del epipedón mólico, todos los requisitos para un horizonte cámbico, excepto el color; *y*
2. Tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Entic Ultic Haploxerolls**

IFFZe. Otros Haploxerolls que tienen una saturación de bases (por suma de cationes) de 75 por ciento o menos en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 75 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Ultic Haploxerolls**

IFFZf. Otros Haploxerolls que *ya sea*:

1. No tienen un horizonte cámbico y no reúnen, en ninguna parte del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, todos los requisitos para un horizonte cámbico, excepto el color; *o*
2. Tienen carbonatos libres a través de un horizonte cámbico o en todas partes del epipedón mólico abajo de una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Haploxerolls**

IFFZg. Otros Haploxerolls.

#### **Typic Haploxerolls**

### **Natrixerolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IFBA. Natrixerolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Natrixerolls**

IFBB. Otros Natrixerolls que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Un horizonte de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Aquic Duric Natrixerolls**

IFBC. Otros Natrixerolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Natrixerolls**

IFBD. Otros Natrixerolls que tienen un régimen de humedad árido.

#### **Aridic Natrixerolls**

IFBE. Otros Natrixerolls que tienen un horizonte dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral que tiene 15 cm o más de espesor y 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duric Natrixerolls**

IFBF. Otros Natrixerolls.

#### **Typic Natrixerolls**

### **Palexerolls**

#### **Clave para Subgrupos**

IFCA. Palexerolls que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo, con una anchura de 5 mm o más a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o

más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo y una profundidad de 100 cm o a un contacto denso, lítico o paralítico, si está más somero.

#### **Vertic Palexerolls**

IFCB. Otros Palexerolls que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo, *una o ambas* de las siguientes:

1. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*
2. La fracción de tierra-fina contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*
  - a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más es vidrio volcánico; *y*
  - b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en porcentaje, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), de 30 o más.

#### **Vitrandic Palexerolls**

IFCC. Otros Palexerolls que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Palexerolls**

IFCD. Otros Palexerolls que tienen un epipedón mólico con 50 cm o más de espesor y una textura más fina que la arena francosa fina.

#### **Pachic Palexerolls**

IFCE. Otros Palexerolls que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad arídico; *y*

2. Un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Palexerolls**

IFCF. Otros Palexerolls que tienen un horizonte de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, que tiene 20 por ciento o más (por volumen) de durinoides o es quebradizo y tiene una clase de resistencia a la ruptura firme cuando húmedo.

#### **Duric Palexerolls**

IFCG. Otros Palexerolls que tienen un régimen de humedad arídico.

#### **Aridic Palexerolls**

IFCH. Otros Palexerolls que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petrocalcic Palexerolls**

IFCI. Otros Palexerolls que tienen una saturación de bases de 75 por ciento o menos en uno o más subhorizontes dentro del horizonte argílico si es mayor de 50 cm de espesor o dentro de sus 50 cm superiores.

#### **Ultic Palexerolls**

IFCJ. Otros Palexerolls que tienen un horizonte argílico que tiene *ya sea*:

1. Menos de 35 por ciento de arcilla en su parte superior; *o*
2. En su límite superior, un incremento de arcilla que es menor de 20 por ciento (absoluto) dentro de una distancia vertical de 7.5 cm y menor a 15 por ciento (absoluto) dentro de una distancia vertical de 2.5 cm, en la fracción de tierra-fina.

#### **Haplic Palexerolls**

IFCK. Otros Palexerolls.

#### **Typic Palexerolls**



## CAPÍTULO 13

### Oxisols

#### Clave para Subórdenes

EA. Oxisols que tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral y tienen *una o más* de las siguientes:

1. Un epipedón hístico; *o*
2. Un epipedón con un color del value, en húmedo, de 3 o menos, y directamente abajo de él, un horizonte con un chroma de 2 o menos; *o*
3. Concentraciones redox distintivas o prominentes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral un epipedón y directamente abajo de él un horizonte con *una o ambas* de las siguientes:
  - a. 50 por ciento o más de hue de 2.5Y o más amarillento; *o*
  - b. Un chroma de 3 o menos; *o*
4. Dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

**Aquox**, pág. 235

EB. Otros Oxisols que tienen un régimen de humedad árido.

**Torrox**, pág. 240

EC. Otros Oxisols que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustox**, pág. 245

ED. Otros Oxisols que tienen un régimen de humedad perúdico.

**Perox**, pág. 236

EE. Otros Oxisols.

**Udox**, pág. 241

#### Aquox

#### Clave para Grandes Grupos

EAA. Aquox que tienen, en uno o más subhorizontes del horizonte óxico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo

mineral, una CICE aparente de menos de 1.50 cmol(+)/kg de arcilla y un valor de pH (en KCl, 1 N) de 5.0 o más.

**Acraquox**, pág. 235

EAB. Otros Aquox que tienen plintita formando una fase continúa dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthaquox**, pág. 236

EAC. Otros Aquox que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

**Eutraquox**, pág. 235

EAD. Otros Aquox.

**Haplaquox**, pág. 236

#### Acraquox

#### Clave para Subgrupos

EAAA. Acraquox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthic Acraquox**

EAAB. Otros Acraquox que tienen, directamente abajo de un epipedón, un horizonte de 10 cm a más de espesor que tiene 50 por ciento o más con chroma de 3 o más.

**Aeric Acraquox**

EAAC. Otros Acraquox.

**Typic Acraquox**

#### Eutraquox

#### Clave para Subgrupos

EACA. Eutraquox que tienen un epipedón hístico.

**Histic Eutraquox**

EACB. Otros Eutraquox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthic Eutraquox**

EACC. Otros Eutraquox que tienen, directamente abajo de un epipedón, un horizonte de 10 cm o más de espesor que tiene 50 por ciento o más con chroma de 3 o más.

**Aeric Eutraquox**

EACD. Otros Eutraquox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Eutraquox**

EACE. Otros Eutraquox.

#### **Typic Eutraquox**

### **Haplaquox**

#### **Clave para Subgrupos**

EADA. Haplaquox que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Haplaquox**

EADB. Otros Haplaquox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Haplaquox**

EADC. Otros Haplaquox que tienen, directamente abajo de un epipedón, un horizonte de 10 cm o más de espesor que tiene 50 por ciento o más con chroma de 3 o más.

#### **Aeric Haplaquox**

EADD. Otros Haplaquox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Haplaquox**

EADE. Otros Haplaquox.

#### **Typic Haplaquox**

### **Plinthaquox**

#### **Clave para Subgrupos**

EABA. Plinthaquox que tienen, directamente abajo de un epipedón, un horizonte de 10 cm o más de espesor que tiene 50 por ciento o más con chroma de 3 o más.

#### **Aeric Plinthaquox**

EABB. Otros Plinthaquox.

#### **Typic Plinthaquox**

### **Perox**

#### **Clave para Grandes Grupos**

EDA. Perox que tienen un horizonte sómbrico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Sombriperox, pág. 240**

EDB. Otros Perox que tienen, en uno o más subhorizontes del horizonte óxico o kándico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, una CICE aparente de menos de

1.50 cmol(+)/kg de arcilla y un valor de pH (en KCl, 1 N) de 5.0 o más.

#### **Acroperox, pág. 236**

EDC. Otros Perox que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Eutroperox, pág. 237**

EDD. Otros Perox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Kandiperox, pág. 239**

EDE. Otros Perox.

#### **Haploperox, pág. 238**

### **Acroperox**

#### **Clave para Subgrupos**

EDBA. Acroperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Acroperox**

EDBB. Otros Acroperox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Acroperox**

EDBC. Otros Acroperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Acroperox**

EDBD. Otros Acroperox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Acroperox**

EDBE. Otros Acroperox que tienen una delta pH (pH en KCl menos pH en agua 1:1) de 0 o carga neta positiva en una capa de 18 cm o más de espesor dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Anionic Acroperox**

EDBF. Otros Acroperox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Acroperox**

EDBG. Otros Acroperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Acroperox**

EDBH. Otros Acroperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Acroperox**

EDBI. Otros Acroperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Acroperox**

EDBJ. Otros Acroperox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Acroperox**

EDBK. Otros Acroperox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Acroperox**

EDBL. Otros Acroperox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Acroperox**

EDBM. Otros Acroperox.

#### **Typic Acroperox**

## **Eutroperox**

### **Clave para Subgrupos**

EDCA. Eutroperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Eutroperox**

EDCB. Otros Eutroperox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Eutroperox**

EDCC. Otros Eutroperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Eutroperox**

EDCD. Otros Eutroperox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Eutroperox**

EDCE. Otros Eutroperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Eutroperox**

EDCF. Otros Eutroperox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Eutroperox**

EDCG. Otros Eutroperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Eutroperox**

EDCH. Otros Eutroperox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Kandiudalfic Eutroperox**

EDCI. Otros Eutroperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. Un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Inceptic Eutroperox**

EDCJ. Otros Eutroperox que tienen un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Eutroperox**

EDCK. Otros Eutroperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Eutroperox**

EDCL. Otros Eutroperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Eutroperox**

EDCM. Otros Eutroperox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Eutroperox**

EDCN. Otros Eutroperox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Eutroperox**

EDCO. Otros Eutroperox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Eutroperox**

EDCP. Otros Eutroperox.

#### **Typic Eutroperox**

## **Haploperox**

### **Clave para Subgrupos**

EDEA. Haploperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Haploperox**

EDEB. Otros Haploperox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Haploperox**

EDEC. Otros Haploperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Haploperox**

EDED. Otros Haploperox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haploperox**

EDEE. Otros Haploperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Haploperox**

EDEF. Otros Haploperox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Haploperox**

EDEG. Otros Haploperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haploperox**

EDEH. Otros Haploperox que tienen, en uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los

75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Haploperox

EDEI. Otros Haploperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### Humic Rhodic Haploperox

EDEJ. Otros Haploperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### Humic Xanthic Haploperox

EDEK. Otros Haploperox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### Humic Haploperox

EDEL. Otros Haploperox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### Rhodic Haploperox

EDEM. Otros Haploperox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### Xanthic Haploperox

EDEN. Otros Haploperox.

#### Typic Haploperox

### Kandiperox

#### Clave para Subgrupos

EDDA. Kandiperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Petroferric Kandiperox

EDDB. Otros Kandiperox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petroferric Kandiperox

EDDC. Otros Kandiperox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Lithic Kandiperox

EDDD. Otros Kandiperox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Kandiperox

EDDE. Otros Kandiperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Plinthaquic Kandiperox

EDDF. Otros Kandiperox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kandiperox

EDDG. Otros Kandiperox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Kandiperox

EDDH. Otros Kandiperox que tienen, en uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa, y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Kandiperox

EDDI. Otros Kandiperox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Kandiperóx**

EDDJ. Otros Kandiperóx que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Kandiperóx**

EDDK. Otros Kandiperóx que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Kandiperóx**

EDDL. Otros Kandiperóx que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Kandiperóx**

EDDM. Otros Kandiperóx que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Kandiperóx**

EDDN. Otros Kandiperóx.

#### **Typic Kandiperóx**

### **Sombriperóx**

#### **Clave para Subgrupos**

EDAA. Sombriperóx que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroférico Sombriperóx**

EDAB. Otros Sombriperóx que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lítico Sombriperóx**

EDAC. Otros Sombriperóx que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Sombriperóx**

EDAD. Otros Sombriperóx.

#### **Typic Sombriperóx**

### **Torrox**

#### **Clave para Grandes Grupos**

EBA. Torrox que tienen, en uno o más subhorizontes del horizonte óxico o kándico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, una CICE aparente de menos de 1.50 cmol(+)/kg de arcilla y un valor de pH (en KCl, 1 N) de 5.0 o más.

#### **Acrotorrox**, pág. 240

EBB. Otros Torrox que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Eutrotorrox**, pág. 240

EBC. Otros Torrox.

#### **Haplotorrox**, pág. 241

#### **Acrotorrox**

#### **Clave para Subgrupos**

EBAA. Acrotorrox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroférico Acrotorrox**

EBAB. Otros Acrotorrox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lítico Acrotorrox**

EBAC. Otros Acrotorrox.

#### **Typic Acrotorrox**

#### **Eutrotorrox**

#### **Clave para Subgrupos**

EBBA. Eutrotorrox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroférico Eutrotorrox**

EBBB. Otros Eutrotorrox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lítico Eutrotorrox**

EBBC. Otros Eutrotorrox.

#### **Typic Eutrotorrox**

## Haplotorrox

### Clave para Subgrupos

EBCA. Haplotorrox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petroferric Haplotorrox

EBCB. Otros Haplotorrox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplotorrox

EBCC. Otros Haplotorrox.

#### Typic Haplotorrox

## Udox

### Clave para Grandes Grupos

EEA. Udox que tienen un horizonte sómblico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Sombriudox, pág. 245

EEB. Otros Udox que tienen, en uno o más subhorizontes del horizonte óxico o kándico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, una CICE aparente de menos de 1.50 cmol(+)/kg de arcilla y un valor de pH (en KCl, 1 N) de 5.0 o más.

#### Acrudox, pág. 241

EEC. Otros Udox que tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Eutrudox, pág. 242

EED. Otros Udox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Kandiudox, pág. 244

EEE. Otros Udox.

#### Hapludox, pág. 243

## Acrudox

### Clave para Subgrupos

EEBA. Acrudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Petroferric Acrudox

EEBB. Otros Acrudox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petroferric Acrudox

EEBC. Otros Acrudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Lithic Acrudox

EEBD. Otros Acrudox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Acrudox

EEBE. Otros Acrudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Una delta pH (pH en KCl menos pH en agua 1:1) de 0 o carga neta positiva en una capa de 18 cm o más de espesor; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Anionic Aquic Acrudox

EEBF. Otros Acrudox que tienen una delta pH (pH en KCl menos pH en agua 1:1) de 0 o carga neta positiva en una capa de 18 cm o más de espesor dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Anionic Acrudox

EEBG. Otros Acrudox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Acrudox

EEBH. Otros Acrudox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Acrudox

EEBI. Otros Acrudox que tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Eutric Acrudox

EEBJ. Otros Acrudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y

2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

- a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
- b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Acrudox**

EEBK. Otros Acrudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Acrudox**

EEBL. Otros Acrudox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Acrudox**

EEBM. Otros Acrudox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Acrudox**

EEBN. Otros Acrudox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Acrudox**

EEBO. Otros Acrudox.

#### **Typic Acrudox**

### **Eutrudox**

#### **Clave para Subgrupos**

EECA. Eutrudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Eutrudox**

EECB. Otros Eutrudox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Eutrudox**

EECC. Otros Eutrudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Eutrudox**

EECD. Otros Eutrudox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Eutrudox**

EECE. Otros Eutrudox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Eutrudox**

EECF. Otros Eutrudox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Eutrudox**

EECG. Otros Eutrudox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Eutrudox**

EECH. Otros Eutrudox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Kandiudalfic Eutrudox**

EECI. Otros Eutrudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. Un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Inceptic Eutrudox**

EECJ. Otros Eutrudox que tienen un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Eutrudox**

EECK. Otros Eutrudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y

2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

- a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
- b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Eutrudox**

EECL. Otros Eutrudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Eutrudox**

EECM. Otros Eutrudox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Eutrudox**

EECN. Otros Eutrudox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Eutrudox**

EECO. Otros Eutrudox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Eutrudox**

EECP. Otros Eutrudox.

#### **Typic Eutrudox**

### **Hapludox**

#### **Clave para Subgrupos**

EEEE. Hapludox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Hapludox**

EEEB. Otros Hapludox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Hapludox**

EEED. Otros Hapludox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Hapludox**

EEEG. Otros Hapludox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen, en uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

- a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
- b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Hapludox**

EEEK. Otros Hapludox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Hapludox**

EEEL. Otros Hapludox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Hapludox**

EEEM. Otros Hapludox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Hapludox**

EEEN. Otros Hapludox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Hapludox**

EEEE. Otros Hapludox.

#### **Typic Hapludox**

### **Kandiudox**

#### **Clave para Subgrupos**

EEEDA. Kandiudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Kandiudox**

EEEDB. Otros Kandiudox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Kandiudox**

EEEDC. Otros Kandiudox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y

2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Kandiudox**

EEEDD. Otros Kandiudox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Kandiudox**

EEEDE. Otros Kandiudox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Kandiudox**

EEEDF. Otros Kandiudox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kandiudox**

EEEDG. Otros Kandiudox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kandiudox**

EEEDH. Otros Kandiudox que tienen, en uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina que tiene una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Kandiudox**

EEEDI. Otros Kandiudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Kandiudox**

EEEDJ. Otros Kandiudox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y

2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### Humic Xanthic Kandiodox

EEDK. Otros Kandiodox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### Humic Kandiodox

EEDL. Otros Kandiodox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### Rhodic Kandiodox

EEDM. Otros Kandiodox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### Xanthic Kandiodox

EEDN. Otros Kandiodox.

#### Typic Kandiodox

### Sombriudox

#### Clave para Subgrupos

EEAA. Sombriudox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petroferric Sombriudox

EEAB. Otros Sombriudox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Sombriudox

EEAC. Otros Sombriudox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### Humic Sombriudox

EEAD. Otros Sombriudox.

#### Typic Sombriudox

### Ustox

#### Clave para Grandes Grupos

ECA. Ustox que tienen un horizonte sómbrico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Sombriustox, pág. 249

ECB. Otros Ustox que tienen, en uno o más subhorizontes del horizonte óxico o kándico dentro de los 150 cm de la

superficie del suelo mineral, una CICE aparente de menos de 1.50 cmol(+)/kg de arcilla y un valor de pH (en KCl, 1 N) de 5.0 o más.

#### Acrustox, pág. 245

ECC. Otros Ustox que tienen una saturación de bases (por NH<sub>4</sub>OAc) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Eustrustox, pág. 246

ECD. Otros Ustox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Kandiustox, pág. 248

ECE. Otros Ustox.

#### Haplustox, pág. 247

### Acrustox

#### Clave para Subgrupos

ECBA. Acrustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Petroferric Acrustox

ECBB. Otros Acrustox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Petroferric Acrustox

ECBC. Otros Acrustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Lithic Acrustox

ECBD. Otros Acrustox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Acrustox

ECBE. Otros Acrustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un delta pH (pH en KCl menos pH en agua 1:1) de 0 o carga neta positiva en una capa de 18 cm o más de espesor; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Anionic Aquic Acrustox

ECBF. Otros Acrustox que tienen un delta pH (pH en KCl menos pH en agua 1:1) de 0 o carga neta positiva en una capa de 18 cm o más de espesor dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Anionic Acrustox**

ECBG. Otros Acrustox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Acrustox**

ECBH. Otros Acrustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Acrustox**

ECBI. Otros Acrustox que tienen una saturación de bases (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$ ) de 35 por ciento o más en todos los horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Eutric Acrustox**

ECBJ. Otros Acrustox que tienen *ambas*:

1. 16  $\text{kg/m}^2$  o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Acrustox**

ECBK. Otros Acrustox que tienen *ambas*:

1. 16  $\text{kg/m}^2$  o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Acrustox**

ECBL. Otros Acrustox que tienen 16  $\text{kg/m}^2$  o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Acrustox**

ECBM. Otros Acrustox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y

2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Acrustox**

ECBN. Otros Acrustox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Acrustox**

ECBO. Otros Acrustox.

#### **Typic Acrustox**

### **Eustrustox**

#### **Clave para Subgrupos**

ECCA. Eustrustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Eustrustox**

ECCB. Otros Eustrustox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Eustrustox**

ECCC. Otros Eustrustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Eustrustox**

ECCD. Otros Eustrustox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Eustrustox**

ECCE. Otros Eustrustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Eustrustox**

ECCF. Otros Eustrustox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Eustrustox**

ECCG. Otros Eustrustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral,

empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Eustrustox**

ECCH. Otros Eustrustox que tienen un horizonte kándico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Kandiudalfic Eustrustox**

ECCI. Otros Eustrustox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. Un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Inceptic Eustrustox**

ECCJ. Otros Eustrustox que tienen un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Eustrustox**

ECCK. Otros Eustrustox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Eustrustox**

ECCL. Otros Eustrustox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Eustrustox**

ECCM. Otros Eustrustox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Eustrustox**

ECCN. Otros Eustrustox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Eustrustox**

ECCO. Otros Eustrustox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Eustrustox**

ECCP. Otros Eustrustox.

#### **Typic Eustrustox**

### **Haplustox**

#### **Clave para Subgrupos**

ECEA. Haplustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Haplustox**

ECEB. Otros Haplustox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Haplustox**

ECEC. Otros Haplustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Haplustox**

ECED. Otros Haplustox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplustox**

ECEE. Otros Haplustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Haplustox**

ECEF. Otros Haplustox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Haplustox**

ECEG. Otros Haplustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

1. El límite inferior del horizonte óxico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aqueptic Haplustox**

ECEH. Otros Haplustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplustox**

ECEI. Otros Haplustox que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplustox**

ECEJ. Otros Haplustox que tienen un horizonte óxico que tiene su límite inferior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Inceptic Haplustox**

ECEK. Otros Haplustox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Haplustox**

ECEL. Otros Haplustox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Haplustox**

ECEM. Otros Haplustox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Haplustox**

ECEN. Otros Haplustox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del

suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Haplustox**

ECEO. Otros Haplustox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Haplustox**

ECEP. Otros Haplustox.

#### **Typic Haplustox**

### **Kandiustox**

#### **Clave para Subgrupos**

ECDA. Kandiustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto petroférico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Petroferric Kandiustox**

ECDB. Otros Kandiustox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Kandiustox**

ECDC. Otros Kandiustox que tienen dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. Un contacto lítico; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Lithic Kandiustox**

ECDD. Otros Kandiustox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Kandiustox**

ECDE. Otros Kandiustox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral *ambas*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita; y
2. Empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Kandiustox**

ECDF. Otros Kandiuostox que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kandiuostox**

ECDG. Otros Kandiuostox que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kandiuostox**

ECDH. Otros Kandiuostox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:
  - a. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Humic Rhodic Kandiuostox**

ECDI. Otros Kandiuostox que tienen *ambas*:

1. 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm; y
2. 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Humic Xanthic Kandiuostox**

ECDJ. Otros Kandiuostox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Kandiuostox**

ECDK. Otros Kandiuostox que tienen, En todos los horizontes a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral, más de 50 por ciento tiene los siguientes colores:

1. Hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos.

#### **Rhodic Kandiuostox**

ECDL. Otros Kandiuostox que tienen 50 por ciento o más con un hue de 7.5YR o más amarillento y un color del value, en húmedo, de 6 o más a una profundidad entre 25 y 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral.

#### **Xanthic Kandiuostox**

ECDM. Otros Kandiuostox.

#### **Typic Kandiuostox**

### **Sombriustox**

#### **Clave para Subgrupos**

ECAA. Sombriustox que tienen un contacto petroférico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Petroferric Sombriustox**

ECAB. Otros Sombriustox que tienen un contacto lítico dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Sombriustox**

ECAC. Otros Sombriustox que tienen 16 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

#### **Humic Sombriustox**

ECAD. Otros Sombriustox.

#### **Typic Sombriustox**



## CAPÍTULO 14

### *Spodosols*

#### Clave para Subórdenes

CA. Spodosols que tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral y tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Un epipedón místico; *o*
2. Dentro de los 50 cm de la superficie del suelo, rasgos redoximórficos en un horizonte álbico o espódico.

**Aquods**, pág. 251

CB. Otros Spodosols que tienen, en años normales, una temperatura del suelo media anual de 0 °C o más fría y una temperatura del suelo media de verano que:

1. Es de 8 °C o más fría si no existe un horizonte O; *o*
2. Es de 5 °C o más fría si existe un horizonte O.

**Gelods**, pág. 255

CC. Otros Spodosols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryods**, pág. 253

CD. Otros Spodosols que tienen 6.0 por ciento o más de carbono orgánico en una capa de 10 cm o más de espesor dentro del horizonte espódico.

**Humods**, pág. 256

CE. Otros Spodosols.

**Orthods**, pág. 256

#### Aquods

#### Clave para Grandes Grupos

CAA. Aquods que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryaquods**, pág. 252

CAB. Otros Aquods que tienen menos de 0.10 por ciento de hierro (por oxalato de amonio) en 75 por ciento o más del horizonte espódico.

**Alaquods**, pág. 251

CAC. Otros Aquods que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiaquods**, pág. 253

CAD. Otros Aquods que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en 50 por ciento o más de cada pedón.

**Placaquods**, pág. 253

CAE. Otros Aquods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa de suelo cementada que tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duraquods**, pág. 252

CAF. Otros Aquods que tienen episaturación.

**Epiaquods**, pág. 253

CAG. Otros Aquods.

**Endoaquods**, pág. 252

#### Alaquods

#### Clave para Subgrupos

CABA. Alaquods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Alaquods**

CABB. Otros Alaquods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa de suelo cementada que no se desmorona en agua después de secada al aire y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duric Alaquods**

CABC. Otros Alaquods que tienen un epipedón hístico.

**Histic Alaquods**

CABD. Otros Alaquods que tienen *ambas*:

1. Dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte; *y*

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm.

**Alfic Arenic Alaquods**

CABE. Otros Alaquods que tienen *ambas*:

1. Un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm.

**Arenic Ultic Alaquods**

CABF. Otros Alaquods que tienen *ambas*:

1. Un epipedón úmbrico; y

2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm.

**Arenic Umbric Alaquods**

CABG. Otros Alaquods que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm.

**Arenic Alaquods**

CABH. Otros Alaquods que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 125 cm o más.

**Grossarenic Alaquods**

CABI. Otros Alaquods que tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

**Alfic Alaquods**

CABJ. Otros Alaquods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

**Ultic Alaquods**

CABK. Otros Alaquods que tienen un epipedón ócrico.

**Aeric Alaquods**

CABL. Otros Alaquods.

**Typic Alaquods**

**Cryaquods**

**Clave para Subgrupos**

CAAA. Cryaquods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Cryaquods**

CAAB. Otros Cryaquods que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en 50 por ciento o más de cada pedón.

**Placic Cryaquods**

CAAC. Otros Cryaquods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa cementada de suelo que no se desmorona en agua después de secada al aire y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duric Cryaquods**

CAAD. Otros Cryaquods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm desde la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

**Andic Cryaquods**

CAAE. Otros Cryaquods que tienen un horizonte espódico menor a 10 cm de espesor en 50 por ciento o más de cada pedón.

**Entic Cryaquods**

CAAF. Otros Cryaquods.

**Typic Cryaquods**

**Duraquods**

**Clave para Subgrupos**

CAEA. Duraquods que tienen un epipedón hístico.

**Histic Duraquods**

CAEB. Otros Duraquods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

**Andic Duraquods**

CAEC. Otros Duraquods.

**Typic Duraquods**

**Endoquods**

**Clave para Subgrupos**

CAGA. Endoquods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Endoquods**

CAGB. Otros Endoquods que tienen un epipedón hístico.

**Histic Endoquods**

CAGC. Otros Endoquods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25

cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Endoaquods**

CAGD. Otros Endoaquods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Argic Endoaquods**

CAGE. Otros Endoaquods que tienen un epipedón úmbrico.

#### **Umbric Endoaquods**

CAGF. Otros Endoaquods.

#### **Typic Endoaquods**

### **Epiaquods**

#### **Clave para Subgrupos**

CAFA. Epiaquods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Epiaquods**

CAFB. Otros Epiaquods que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Epiaquods**

CAFC. Otros Epiaquods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Epiaquods**

CAFD. Otros Epiaquods que tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

#### **Alfic Epiaquods**

CAFE. Otros Epiaquods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Ultic Epiaquods**

CAFF. Otros Epiaquods que tienen un epipedón úmbrico.

#### **Umbric Epiaquods**

CAFG. Otros Epiaquods.

#### **Typic Epiaquods**

### **Fragiaquods**

#### **Clave para Subgrupos**

CACA. Fragiaquods que tienen un epipedón hístico.

#### **Histic Fragiaquods**

CACB. Otros Fragiaquods que tienen un horizonte superficial de 30 cm o más de espesor que cumple con todos los requisitos para un epipedón plaggen excepto el espesor.

#### **Plagganthreptic Fragiaquods**

CACC. Otros Fragiaquods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Argic Fragiaquods**

CACD. Otros Fragiaquods.

#### **Typic Fragiaquods**

### **Placaquods**

#### **Clave para Subgrupos**

CADA. Placaquods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Placaquods**

CADB. Otros Placaquods.

#### **Typic Placaquods**

### **Cryods**

#### **Clave para Grandes Grupos**

CCA. Cryods que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en 50 por ciento o más de cada pedón.

#### **Placocryods**, pág. 255

CCB. Otros Cryods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa de suelo cementada que no se desmorona en agua después de secada al aire y tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Duricryods**, pág. 253

CCC. Otros Cryods que tienen 6.0 por ciento o más de carbono orgánico a través de una capa de 10 cm o más de espesor dentro del horizonte espódico.

#### **Humicryods**, pág. 254

CCD. Otros Cryods.

#### **Haplocryods**, pág. 254

### **Duricryods**

#### **Clave para Subgrupos**

CCBA. Duricryods que tienen *ambas*:

1. Rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también

condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. Propiedades ándicas a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Aquandic Duricryods**

CCBB. Otros Duricryods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Duricryods**

CCBC. Otros Duricryods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Duricryods**

CCBD. Otros Duricryods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Duricryods**

CCBE. Otros Duricryods que tienen 6.0 por ciento o más de carbono orgánico a través de una capa de 10 cm o más de espesor dentro del horizonte espódico.

#### **Humic Duricryods**

CCBF. Otros Duricryods.

#### **Typic Duricryods**

### **Haplocryods**

#### **Clave para Subgrupos**

CCDA. Haplocryods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplocryods**

CCDB. Otros Haplocryods que tienen *ambas*:

1. Rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una

capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Aquandic Haplocryods**

CCDC. Otros Haplocryods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Haplocryods**

CCDD. Otros Haplocryods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplocryods**

CCDE. Otros Haplocryods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplocryods**

CCDF. Otros Haplocryods que tienen 1.1 por ciento o menos de carbono orgánico en los 10 cm superiores del horizonte espódico.

#### **Entic Haplocryods**

CCDG. Otros Haplocryods.

#### **Typic Haplocryods**

### **Humicryods**

#### **Clave para Subgrupos**

CCCA. Humicryods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Humicryods**

CCCB. Otros Humicryods que tienen *ambas*:

1. Rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. Propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Aquandic Humicryods**

CCCC. Otros Humicryods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### Andic Humicryods

CCCD. Otros Humicryods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Humicryods

CCCE. Otros Humicryods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Humicryods

CCCF. Otros Humicryods.

#### Typic Humicryods

### Placocryods

#### Clave para Subgrupos

CCAA. Placocryods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### Andic Placocryods

CCAB. Otros Placocryods que tienen 6.0 por ciento o más de carbono orgánico a través de una capa de 10 cm o más de espesor dentro del horizonte espódico.

#### Humic Placocryods

CCAC. Otros Placocryods.

#### Typic Placocryods

### Gelods

#### Clave para Grandes Grupos

CBA. Gelods que tienen 6.0 por ciento o más de carbono orgánico a través de una capa de 10 cm o más de espesor dentro del horizonte espódico.

#### Humigelods, pág. 255

CBB. Otros Gelods.

#### Haplogelods, pág. 255

### Haplogelods

#### Clave para Subgrupos

CBBA. Haplogelods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplogelods

CBBB. Otros Haplogelods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### Andic Haplogelods

CBBC. Otros Haplogelods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Haplogelods

CBBD. Otros Haplogelods.

#### Typic Haplogelods

### Humigelods

#### Clave para Subgrupos

CBAA. Humigelods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Humigelods

CBAB. Otros Humigelods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### Andic Humigelods

CBAC. Otros Humigelods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Humigelods

CBAD. Otros Humigelods.

#### Typic Humigelods

## Humods

### Clave para Grandes Grupos

CDA. Humods que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en 50 por ciento o más de cada pedón.

**Placohumods**, pág. 256

CDB. Otros Humods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa de suelo cementada que no se desmorona en agua después de secada al aire y tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duriumods**, pág. 256

CDC. Otros Humods que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiumods**, pág. 256

CDD. Otros Humods.

**Haplohumods**, pág. 256

### Duriumods

#### Clave para Subgrupos

CDBA. Duriumods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

**Andic Duriumods**

CDBB. Otros Duriumods.

**Typic Duriumods**

### Fragiumods

#### Clave para Subgrupos

CDCA. Todos los Fragiumods (provisionalmente).

**Typic Fragiumods**

### Haplohumods

#### Clave para Subgrupos

CDDA. Haplohumods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Haplohumods**

CDDB. Otros Haplohumods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo

mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

**Andic Haplohumods**

CDDC. Otros Haplohumods que tienen un horizonte superficial de 30 cm o más de espesor que cumple con todos los requisitos para un epipedón plaggen excepto el espesor.

**Plagganthreptic Haplohumods**

CDDD. Otros Haplohumods.

**Typic Haplohumods**

### Placohumods

#### Clave para Subgrupos

CDAA. Placohumods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

**Andic Placohumods**

CDAB. Otros Placohumods.

**Typic Placohumods**

### Orthods

#### Clave para Grandes Grupos

CEA. Orthods que tienen un horizonte plácico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en 50 por ciento o más de cada pedón.

**Placorthods**, pág. 259

CEB. Otros Orthods que tienen, en 90 por ciento o más de cada pedón, una capa de suelo cementada que no se desmorona en agua después de secada al aire y tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Durorthods**, pág. 257

CEC. Otros Orthods que tienen un fragipán con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiorthods**, pág. 257

CED. Otros Orthods que tienen menos de 0.10 por ciento de hierro (por oxalato de amonio) en 75 por ciento o más del horizonte espódico.

**Alorthods**, pág. 257

CEE. Otros Orthods.

**Haplorthods**, pág. 258

## Alorthods

### Clave para Subgrupos

CEDA. Alorthods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Alorthods

CEDB. Otros Alorthods que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética–arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm; *y*
2. Un horizonte argílico o kándico abajo del horizonte espódico.

### Arenic Ultic Alorthods

CEDC. Otros Alorthods que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética–arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 75 a 125 cm.

### Arenic Alorthods

CEDD. Otros Alorthods que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética–arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 125 cm o más; *y*
2. En el 10 por ciento o más de cada pedón, menos de 3.0 por ciento de carbono orgánico en los 2 cm superiores del horizonte espódico.

### Entic Grossarenic Alorthods

CEDE. Otros Alorthods que tienen, en el 10 por ciento o más de cada pedón, menos de 3.0 por ciento de carbono orgánico en los 2 cm superiores del horizonte espódico.

### Entic Alorthods

CEDF. Otros Alorthods que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética–arenosa a través de una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral a la parte superior del horizonte espódico a una profundidad de 125 cm o más.

### Grossarenic Alorthods

CEDG. Otros Alorthods que tienen un horizonte superficial de 30 cm o más de espesor que cumple con todos los requisitos para un epipedón plaggen excepto el espesor.

### Plagganthreptic Alorthods

CEDH. Otros Alorthods que tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

### Alfic Alorthods

CEDI. Otros Alorthods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

### Ultic Alorthods

CEDJ. Otros Alorthods.

### Typic Alorthods

## Durorthods

### Clave para Subgrupos

CEBA. Durorthods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

### Andic Durorthods

CEBB. Otros Durorthods.

### Typic Durorthods

## Fragiorthods

### Clave para Subgrupos

CECA. Fragiorthods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

### Aquic Fragiorthods

CECB. Otros Fragiorthods que:

1. Están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos; *y*

2. Tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

### Alfic Oxyaquic Fragiorthods

CECC. Otros Fragiorthods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

### Oxyaquic Fragiorthods

CECD. Otros Fragiorthods que tienen un horizonte superficial de 30 cm o más de espesor que cumple con todos los requisitos para un epipedón plaggen excepto el espesor.

#### Plagganthreptic Fragiorthods

CECE. Otros Fragiorthods que tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

#### Alfic Fragiorthods

CECF. Otros Fragiorthods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Ultic Fragiorthods

CECG. Otros Fragiorthods que tienen un horizonte espódico que tiene *una* de las siguientes:

1. Una textura de arena muy fina, arena francosa muy fina, o más fina; *y*
  - a. Un espesor de 10 cm o menos; *y*
  - b. Un promedio ponderado de menos de 1.2 por ciento de carbono orgánico; *y*
  - c. Dentro de los 7.5 cm superiores *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas); *o*
2. Una textura de arena francosa fina, arena fina o más gruesa y *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas) en los 2.5 cm superiores.

#### Entic Fragiorthods

CECH. Otros Fragiorthods.

#### Typic Fragiorthods

### Haplorthods

#### Clave para Subgrupos

CEEA. Haplorthods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y ya sea*:

1. Un horizonte espódico con una textura de arena muy fina, arena francosa muy fina, o más fina; *y*
  - a. Un espesor de 10 cm o menos; *y*
  - b. Un promedio ponderado de menos de 1.2 por ciento de carbono orgánico; *y*
  - c. Dentro de los 7.5 cm superiores *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas); *o*
2. Un horizonte espódico con una textura de arena francosa fina, arena fina o más gruesa y *uno u otro o ambos* colores, en

húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas) en los 2.5 cm superiores.

#### Entic Lithic Haplorthods

CEEB. Otros Haplorthods que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplorthods

CEEC. Otros Haplorthods que tienen *tanto*:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su limite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. Rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Fragiaquic Haplorthods

CEED. Otros Haplorthods que tienen *tanto*:

1. Rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

#### Aqualfic Haplorthods

CEEE. Otros Haplorthods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*

1. Un horizonte espódico con una textura de arena muy fina, arena francosa muy fina, o más fina; *y*
  - a. Un espesor de 10 cm o menos; *y*
  - b. Un promedio ponderado de menos de 1.2 por ciento de carbono orgánico; *y*
  - c. Dentro de los 7.5 cm superiores *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas); *o*
2. Un horizonte espódico con una textura de arena francosa fina, arena fina o más gruesa y *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas) en los 2.5 cm superiores.

#### Aquentic Haplorthods

CEEF. Otros Haplorthods que tienen rasgos redoximórficos en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Haplorthods**

CEEG. Otros Haplorthods que tienen:

1. Dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte; y
2. Están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

#### **Alfic Oxyaquic Haplorthods**

CEEH. Otros Haplorthods que tienen:

1. Dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico; y
2. Están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Ultic Haplorthods**

CEEI. Otros Haplorthods que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Haplorthods**

CEEJ. Otros Haplorthods que tienen *ambas*:

1. Saturación con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos; y
2. Abajo de un horizonte espódico, pero no debajo de un horizonte argílico, lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Oxyaquic Haplorthods**

CEEK. Otros Haplorthods que, abajo de un horizonte espódico, pero no debajo de un horizonte argílico, tienen lamelas (dos o más) dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lamellic Haplorthods**

CEEL. Otros Haplorthods que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Haplorthods**

CEEM. Otros Haplorthods que tienen propiedades ándicas de suelo a través de horizontes que tienen un espesor total de 25 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o de la parte superior de una capa orgánica con propiedades ándicas de suelo, cualquiera que sea más somera.

#### **Andic Haplorthods**

CEEN. Otros Haplorthods que tienen, dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral, un horizonte argílico o kándico que tiene una saturación de bases de 35 por ciento o más (por suma de cationes) en alguna parte.

#### **Alfic Haplorthods**

CEEO. Otros Haplorthods que tienen un horizonte argílico o kándico dentro de los 200 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Ultic Haplorthods**

CEEP. Otros Haplorthods que tienen un horizonte espódico que tiene *una* de las siguientes:

1. Una textura de arena muy fina, arena francosa muy fina, o más fina; y
  - a. Un espesor de 10 cm o menos; y
  - b. Un promedio ponderado de menos de 1.2 por ciento de carbono orgánico; y
  - c. Dentro de los 7.5 cm superiores *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas); *o*
2. Una textura de arena francosa fina, arena fina o más gruesa y *uno u otro o ambos* colores, en húmedo, del value o chroma de 4 o más (muestras molidas y homogeneizadas) en los 2.5 cm superiores.

#### **Entic Haplorthods**

CEEQ. Otros Haplorthods.

#### **Typic Haplorthods**

#### **Placorthods**

#### **Clave para Subgrupos**

CEEA. Todos los Placorthods (provisionalmente)

#### **Typic Placorthods**



## CAPÍTULO 15

### Ultisols

#### Clave para Subórdenes

HA. Ultisols que tienen condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral y *una o ambas* de las siguientes:

1. Rasgos redoximórficos en todas las capas entre la parte inferior de un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y una profundidad de 40 cm, y *una* de las siguientes dentro de los 12.5 cm superiores de un horizonte argílico o kándico:

- Concentraciones redox y 50 por ciento o más de empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos sobre las caras de los agregados o en la matriz; *o*
- 50 por ciento o más de empobrecimientos redox con un chroma de 1 o menos sobre las caras de los agregados o en la matriz; *o*
- Concentraciones redox distintivas o prominentes y 50 por ciento o más con un hue de 2.5Y o 5Y en la matriz, y también un régimen de temperatura del suelo térmico, isotérmico o más caliente; *o*

2. Dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, suficiente hierro ferroso activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

**Aquults**, pág. 261

HB. Otros Ultisols que tienen *una o ambas* de las siguientes:

- 0.9 por ciento o más de carbono orgánico en los 15 cm superiores del horizonte argílico o kándico; *o*
- 12 kg/m<sup>2</sup> o más de carbono orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm.

**Humults**, pág. 265

HC. Otros Ultisols que tienen un régimen de humedad údico.

**Udults**, pág. 268

HD. Otros Ultisols que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustults**, pág. 276

HE. Otros Ultisols.

**Xerults**, pág. 279

#### Aquults

#### Clave para Grandes Grupos

HAA. Aquults que tienen uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en los cuales la plintita forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

**Plinthaquults**, pág. 265

HAB. Otros Aquults que tienen un fragipán con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Fragiaquults**, pág. 263

HAC. Otros Aquults que tienen un cambio textural abrupto entre el epipedón ócrico u horizonte álbico y el horizonte argílico o kándico y tienen una conductividad hidráulica a saturación de 0.4 cm/h o menor (moderadamente baja o más baja) en el horizonte argílico o kándico.

**Albaquults**, pág. 262

HAD. Otros Aquults que:

- No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
- Tienen un horizonte kándico; y
- Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
  - Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

**Kandiaquults**, pág. 263

HAE. Otros Aquults que tienen un horizonte kándico.

**Kanhaplaquults**, pág. 263

HAF. Otros Aquults que:

- No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:

- a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
- b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

**Paleaquults**, pág. 264

HAG. Otros Aquults que tienen un epipedón úmbrico o mólico.

**Umbraquults**, pág. 265

HAH. Otros Aquults que tienen episaturación.

**Epiaquults**, pág. 262

HAI. Otros Aquults.

**Endoquults**, pág. 262

## Albaquults

### Clave para Subgrupos

HACA. Albaquults que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Vertic Albaquults**

HACB. Otros Albaquults que tienen un horizonte kándico.

**Kandic Albaquults**

HACC. Otros Albaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

**Aeric Albaquults**

HACD. Otros Albaquults.

**Typic Albaquults**

## Endoquults

### Clave para Subgrupos

HAIA. Endoquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite

superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

**Arenic Endoquults**

HAIB. Otros Endoquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

**Grossarenic Endoquults**

HAIC. Otros Endoquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

**Aeric Endoquults**

HAID. Otros Endoquults.

**Typic Endoquults**

## Epiaquults

### Clave para Subgrupos

HAHA. Epiaquults que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

**Vertic Epiaquults**

HAHB. Otros Epiaquults que tienen:

1. Propiedades de frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

**Aeric Fragic Epiaquults**

HAHC. Otros Epiaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

**Arenic Epiaquults**

HAHD. Otros Epiaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Epiaquults

HAHE. Otros Epiaquults que tienen propiedades de frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### Fragic Epiaquults

HAHF. Otros Epiaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

#### Aeric Epiaquults

HAHG. Otros epiaquults.

#### Typic Epiaquults

### Fragiaquults

#### Clave para Subgrupos

HABA. Fragiaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo, y el fragipan.

#### Aeric Fragiaquults

HABB. Otros Fragiaquults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Fragiaquults

HABC. Otros Fragiaquults que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Umbric Fragiaquults

HABD. Otros Fragiaquults.

#### Typic Fragiaquults

### Kandiaquults

#### Clave para Subgrupos

HADA. Kandiaquults que tienen, una CICE aparente de 1.5 cmol(+)/kg de arcilla o menos (suma de bases extractables con NH<sub>4</sub>OAc 1 N pH 7, más Al extractable con KCl 1 N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Acraquoxic Kandiaquults

HADB. Otros Kandiaquults que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie

del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*

2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Arenic Plinthic Kandiaquults

HADC. Otros Kandiaquults que:

1. Tienen un epipedón mólico o úmbrico; *y*
2. Tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Umbric Kandiaquults

HADD. Otros Kandiaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Kandiaquults

HADE. Otros Kandiaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Kandiaquults

HADF. Otros Kandiaquults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kandiaquults

HADG. Otros Kandiaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

#### Aeric Kandiaquults

HADH. Otros Kandiaquults que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### Umbric Kandiaquults

HADI. Otros Kandiaquults.

#### Typic Kandiaquults

### Kanhaplaquults

#### Clave para Subgrupos

HAEA. Kanhaplaquults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, *una o más* de las siguientes:

1. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

2. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

3. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro, *y*

a. En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

b. [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Kanhaplaquults**

HAEB. Otros Kanhaplaquults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kanhaplaquults**

HAEC. Otros Kanhaplaquults que:

1. Tienen un epipedón mólico o úmbrico; *y*

2. Tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

#### **Aeric Umbric Kanhaplaquults**

HAED. Otros Kanhaplaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

#### **Aeric Kanhaplaquults**

HAEE. Otros Kanhaplaquults que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Umbric Kanhaplaquults**

HAEF. Otros Kanhaplaquults.

#### **Typic Kanhaplaquults**

### **Paleaquults**

#### **Clave para Subgrupos**

HAFa. Paleaquults que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*

2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a

un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Paleaquults**

HAFB. Otros Paleaquults que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*

2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Paleaquults**

HAFc. Otros Paleaquults que:

1. Tienen un epipedón mólico o úmbrico; *y*

2. Tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Umbric Paleaquults**

HAFD. Otros Paleaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Paleaquults**

HAFE. Otros Paleaquults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética – arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### **Grossarenic Paleaquults**

HAFf. Otros Paleaquults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Paleaquults**

HAFg. Otros Paleaquults que tienen 50 por ciento o más con chroma de 3 o más en uno o más horizontes entre el horizonte A o Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profundo y una profundidad de 75 cm.

#### **Aeric Paleaquults**

HAFH. Otros Paleaquults que tienen un epipedón mólico o úmbrico.

#### **Umbric Paleaquults**

HAFI. Otros Paleaquults.

#### **Typic Paleaquults**

## Plinthaquults

### Clave para Subgrupos

HAAA. Plinthaquults que tienen un horizonte kándico o una CIC (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1 N a pH 7) de menos de 24  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de arcilla en 50 por ciento o más (por volumen) del horizonte argílico si es menor de 100 cm de espesor o de sus 100 cm superiores.

#### Kandic Plinthaquults

HAAB. Otros Plinthaquults.

#### Typic Plinthaquults

## Umbracquults

### Clave para Subgrupos

HAGA. Umbracquults que tienen de 5 a 50 por ciento (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Umbracquults

HAGB. Otros Umbracquults.

#### Typic Umbracquults

## Humults

### Clave para Grandes Grupos

HBA. Humults que tienen un horizonte sómbrico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Sombrihumults, pág. 268

HBB. Otros Humults que tienen uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en los cuales la plintita forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

#### Plinthohumults, pág. 268

HBC. Otros Humults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Tienen un horizonte kándico; y
3. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; o
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### Kandihumults, pág. 266

HBD. Otros Humults que tienen un horizonte kándico.

#### Kanhaplohumults, pág. 267

HBE. Otros Humults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; o
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo y abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### Palehumults, pág. 267

HBF. Otros Humults.

#### Haplohumults, pág. 265

## Haplohumults

### Clave para Subgrupos

HBFA. Haplohumults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haplohumults

HBFB. Otros Haplohumults que tienen:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0  $\text{g}/\text{cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Aquandic Haplohumults

HBFC. Otros Haplohumults que tienen en uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Haplohumults

HBFD. Otros Haplohumults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0  $\text{g}/\text{cm}^3$  o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Andic Haplohumults**

HBFE. Otros Haplohumults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthic Haplohumults**

HBFF. Otros Haplohumults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

**Oxyaquic Haplohumults**

HBFG. Otros Haplohumults que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustic Haplohumults**

HBFH. Otros Haplohumults que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xeric Haplohumults**

HBFI. Otros Haplohumults.

**Typic Haplohumults**

**Kandihumults**

**Clave para Subgrupos**

HBCA. Kandihumults que satisfacen todas las siguientes:

1. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *y*
2. En uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, tienen concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
3. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

**Andic Ombroaquic Kandihumults**

HBCB. Otros Kandihumults que tienen:

1. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *y*
2. Un régimen de humedad ústico.

**Ustandic Kandihumults**

HBCC. Otros Kandihumults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Andic Kandihumults**

HBCD. Otros Kandihumults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Kandihumults**

HBCE. Otros Kandihumults que:

1. Tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:
  - a. 20 o más días consecutivos; *o*
  - b. 30 o más días acumulativos.

**Ombroaquic Kandihumults**

HBCF. Otros Kandihumults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthic Kandihumults**

HBCG. Otros Kandihumults que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustic Kandihumults**

HBCH. Otros Kandihumults que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xeric Kandihumults**

HBCL. Otros Kandihumults que tienen un epipedón antrópico.

**Anthropic Kandihumults**

HBCJ. Otros Kandihumults.

**Typic Kandihumults**

**Kanhaplohumults**

**Clave para Subgrupos**

HBDA. Kanhaplohumults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Kanhaplohumults**

HBDB. Otros Kanhaplohumults que tienen *ambos*:

1. Un régimen de humedad ústico; y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Ustandic Kanhaplohumults**

HBDC. Otros Kanhaplohumults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Andic Kanhaplohumults**

HBDD. Otros Kanhaplohumults que tienen, en uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Kanhaplohumults**

HBDE. Otros Kandihumults que:

1. Tienen en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

a. 20 o más días consecutivos; o

b. 30 o más días acumulativos.

**Ombroaquic Kanhaplohumults**

HBDF. Otros Kanhaplohumults que tienen un régimen de humedad ústico.

**Ustic Kanhaplohumults**

HBDG. Otros Kanhaplohumults que tienen un régimen de humedad xérico.

**Xeric Kanhaplohumults**

HBDH. Otros Kanhaplohumults que tienen un epipedón antrópico.

**Anthropic Kanhaplohumults**

HBDI. Otros Kanhaplohumults.

**Typic Kanhaplohumults**

**Palehumults**

**Clave para Subgrupos**

HBEA. Palehumults que tienen *ambos*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Aquandic Palehumults**

HBEB. Otros Palehumults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Andic Palehumults**

HBEC. Otros Palehumults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Palehumults**

HBED. Otros Palehumults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

**Plinthic Palehumults**

HBEE. Otros Palehumults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Palehumults

HBEF. Otros Palehumults que tienen un régimen de humedad ústico.

#### Ustic Palehumults

HBEG. Otros Palehumults que tienen un régimen de humedad xérico.

#### Xeric Palehumults

HBEH. Otros Palehumults.

#### Typic Palehumults

### Plinthohumults

#### Clave para Subgrupos

HBBA. Todos los Plinthohumults.

#### Typic Plinthohumults

### Sombrihumults

#### Clave para Subgrupos

HBAA. Todos los Sombrihumults.

#### Typic Sombrihumults

### Udults

#### Clave para Grandes Grupos

HCA. Udults que tienen uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en los cuales la plintita forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

#### Plinthudults, pág. 275

HCB. Otros Udults que tienen un fragipán con un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Fragiudults, pág. 268

HCC. Otros Udults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Tienen un horizonte kándico; *y*
3. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los

agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo *y* abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### Kandiudults, pág. 270

HCD. Otros Udults que tienen un horizonte kándico.

#### Kanhapludults, pág. 272

HCE. Otros Udults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de empobrecimientos arcillosos sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo *y* abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### Paleudults, pág. 273

HCF. Otros Udults que tienen *ambos*:

1. Un epipedón que tiene un color del value, en húmedo, de 3 o menos en todo su espesor; *y*
2. En todos los subhorizontes en los 100 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:
  - a. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
  - c. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### Rhodudults, pág. 275

HCG. Otros Udults.

#### Hapludults, pág. 269

### Fragiudults

#### Clave para Subgrupos

HCBA. Fragiudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico o kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Fragiudults

HCBB. Otros Fragiudults que tienen *ambos de* las siguientes:

1. En uno o más horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un

chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y

2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthaquic Fragiudults**

HCBC. Otros Fragiudults que cumplen *ambos de* las siguientes:

1. Satisfacen *una o más* de las siguientes:
  - a. Tienen un horizonte glóssico encima del fragipán; *o*
  - b. No tienen, encima del fragipán, un horizonte argílico o kándico que tiene revestimientos arcillosos sobre las superficies horizontales y verticales de cualquier agregado estructural; *o*
  - c. Entre el horizonte argílico o kándico y el fragipán, tienen uno o más horizontes con 50 por ciento o más de chroma de 3 o menos y con un contenido de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) mas bajo que tanto el horizonte argílico o kándico y el fragipán; y

2. En uno o más horizontes dentro de los 40 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Glossaquic Fragiudults**

HCBD. Otros Fragiudults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico, empobrecimientos redox con un chroma de 2 o menos y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Fragiudults**

HCBE. Otros Fragiudults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Fragiudults**

HCBF. Otros Fragiudults que satisfacen *una o más* de las siguientes:

1. Tienen un horizonte glóssico encima del fragipán; *o*
2. No tienen, encima del fragipán, un horizonte argílico o kándico que tiene revestimientos arcillosos sobre las superficies horizontales y verticales de cualquier agregado estructural; *o*
3. Entre el horizonte argílico o kándico y el fragipán, tienen uno o más horizontes con 50 por ciento o más de chroma de 3 o menos y con un contenido de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto, en la fracción de tierra-fina) mas bajo que tanto el horizonte argílico o kándico y el fragipán.

#### **Glossic Fragiudults**

HCBG. Otros Fragiudults que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color de value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) en *ya sea*:

1. Un horizonte Ap que tiene 18 cm o más de espesor; *o*
2. Una capa superficial después de mezclar los 18 cm superiores.

#### **Humic Fragiudults**

HCBH. Otros Fragiudults.

#### **Typic Fragiudults**

### **Hapludults**

#### **Clave para Subgrupos**

HCGA. Hapludults que tienen *una o ambas*:

1. En cada pedón, un contacto lítico discontinuo dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. En cada pedón, un horizonte argílico discontinuo que es interrumpido por los bordes de lechos rocosos.

#### **Lithic-Ruptic-Entic Hapludults**

HCGB. Otros Hapludults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Hapludults**

HCGC. Otros Hapludults que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su limite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Hapludults**

HCGD. Otros Hapludults que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; y
2. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Fragiaquic Hapludults**

HCGE. Otros Hapludults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. En uno o más subhorizontes dentro de los 60 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Arenic Hapludults**

HCGF. Otros Hapludults que tienen en uno o más subhorizontes dentro de los 60 cm superiores del horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Hapludults**

HCGG. Otros Hapludults que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Hapludults**

HCGH. Otros Hapludults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Hapludults**

HCGI. Otros Hapludults que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del

horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Hapludults**

HCGJ. Otros Hapludults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Hapludults**

HCGK. Otros Hapludults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Hapludults**

HCGL. Otros Hapludults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### **Grossarenic Hapludults**

HCGM. Otros Hapludults que tienen:

1. Sin un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Un horizonte argílico de 25 cm o menos de espesor.

#### **Inceptic Hapludults**

HCGN. Otros Hapludults que tienen un color del value, en húmedo, de 3 o menos y un color del value, en seco, de 5 o menos (muestras molidas y homogeneizadas) en *ya sea*:

1. Un horizonte Ap que tiene 18 cm o más de espesor; *o*
2. Una capa superficial después de mezclar los 18 cm superiores.

#### **Humic Hapludults**

HCGO. Otros Hapludults.

#### **Typic Hapludults**

### **Kandiudults**

#### **Clave para Subgrupos**

HCCA. Kandiudults que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
3. En una o más capas ya sea dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o si el chroma a través de los 75 cm superiores resulta de granos de arena no recubiertos, dentro

de los 12.5 cm superiores de un horizonte kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Arenic Plinthagic Kandiudults**

HCCB. Otros Kandiudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; y
2. En una o más capas ya sea dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o si el chroma a través de los 75 cm superiores resulta de granos de arena no recubiertos, dentro de los 12.5 cm superiores de un horizonte kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Arenic Kandiudults**

HCCC. Otros Kandiudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; y
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Kandiudults**

HCCD. Otros Kandiudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; y
2. En todos los subhorizontes en los 75 cm superiores del horizonte kándico o a través de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 75 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:
  - a. Un hue de 2.5YR o más rojizo; y
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos; y
  - c. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Arenic Rhodic Kandiudults**

HCCE. Otros Kandiudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Kandiudults**

HCCF. Otros Kandiudults que tienen *ambas*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más; y
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Plinthic Kandiudults**

HCCG. Otros Kandiudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 100 cm o más.

#### **Grossarenic Kandiudults**

HCCH. Otros Kandiudults que tienen:

1. Una CICE de 1.5 cmol(+)/kg de arcilla o menos (suma de bases extractables con NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7, más Al extractable con KCl 1N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Acrudoxic Plinthic Kandiudults**

HCCI. Otros Kandiudults que tienen una CICE de 1.5 cmol(+)/kg de arcilla o menos (suma de bases extractables con NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7, más Al extractable con KCl 1N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Acrudoxic Kandiudults**

HCCJ. Otros Kandiudults que tienen *ambos*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthagic Kandiudults**

HCCK. Otros Kandiudults que tienen *ambos*:

1. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral con *una o más* de las siguientes:

a. Una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *o*

b. Más de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos más gruesos de 2.0 mm, de los cuales más de 66 por ciento son cenizas, pómez o fragmentos semejantes a pómez; *o*

c. Una fracción de tierra-fina que contiene 30 por ciento o más de partículas de 0.02 a 2.0 mm de diámetro; *y*

(1) En la fracción de 0.02 a 2.0 mm, 5 por ciento o más de vidrio volcánico; *y*

(2) [(El Al más  $\frac{1}{2}$  Fe, en por ciento, extraídos con oxalato de amonio) por 60] más el vidrio volcánico (en por ciento), igual a 30 o más.

#### **Aquandic Kandiuults**

HCCL. Otros Kandiuults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Kandiuults**

HCCM. Otros Kandiuults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kandiuults**

HCCN. Otros Kandiuults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kandiuults**

HCCO. Otros Kandiuults que:

1. Tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

a. 20 o más días consecutivos; *o*

b. 30 o más días acumulativos.

#### **Ombroaquic Kandiuults**

HCCP. Otros Kandiuults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*

2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Kandiuults**

HCCQ. Otros Kandiuults que tienen un horizonte sómblico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Sombric Kandiuults**

HCCR. Otros Kandiuults que tienen, en todos los subhorizontes en los 75 cm superiores del horizonte kándico o a través de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 75 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*

2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*

3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Rhodic Kandiuults**

HCCS. Otros Kandiuults.

#### **Typic Kandiuults**

### **Kanhapludults**

#### **Clave para Subgrupos**

HCDA. Kanhapludults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Kanhapludults**

HCDB. Otros Kanhapludults que tienen:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Kanhapludults**

HCDC. Otros Kanhapludults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*

2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Kandiuults**

HCDD. Otros Kanhapludults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Kanhapludults

HCDE. Otros Kanhapludults que tienen una CICE de 1.5 cmol(+)/kg de arcilla o menos (suma de bases extractables con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7, más Al extractable con KCl 1N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Acrudoxic Kanhapludults

HCDF. Otros Kanhapludults que tienen:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Fragiaquic Kanhapludults

HCDG. Otros Kanhapludults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de  $1.0 \text{ g/cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Kanhapludults

HCDH. Otros Kanhapludults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Kanhapludults

HCDI. Otros Kanhapludults que:

1. Tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

#### Ombroaquic Kanhapludults

HCDJ. Otros Kanhapludults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### Oxyaquic Kanhapludults

HCDK. Otros Kanhapludults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kanhapludults

HCDL. Otros Kanhapludults que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### Fragic Kanhapludults

HCDM. Otros Kanhapludults que tienen, en todos los subhorizontes en los 50 cm superiores del horizonte kándico o a través de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 50 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### Rhodic Kanhapludults

HCDN. Otros Kanhapludults.

#### Typic Kanhapludults

### Paleudults

#### Clave para Subgrupos

HCEA. Paleudults que tienen *una o ambas* de las siguientes:

1. Grietas dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral, que tienen 5 mm o más de anchura a través de un espesor de 30 cm o más por algún tiempo en años normales y caras de fricción o agregados en forma de cuña, en una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 125 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. Una extensibilidad lineal de 6.0 cm o más entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 100 cm o a

un contacto dénsico, lítico o paralítico, cualquiera que esté más somero.

#### **Vertic Paleudults**

HCEB. Otros Paleudults que tienen un horizonte de 5 cm o más de espesor, abajo de un horizonte Ap o a una profundidad de 18 cm o más a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, que tiene *una o más* de las siguientes:

1. En 25 por ciento o más de cada pedón, cementación por materia orgánica y aluminio, con o sin hierro; *o*
2. Porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) totalizando 0.25 o más, y la mitad de esa cantidad o menos en un horizonte suprayacente; *o*
3. Un valor de la DOEO de 0.12 o más, y un valor de la mitad cuando mucho o menos en un horizonte suprayacente.

#### **Spodic Paleudults**

HCEC. Otros Paleudults que tienen:

1. En una o más capas ya sea dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o si el chroma a través de los 75 cm superiores resulta de granos de arena no recubiertos, dentro de los 12.5 cm superiores de un horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); *y*
2. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más; *y*
3. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthaquic Paleudults**

HCED. Otros Paleudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico que esta a 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral; *y*
2. En una o más capas ya sea dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o si el chroma a través de los 75 cm superiores resulta de granos de arena no recubiertos, dentro de los 12.5 cm superiores de un horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Arenic Paleudults**

HCEE. Otros Paleudults que tienen condiciones antrácuicas.

#### **Anthraquic Paleudults**

HCEF. Otros Paleudults que tienen *ambos*:

1. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie mineral del suelo; *y*
2. En una o más capas ya sea dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral o si el chroma a través de los 75 cm superiores resulta de granos de arena no recubiertos, dentro de los 12.5 cm superiores de un horizonte argílico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañado por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Plinthaquic Paleudults**

HCEG. Otros Paleudults que tienen *ambos*:

1. Propiedades frágicas de suelo:
  - a. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
  - b. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor; *y*
2. En una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Fragiaquic Paleudults**

HCEH. Otros Paleudults que tienen, en una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos acompañados con concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Paleudults**

HCEI. Otros Paleudults que en años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

#### **Oxyaquic Paleudults**

HCEJ. Otros Paleudults que tienen un horizonte argílico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:

- a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico); *o*
- b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico) y una o más partes del horizonte argílico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### **Lamellic Paleudults**

HCEK. Otros Paleudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Paleudults**

HCEL. Otros Paleudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Paleudults**

HCEM. Otros Paleudults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más; *y*
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Grossarenic Plinthic Paleudults**

HCEN. Otros Paleudults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Paleudults**

HCEO. Otros Paleudults que tienen:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 a 100 cm; *y*
2. En todos los subhorizontes en los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:
  - a. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
  - b. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
  - c. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Arenic Rhodic Paleudults**

HCEP. Otros Paleudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### **Arenic Paleudults**

HCEQ. Otros Paleudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 100 cm o más.

#### **Grossarenic Paleudults**

HCER. Otros Paleudults que tienen propiedades frágicas de suelo:

1. En 30 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *o*
2. En 60 por ciento o más del volumen de una capa de 15 cm o más de espesor.

#### **Fragic Paleudults**

HCES. Otros Paleudults que tienen, en todos los subhorizontes en los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Rhodic Paleudults**

HCET. Otros Paleudults.

#### **Typic Paleudults**

#### **Plinthudults**

#### **Clave para Subgrupos**

HCAA. Todos los Plinthudults.

#### **Typic Plinthudults**

#### **Rhodudults**

#### **Clave para Subgrupos**

HCFA. Rhodudults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Rhodudults**

HCFB. Otros Rhodudults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Rhodudults**

HCFC. Otros Rhodudults.

### Typic Rhodudults

## Ustults

### Clave para Grandes Grupos

HDA. Ustults que tienen uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral en los cuales la plintita forma una fase continua o constituye la mitad o más del volumen.

**Plinthustults**, pág. 279

HDB. Otros Ustults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Tienen un horizonte kándico; *y*
3. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo *y*, abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

**Kandiustults**, pág. 277

HDC. Otros Ustults que tienen un horizonte kándico.

**Kanhaplustults**, pág. 278

HDD. Otros Ustults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:
  - a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; *o*
  - b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo *y*, abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

**Paleustults**, pág. 279

HDE. Otros Ustults que tienen *ambos*:

1. Un epipedón que tiene un color del value, en húmedo, de 3 o menos en todo su espesor; *y*
2. En todos los subhorizontes en los 100 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su

espesor es menor de 100 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

- a. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
- b. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
- c. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

**Rhodustults**, pág. 279

HDF. Otros Ustults.

**Haplustults**, pág. 276

## Haplustults

### Clave para Subgrupos

H DFA. Haplustults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Haplustults**

HDFB. Otros Haplustults que tienen un contacto petroférico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Petroferric Haplustults**

HDFC. Otros Haplustults que tienen, en una o más capas dentro de los 12.5 cm superiores del horizonte argílico y dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

**Aquic Haplustults**

HDFD. Otros Haplustults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico a una profundidad de 50 cm o más abajo de la superficie del suelo mineral.

**Arenic Haplustults**

HDFE. Otros Haplustults que:

1. Tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

**Ombroaquic Haplustults**

HDFF. Otros Haplustults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Haplustults**

HDFG. Otros Haplustults que tienen una CIC (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7) de menos de 24  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de arcilla en 50 por ciento o más de todo el horizonte argílico si es menor de 100 cm de espesor o en sus 100 cm superiores.

#### **Kanhaplic Haplustults**

HDFH. Otros Haplustults.

#### **Typic Haplustults**

### **Kandiustults**

#### **Clave para Subgrupos**

HDBA. Kandiustults que tienen una CICE de 1.5  $\text{cmol}(+)/\text{kg}$  de arcilla o menos (suma de bases extractables con  $\text{NH}_4\text{OAc}$  1N a pH 7, más Al extractable con KCl 1N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Acrustoxic Kandiustults**

HDBB. Otros Kandiustults que tienen, en una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### **Aquic Kandiustults**

HDBC. Otros Kandiustults que tienen *ambos*:

1. Una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 cm o más; y
2. 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Arenic Plinthic Kandiustults**

HDBD. Otros Kandiustults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 cm o más.

#### **Arenic Kandiustults**

HDBE. Otros Kandiustults que tienen *ambos*:

1. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0  $\text{g}/\text{cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; y
2. Si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *ya sea*:

a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que está seca en alguna parte por 135 días o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Udandic Kandiustults**

HDBF. Otros Kandiustults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0  $\text{g}/\text{cm}^3$  o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### **Andic Kandiustults**

HDBG. Otros Kandiustults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Plinthic Kandiustults**

HDBH. Otros Kandiustults que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o más frío y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por más de cuatro-décimos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; y

b. Está seca en alguna parte por seis-décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Kandiustults**

HDBI. Otros Kandiustults que, si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por 135 días o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udic Kandiuustults

HDBJ. Otros Kandiuustults que tienen, en todos los subhorizontes en los 50 cm superiores del horizonte kándico o a través de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 75 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; *y*
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; *y*
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### Rhodic Kandiuustults

HDBK. Otros Kandiuustults.

#### Typic Kandiuustults

### Kanhaplustults

#### Clave para Subgrupos

HDCA. Kanhaplustults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Kanhaplustults

HDCB. Otros Kanhaplustults que tienen una CICE de 1.5 cmol(+)/kg de arcilla o menos (suma de bases extractables con NH<sub>4</sub>OAc 1N a pH 7, más Al extractable con KCl 1N) en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Acrustoxic Kanhaplustults

HDCC. Otros Kanhaplustults que tienen, en una o más capas dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Kanhaplustults

HDCCD. Otros Kanhaplustults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Kanhaplustults

HDCE. Otros Kanhaplustults que tienen *ambos*:

1. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0; *y*

2. Si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, *ya sea*:

- a. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que está seca en alguna parte por 135 días o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*
- b. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un iso más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### Udandic Kanhaplustults

HDCF. Otros Kanhaplustults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Kanhaplustults

HDCG. Otros Kanhaplustults que tienen 5 por ciento o más (por volumen) de plintita en uno o más horizontes dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Plinthic Kanhaplustults

HDCH. Otros Kanhaplustults que:

1. Tienen, en uno o más horizontes dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones redox, un color del value, en húmedo, de 4 o más, y un hue que es 10YR o más amarillento y se vuelve rojizo con el incremento de la profundidad dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*
2. En años normales están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral por *una o ambas*:

- a. 20 o más días consecutivos; *o*
- b. 30 o más días acumulativos.

#### Ombroaquic Kanhaplustults

HDCI. Otros Kanhaplustults que, cuando no han sido ni irrigados ni barbechados para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o más frío *y* una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por más de cuatro-décimos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura del suelo, a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; *o*

2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales:

- a. Está húmeda en alguna o en todas partes por menos de 90 días consecutivos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C; y
- b. Está seca en alguna parte por seis-décimos o más de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C.

#### **Aridic Kanhaplustults**

HD CJ. Otros Kanhaplustults que, si nunca se han irrigado ni barbechado para almacenar humedad, tienen *ya sea*:

1. Un régimen de temperatura del suelo mésico o térmico y una sección de control de humedad que en años normales está seca en alguna parte por 135 días o menos de los días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 5 °C; o
2. Un régimen de temperatura del suelo hipertérmico, isomésico o un *iso* más caliente, y una sección de control de humedad que en años normales, está seca en alguna o en todas partes por menos de 120 días acumulativos por año, cuando la temperatura a una profundidad de 50 cm abajo de la superficie del suelo, es mayor de 8 °C.

#### **Udic Kanhaplustults**

HD CK. Otros Kanhaplustults que tienen, en todos los subhorizontes en los 50 cm superiores del horizonte kándico o a través de todo el horizonte kándico si su espesor es menor de 50 cm, más de 50 por ciento con colores que tienen *todas* las siguientes:

1. Un hue de 2.5YR o más rojizo; y
2. Un value, en húmedo, de 3 o menos; y
3. Un value en seco no mayor de 1 unidad más alto que el value en húmedo.

#### **Rhodic Kanhaplustults**

HD CL. Otros Kanhaplustults.

#### **Typic Kanhaplustults**

### **Paleustults**

#### **Clave para Subgrupos**

HD DA. Todos los Paleustults.

#### **Typic Paleustults**

### **Plinthustults**

#### **Clave para Subgrupos**

HD AA. Plinthustults que tienen:

1. Un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; o

2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

- a. Con el incremento de la profundidad, un decrecimiento de arcilla del 20 por ciento o más (relativo) a partir del contenido máximo; y
- b. Menos del 5 por ciento (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla menor en 20 por ciento o, abajo de esa capa, un incremento de arcilla de menos de 3 por ciento (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### **Haplic Plinthustults**

HD AB. Otros Plinthustults.

#### **Typic Plinthustults**

### **Rhodustults**

#### **Clave para Subgrupos**

HDE A. Rhodustults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Rhodustults**

HDE B. Otros Rhodustults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o a través de todo el horizonte argílico si su espesor es menor de 75 cm.

#### **Psammentic Rhodustults**

HDE C. Otros Rhodustults.

#### **Typic Rhodustults**

### **Xerults**

#### **Clave para Grandes Grupos**

HE A. Xerults que:

1. No tienen un contacto dénsico, lítico, paralítico o petroférico dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral; y

2. Dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral, *ya sea*:

- a. Con el incremento de la profundidad, no tienen una disminución de arcilla de 20 por ciento o más (relativo) del contenido máximo; o
- b. Tienen 5 por ciento o más (por volumen) de esqueletanes sobre las caras de los agregados en la capa que tiene un contenido de arcilla 20 por ciento más bajo y, abajo de esa capa, un incremento de arcilla de 3 por ciento o más (absoluto) en la fracción de tierra-fina.

#### **Palexerults**, pág. 280

HE B. Otros Xerults.

#### **Haploxerults**, pág. 280

## Haploxerults

### Clave para Subgrupos

HEBA. Haploxerults que tienen *ambas*:

1. Un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral; y
2. En cada pedón, un horizonte argílico o kándico discontinuo que es interrumpido por los bordes de lechos rocosos.

#### Lithic-Ruptic-Inceptic Haploxerults

HEBB. Otros Haploxerults que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Haploxerults

HEBC. Otros Haploxerults que tienen, en uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados con concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Haploxerults

HEBD. Otros Haploxerults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Andic Haploxerults

HEBE. Otros Haploxerults que tienen un horizonte argílico o kándico que:

1. Consiste totalmente de lamelas; *o*
2. Es una combinación de dos o más lamelas y uno o más subhorizontes con un espesor de 7.5 a 20 cm, cada capa con un horizonte eluvial suprayacente; *o*
3. Consiste de uno o más subhorizontes que tienen más de 20 cm de espesor, cada uno con un horizonte eluvial suprayacente y encima de estos horizontes existen *ya sea*:
  - a. Dos o más lamelas con un espesor combinado de 5 cm o más (que pueden o no ser parte del horizonte argílico o kándico); *o*
  - b. Una combinación de lamelas (que pueden o no ser parte del horizonte argílico o kándico) y una o más partes del horizonte argílico o kándico de 7.5 a 20 cm de espesor, cada una con un horizonte eluvial suprayacente.

#### Lamellic Haploxerults

HEBF. Otros Haploxerults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa a través de los 75 cm superiores del horizonte argílico o kándico o a través de todo el horizonte si su espesor es menor de 75 cm.

#### Psammentic Haploxerults

HEBG. Otros Haploxerults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico o kándico a una profundidad de 50 a 100 cm.

#### Arenic Haploxerults

HEBH. Otros Haploxerults que tienen una clase de tamaño de partícula arenosa o esquelética-arenosa en toda una capa que se extiende desde la superficie del suelo mineral al límite superior de un horizonte argílico o kándico a una profundidad de 100 cm o más.

#### Grossarenic Haploxerults

HEBI. Otros Haploxerults.

#### Typic Haploxerults

## Palexerults

### Clave para Subgrupos

HEAA. Palexerults que tienen *ambos*:

1. En uno o más subhorizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y también condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial); y
2. A través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos, medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más ½ Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

#### Aquandic Palexerults

HEAB. Otros Palexerults que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 25 cm superiores del horizonte argílico o kándico, empobrecimientos redox con un color del value, en húmedo, de 4 o más y un chroma de 2 o menos, acompañados por concentraciones redox y por condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial).

#### Aquic Palexerults

HEAC. Otros Palexerults que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 18 cm o más, dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral, una fracción de tierra-fina con una densidad aparente de 1.0 g/cm<sup>3</sup> o menos,

medida a una retención de agua de 33 kPa y porcentajes de Al más  $\frac{1}{2}$  Fe (por oxalato de amonio) de más de 1.0.

**Andic Palexerults**

HEAD. Otros Palexerults.

**Typic Palexerults**



## CAPÍTULO 16

### Vertisols

#### Clave para Subórdenes

FA. Vertisols que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácidas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *una o ambas* de las siguientes:

1. En más de la mitad de cada pedón, ya sea sobre las caras de los agregados o en la matriz si los agregados están ausentes, 50 por ciento o más con un chroma de *ya sea*:
  - a. 2 o menos si están presentes concentraciones redox; *o*
  - b. 1 o menos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso activo ( $\text{Fe}^{2+}$ ) para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa en un tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

**Aquerts**, pág. 283

FB. Otros Vertisols que tienen un régimen de temperatura del suelo cryico.

**Cryerts**, pág. 287

FC. Otros Vertisols que en años normales tienen *ambos*:

1. Un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico, o frígido; *y*
2. Si no están irrigados durante el año, grietas que permanecen *ambos*:
  - a. Con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 60 o más días consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de verano; *y*
  - b. Cerradas por 60 o más días consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de invierno.

**Xererts**, pág. 293

FD. Otros Vertisols que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales que permanecen cerradas por menos de 60 días consecutivos durante un periodo cuando la temperatura del suelo a una profundidad de 50 cm de la superficie del suelo es mayor de 8 °C.

**Torrerts**, pág. 287

FE. Otros Vertisols que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los

50 cm de la superficie del suelo mineral, por 90 días o más acumulativos por año.

**Usterts**, pág. 290

FF. Otros Vertisols.

**Uderts**, pág. 289

#### Aquerts

##### Clave para Grandes Grupos

FAA. Aquerts que tienen dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral cualquiera:

1. Un horizonte sulfúrico; *o*
2. Materiales sulfídicos.

**Sulfaquerts**, pág. 287

FAB. Otros Aquerts que tienen un horizonte sálico que tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Salaquerts**, pág. 286

FAC. Otros Aquerts que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Duraquerts**, pág. 284

FAD. Otros Aquerts que tienen un horizonte nátrico o tienen un porcentaje de sodio intercambiable de 15 por ciento o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Natraquerts**, pág. 286

FAE. Otros Aquerts que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Calciaquerts**, pág. 284

FAF. Otros Aquerts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, *ambos*:

1. Una conductividad eléctrica en el extracto de saturación de menos de 4.0 dS/m a 25 °C; *y*
2. Un pH con valor de 4.5 o menos en  $\text{CaCl}_2$  0.01M (5.0 o menos en agua 1:1).

**Dystraquerts**, pág. 284

FAG. Otros Aquerts que tienen episaturación  
**Epiaquerts**, pág. 286

FAH. Otros Aquerts.  
**Endoaquerts**, pág. 285

## Calciaquerts

### Clave para Subgrupos

FAEA. Calciaquerts que tienen, en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y una profundidad de 75 cm o el límite superior de un duripán si está más somero, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un hue de 2.5Y o más rojizo y *ya sea*:
  - a. Un value, en húmedo, de 6 o más y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un value, en húmedo, de 5 o menos y chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 5Y y un chroma de 3 o más; *o*
3. Chroma de 2 o más y sin concentraciones redox.

### Aeric Calciaquerts

FAEB. Otros Calciaquerts.

### Typic Calciaquerts

## Duraquerts

### Clave para Subgrupos

FACA. Duraquerts que, sino han sido irrigados durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

### Aridic Duraquerts

FACB. Otros Duraquerts que tienen un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico o frígido y que sino se han irrigado durante el año tiene grietas en años normales que permanecen, *ambos*:

1. Con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de verano; y
2. Cerradas por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de invierno.

### Xeric Duraquerts

FACC. Otros Duraquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 90 días o más acumulativos por año.

### Ustic Duraquerts

FACD. Otros Duraquerts que tienen, en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y una profundidad de 75 cm o el límite superior de un duripán si está más somero, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un hue de 2.5Y o más rojizo y *ya sea*:
  - a. Un value, en húmedo, de 6 o más y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un value, en húmedo, de 5 o menos y un chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 5Y y un chroma de 3 o más; *o*
3. Un chroma de 2 o más y sin concentraciones redox.

### Aeric Duraquerts

FACE. Otros Duraquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, *uno o ambos* de los siguientes en más de la mitad de cada pedón:

1. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un color del value, en seco, de 6 o más.

### Chromic Duraquerts

FACF. Otros Duraquerts.

### Typic Duraquerts

## Dystraquerts

### Clave para Subgrupos

FAFA. Dystraquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, concentraciones de jarosita y un valor de pH de 4.0 o menos (en agua 1:1, secado al aire lentamente a la sombra).

### Sulfaqueptic Dystraquerts

FAFB. Otros Dystraquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

### Aridic Dystraquerts

FAFC. Otros Dystraquerts que, sino se han irrigado durante el año, tiene grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 90 días acumulativos por año.

### Ustic Dystraquerts

FAFD. Otros Dystraquerts que tienen, en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y una profundidad de 75 cm, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un hue de 2.5Y o más rojizo y *ya sea*:
  - a. Un value, en húmedo, de 6 o más y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un value, en húmedo, de 5 o menos y un chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 5Y y chroma de 3 o más; *o*
3. Un chroma de 2 o más y sin concentraciones redox.

**Aeric Dystraquerts**

FAFE. Otros Dystraquerts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Dystraquerts**

FAFF. Otros Dystraquerts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Dystraquerts**

FAFG. Otros Dystraquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, *uno o ambos* de los siguientes en más de la mitad de cada pedón:

1. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un color del value, en seco, de 6 o más.

**Chromic Dystraquerts**

FAFH. Otros Dystraquerts.

**Typic Dystraquerts**

## Endoaquerts

### Clave para Subgrupos

FAHA. Endoaquerts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

**Halic Endoaquerts**

FAHB. Otros Endoaquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

**Sodic Endoaquerts**

FAHC. Otros Endoaquerts que, sino han sido irrigados durante el año, tiene grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

**Aridic Endoaquerts**

FAHD. Otros Endoaquerts que tienen un régimen de temperatura del suelo térmico, mésico, o frígido y sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales que permanecen, *ambos*:

1. Con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de verano; y
2. Cerradas por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de invierno

**Xeric Endoaquerts**

FAHE. Otros Endoaquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, por 90 días o más acumulativos por año.

**Ustic Endoaquerts**

FAHF. Otros Endoaquerts que tienen, en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y una profundidad de 75 cm, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un hue de 2.5Y o más rojizo y *ya sea*:
  - a. Un value, en húmedo, de 6 o más y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un value, en húmedo, de 5 o menos y un chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 5Y y un chroma de 3 o más; *o*
3. Un chroma de 2 o más y sin concentraciones redox.

**Aeric Endoaquerts**

FAHG. Otros Endoaquerts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Endoaquerts**

FAHH. Otros Endoaquerts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Endoaquerts**

FAHI. Otros Endoaquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, *uno o ambos* de las siguientes en más de la mitad de cada pedón:

1. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un color del value, en seco, de 6 o más.

**Chromic Endoaquerts**

FAHJ. Otros Endoaquerts.

**Typic Endoaquerts**

## Epiaquerts

### Clave para Subgrupos

FAGA. Epiaquerts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

#### Halic Epiaquerts

FAGB. Otros Epiaquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### Sodic Epiaquerts

FAGC. Otros Epiaquerts que, sino se han irrigado durante el año, tiene grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm a partir de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

#### Aridic Epiaquerts

FAGD. Otros Epiaquerts que tienen un régimen de temperatura de suelo térmico, mésico o frígido y sino se han irrigado durante el año, tiene grietas en años normales que permanecen, *ambos*:

1. Con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelos mineral, por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de verano; y
2. Cerradas por 60 días o más consecutivos durante los 90 días siguientes al solsticio de invierno.

#### Xeric Epiaquerts

FAGE. Otros Epiaquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 90 días o más acumulativos por año.

#### Ustic Epiaquerts

FAGF. Otros Epiaquerts que tienen, en uno o más horizontes entre un horizonte Ap o a una profundidad de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral, cualquiera que sea más profunda, y una profundidad de 75 cm, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un hue de 2.5Y o más rojizo y *ya sea*:
  - a. Un value, en húmedo, de 6 o más y un chroma de 3 o más; *o*
  - b. Un value, en húmedo, de 5 o menos y un chroma de 2 o más; *o*
2. Un hue de 5Y y un chroma de 3 o más; *o*
3. Un chroma de 2 o más y sin concentraciones redox.

#### Aeric Epiaquerts

FAGG. Otros Epiaquerts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Epiaquerts

FAGH. Otros Epiaquerts que tienen, una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Entic Epiaquerts

FAGI. Otros Epiaquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, *uno o ambos* de los siguientes en más de la mitad de cada pedón:

1. Un color del value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un color del value, en seco, de 6 o más.

#### Chromic Epiaquerts

FAGJ. Otros Epiaquerts.

#### Typic Epiaquerts

## Natraquerts

### Clave para Subgrupos

FADA. Todos los Natraquerts.

#### Typic Natraquerts

## Salaquerts

### Clave para Subgrupos

FABA. Salaquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

#### Aridic Salaquerts

FABB. Otros Salaquerts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 90 días o más acumulativos por año.

#### Ustic Salaquerts

FABC. Otros Salaquerts que tienen un contacto dénsico, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Salaquerts

FABD. Otros Salaquerts los cuales tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contienen menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Entic Salaquerts

FABE. Otros Salaquerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

### Chromic Salaquerts

FABF. Otros Salaquerts.

### Typic Salaquerts

## Sulfaquerts

### Clave para Subgrupos

FAAA. Sulfaquerts que tienen un horizonte sálico dentro de los 75 cm de la superficie del suelo mineral.

### Salic Sulfaquerts

FAAB. Otros Sulfaquerts que no tienen un horizonte sulfúrico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

### Sulfic Sulfaquerts

FAAC. Otros Sulfaquerts.

### Typic Sulfaquerts

## Cryerts

### Clave para Grandes Grupos

FBA. Cryerts que tienen 10 kg/m<sup>2</sup> o más de carbón orgánico entre la superficie del suelo mineral y una profundidad de 50 cm.

### Humicryerts, pág. 287

FBB. Otros Cryerts.

### Haplocryerts, pág. 287

## Haplocryerts

### Clave para subgrupos

FBBA. Haplocryerts que tiene, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

### Sodic Haplocryerts

FBBB. Otros Haplocryerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

### Chromic Haplocryerts

FBBC. Otros Haplocryerts.

### Typic Haplocryerts

## Humicryerts

### Clave para Subgrupos

FBAA. Humicryerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 meses o más en años normales.

### Sodic Humicryerts

FBAB. Otros Humicryerts.

### Typic Humicryerts

## Torrerts

### Clave para Grandes Grupos

FDA. Torrerts que tienen un horizonte sálico que tiene un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Salitorrerts, pág. 288

FDB. Otros Torrerts que tienen un horizonte gypico que tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Gypsitorrerts, pág. 288

FDC. Otros Torrerts que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Calcitorrerts, pág. 287

FDD. Otros Torrerts.

### Haplotorrerts, pág. 288

## Calcitorrerts

### Clave para Subgrupos

FDCA. Calcitorrerts que tienen un horizonte petrocálcico que tienen su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Petrocalcic Calcitorrerts

FDCB. Otros Calcitorrerts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Leptic Calcitorrerts

FDCC. Otros Calcitorrerts los cuales tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

### Entic Calcitorrerts

FDCC. Otros Calcitorrerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de 30 cm de la superficie del suelo, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Calcitorrerts**

FDCE. Otros Calcitorrerts.

**Typic Calcitorrerts**

**Gypsitorrerts**

**Clave para Subgrupos**

FDBA. Gypsitorrerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Gypsiorrerts**

FDBB. Otros Gypsitorrerts.

**Typic Gypsitorrerts**

**Haplotorrerts**

**Clave para Subgrupos**

FDDA. Haplotorrerts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

**Halic Haplotorrerts**

FDDB. Otros Haplotorrerts que tienen en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

**Sodic Haplotorrerts**

FDDC. Otros Haplotorrerts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Leptic Haplotorrerts**

FDDD. Otros Haplotorrerts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y con su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Entic Haplotorrerts**

FDDE. Otros Haplotorrerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Haplotorrerts**

FDDE. Otros Haplotorrerts.

**Typic Haplotorrerts**

**Salitorrerts**

**Clave para Subgrupos**

FDDA. Salitorrerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *cualquiera*:

1. Propiedades redoximórficas; *o*
2. Suficiente hierro ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está siendo irrigado.

**Aquic Salitorrerts**

FDAB. Otros Salitorrerts que tienen, un contacto dénsico, lítico, o paralítico o el límite superior de un duripán o de un horizonte petrocálcico, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Leptic Salitorrerts**

FDAC. Otros Salitorrerts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

**Entic Salitorrerts**

FDAD. Otros Salitorrerts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Salitorrerts**

FDAE. Otros Salitorrerts.

**Typic Salitorrerts**

## Uderts

### Clave para Grandes Grupos

FFA. Uderts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, *ambas*:

1. Una conductividad eléctrica del extracto de saturación de menos de 4.0 dS/m a 25 °C; *y*
2. Un valor de pH de 4.5 o menos en CaCl<sub>2</sub> 0.01 M (5.0 o menos en pasta de saturación)

**Dystruderts**, pág. 289

FFB. Otros Uderts.

**Hapluderts**, pág. 289

## Dystruderts

### Clave para Subgrupos

FFAA. Dystruderts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *cualquiera*:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso (Fe<sup>2+</sup>) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa, al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

**Aquic Dystruderts**

FFAB. Otros Dystruderts que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

**Oxyaquic Dystruderts**

FFAC. Otros Dystruderts que tienen un contacto denso, lítico o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Dystruderts**

FFAD. Otros Dystruderts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Dystruderts**

FFAE. Otros Dystruderts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*

3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Dystruderts**

FFAF. Otros Dystruderts.

**Typic Dystruderts**

## Hapluderts

### Clave para Subgrupos

FFBA. Hapluderts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Hapluderts**

FFBB. Otros Hapluderts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *cualquiera*:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso (Fe<sup>2+</sup>) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa, al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

**Aquic Hapluderts**

FFBC. Otros Hapluderts que están saturados con agua en una o más capas dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral en años normales por *una o ambas*:

1. 20 o más días consecutivos; *o*
2. 30 o más días acumulativos.

**Oxyaquic Hapluderts**

FFBD. Otros Hapluderts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Hapluderts**

FFBE. Otros Hapluderts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Hapluderts**

FFBF. Otros Hapluderts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Hapluderts**

FFBG. Otros Hapluderts.

**Typic Hapluderts**

## Usterts

### Clave para Grandes Grupos

FEA. Usterts que tienen, a través de uno o más horizontes con un espesor total de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, *ambos*:

1. Una conductividad eléctrica del extracto de saturación de menos de 4.0 dS/m a 25 °C; *y*
2. Un valor de pH de 4.5 o menos en CaCl<sub>2</sub> 0.01 M (5.0 o menos en pasta de saturación).

**Dystrusterts**, pág. 290

FEB. Otros Usterts que tienen un horizonte sálico, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Salusterts**, pág. 292

FEC. Otros Usterts que tienen un horizonte gypsico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Gypsiusterts**, pág. 291

FED. Otros Usterts que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Calciusterts**, pág. 290

FEE. Otros Usterts.

**Haplusterts**, pág. 291

## Calciusterts

### Clave para Subgrupos

FEDA. Calciusterts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Calciusterts**

FEDB. Otros Calciusterts que tienen a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

**Halic Calciusterts**

FEDC. Otros Calciusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

**Sodic Calciusterts**

FEDD. Otros Calciusterts que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Petrocalcic Calciusterts**

FEDE. Otros Calciusterts que, sino han sido irrigados durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

**Aridic Calciusterts**

FEDF. Otros Calciusterts que, sino han sido irrigados durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 150 días acumulativos por año.

**Udic Calciusterts**

FEDG. Otros Calciusterts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Calciusterts**

FEDH. Otros Calciusterts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Calciusterts**

FEDI. Otros Calciusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Calciusterts**

FEDJ. Otros Calciusterts.

**Typic Calciusterts**

## Dystrusterts

### Clave para Subgrupos

FEAA. Dystrusterts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Dystrusterts**

FEAB. Otros Dystrusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *cualquiera*:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso (Fe<sup>2+</sup>) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa, al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

**Aquic Dystrusterts**

FEAC. Otros Dystrusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

#### **Aridic Dystrusterts**

FEAD. Otros Dystrusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 150 días acumulativos por año.

#### **Udic Dystrusterts**

FEAE. Otros Dystrusterts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Leptic Dystrusterts**

FEAF. Otros Dystrusterts que tienen un capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene un límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Dystrusterts**

FEAG. Otros Dystrusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

#### **Chromic Dystrusterts**

FEAH. Otros Dystrusterts.

#### **Typic Dystrusterts**

### **Gypsiusterts**

#### **Clave para Subgrupos**

FECA. Gypsiusterts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Gypsiusterts**

FECB. Otros Gypsiusterts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

#### **Halic Gypsiusterts**

FECC. Otros Gypsiusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### **Sodic Gypsiusterts**

FECD. Otros Gypsiusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

#### **Aridic Gypsiusterts**

FECE. Otros Gypsiusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 150 días acumulativos por año.

#### **Udic Gypsiusterts**

FECF. Otros Gypsiusterts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán u horizonte petrocálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Leptic Gypsiusterts**

FECG. Otros Gypsiusterts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Gypsiusterts**

FECH. Otros Gypsiusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

#### **Chromic Gypsiusterts**

FECI. Otros Gypsiusterts.

#### **Typic Gypsiusterts**

### **Haplusterts**

#### **Clave para Subgrupos**

FEEA. Haplusterts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haplusterts**

FEEB. Otros Haplusterts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

#### **Halic Haplusterts**

FEEC. Otros Haplusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### **Sodic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

**Petrocalcic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen un horizonte gypsico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo mineral.

**Gypsic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen un horizonte cálcico que tiene su límite superior dentro de los 150 cm de la superficie del suelo.

**Calcic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen *ambos*:

1. Un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm o más de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

**Aridic Leptic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

**Aridic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen *ambos*:

1. Un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Sino se han irrigado durante el año, grietas en 6 o más de cada 10 años que son 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 150 días acumulativos por año.

**Leptic Udic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen:

1. Una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral; *y*

2. Sino se han irrigado durante el año, grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm de espesor o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, en menos de 150 días acumulativos por año.

**Entic Udic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen *ambos*:

1. En uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

a. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*

b. Un value, en seco, de 6 o más; *o*

c. Un chroma de 3 o más; *y*

2. Sino se han irrigado durante el año, grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, en menos de 150 días acumulativos por año.

**Chromic Udic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 150 días acumulativos por año.

**Udic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán, dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Leptic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

**Entic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*

2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*

3. Un chroma de 3 o más.

**Chromic Haplusterts**

FEED. Otros Haplusterts.

**Typic Haplusterts**

**Salusterts**

**Clave para Subgrupos**

FEBA. Salusterts que tienen un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

**Lithic Salusterts**

FEED. Otros Salusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

**Sodic Salusterts**

FEBC. Otros Salusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *cualquiera*:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa, al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

#### Aquic Salusterts

FEBD. Otros Salusterts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 210 días o más acumulativos por año.

#### Aridic Salusterts

FEBE. Otros Salusterts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico, o el límite superior de un duripán u horizonte petrocálcico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Salusterts

FEBF. Otros Salusterts que tienen un capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Entic Salusterts

FEBG. Otros Salusterts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

#### Chromic Salusterts

FEBH. Otros Salusterts.

#### Typic Salusterts

### Xererts

#### Clave para Gran Grupos

FCA. Xererts que tienen un duripán que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Durixererts, pág. 293

FCB. Otros Xererts que tienen un horizonte cálcico o petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Calcixererts, pág. 293

FCC. Otros Xererts.

#### Haploxererts, pág. 294

### Calcixererts

#### Clave para Subgrupos

FCBA. Calcixererts que tiene un contacto lítico dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Lithic Calcixererts

FCBB. Otros Calcixererts que tienen un horizonte petrocálcico que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo.

#### Petrocalcic Calcixererts

FCBC. Otros Calcixererts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 180 días o más consecutivos por año.

#### Aridic Calcixererts

FCBD. Otros Calcixererts que tienen un contacto denso, lítico, o paralítico dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Leptic Calcixererts

FCBE. Otros Calcixererts que tienen una capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### Entic Calcixererts

FCBF. Otros Calcixererts que tienen, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

#### Chromic Calcixererts

FCBG. Otros Calcixererts.

#### Typic Calcixererts

### Durixererts

#### Clave para Subgrupos

FCAA. Durixererts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor sobre el duripán, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) por 6 o más meses en años normales.

#### Halic Durixererts

FCAB. Otros Durixererts que tienen, en uno o más horizontes sobre el duripán, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o una relación de adsorción de sodio de 13 o más) por 6 o más meses en años normales.

#### **Sodic Durixererts**

FCAC. Otros Durixererts que tienen, en uno o más horizontes arriba del duripán, condiciones ácuicas por algún tiempo en años normales (o drenaje artificial) y *ambas*:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa, al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

#### **Aquic Durixererts**

FCAD. Otros Durixererts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor sobre un duripán, por 180 o más días consecutivos.

#### **Aridic Durixererts**

FCAE. Otros Durixererts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas en años normales de 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor sobre un duripán, por menos de 90 días consecutivos.

#### **Udic Durixererts**

FCAF: Otros Durixererts que tienen un duripán que no está endurecido en ningún subhorizonte.

#### **Haplic Durixererts**

FCAG. Otros Durixererts que tiene, en uno o más horizontes dentro de los 30 cm de la superficie del suelo mineral, el 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value, en húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value, en seco, de 6 o más; *o*
3. Un chroma de 3 o más.

#### **Chromic Durixererts**

FCAH. Otros Durixererts.

#### **Typic Durixererts**

### **Haploxererts**

#### **Clave para subgrupos**

FCCA. Haploxererts que tienen un contacto lítico dentro de 50 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Lithic Haploxererts**

FCCB. Otros Haploxererts que tienen, a través de una capa de 15 cm o más de espesor dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral, una conductividad eléctrica de 15 dS/m o más (pasta de saturación) en 6 o más meses en años normales.

#### **Halic Haploxererts**

FCCC. Otros Haploxererts que tienen, en uno o más horizontes dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral, un porcentaje de sodio intercambiable de 15 o más (o relación de adsorción de sodio de 13 o más) en 6 o más meses en años normales.

#### **Sodic Haploxererts**

FCCD. Otros Haploxererts que, sino se han irrigado durante el año, tiene grietas en años normales que permanecen con 5 mm o más de anchura, a través de 25 cm o más de espesor dentro de 50 cm de la superficie del suelo mineral, por 180 días o más consecutivo.

#### **Aridic Haploxererts**

FCCE. Otros haploxererts que tienen, en uno o más horizontes dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral, condiciones ácuicas por algún tiempo en año normal (o drenado artificial) y cualquiera:

1. Rasgos redoximórficos; *o*
2. Suficiente hierro ferroso ( $\text{Fe}^{2+}$ ) activo para dar una reacción positiva a la dipiridil-alfa, alfa al tiempo cuando el suelo no está irrigándose.

#### **Aquic Haploxererts**

FCCF. Otros Haploxererts que, sino se han irrigado durante el año, tienen grietas que permanecen en años normales con 5 mm o más de anchura, a través de un espesor de 25 cm o más dentro de los 50 cm de la superficie del suelo mineral, por menos de 90 días consecutivos por año.

#### **Udic Haploxererts**

FCCG. Otros Haploxererts que tienen un contacto dénsico, lítico, o paralítico dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Leptic Haploxererts**

FCCH. Otros Haploxererts que tienen un capa de 25 cm o más de espesor que contiene menos de 27 por ciento de arcilla en su fracción de tierra-fina y un límite superior dentro de 100 cm de la superficie del suelo mineral.

#### **Entic Haploxererts**

FCCI. Otros Haploxererts que tienen, en uno o más horizontes dentro de 30 cm de la superficie del suelo mineral, 50 por ciento o más de los siguientes colores:

1. Un value del color, húmedo, de 4 o más; *o*
2. Un value del color, seco, de 6 o más; *o*
3. Chroma de 3 o más.

#### **Chromic Haploxererts**

FCCJ. Otros Haploxererts.

#### **Typic Haploxererts**

## CAPÍTULO 17

### *Familia y Series, Diferenciación y Nombres*

Las familias y las series sirven para propósitos netamente pragmáticos, el nombre de las series es abstracto y el nombre técnico de familia es descriptivo. En este capítulo se definen los términos descriptivos usados en los nombres de las familias, se dan las secciones de control en las cuales se aplican tales términos y se indican los criterios, incluyendo el taxa en los cuales se utilizan.

#### **Diferenciación de Familias para Suelos Minerales y Capas Minerales de Algunos Suelos Orgánicos**

Las siguientes diferenciaciones se usan para distinguir familias de suelos minerales y las capas minerales de algunos suelos orgánicos dentro de un subgrupo. Los nombres de las clases de esos componentes se usan para formar el nombre de la familia. Los componentes están enlistados y definidos en la misma secuencia en la que los componentes aparecen en los nombres de la familia.

- Clases de Tamaño de Partícula
- Clases Mineralógicas
- Clases de Actividad de Intercambio Catiónico
- Clases de Reacción y Calcáreas
- Clases de Temperatura del Suelo
- Clases de Profundidad del Suelo
- Clases de Resistencia a la Ruptura
- Clases de Recubrimientos o Revestimientos
- Clases de Grietas

#### **Clases de Tamaño de Partícula y sus Sustitutos**

##### **Definición de Clases de Tamaño de Partícula y sus Sustitutos para Suelos Minerales**

La primer parte del nombre de familia es el nombre de la clase de tamaño de partícula o un sustituto para una clase de tamaño de partícula. El término clase de tamaño de partícula se usa para caracterizar la composición del tamaño del grano para todo el suelo, incluyendo la tierra fina y los fragmentos de roca y para-roca hasta el tamaño de un pedón, pero se excluye a la materia orgánica y a las sales más solubles que el yeso. Los sustitutos para las clases de tamaño de partícula se usan para los suelos que tienen propiedades ándicas de suelo o un alto contenido de vidrio volcánico, pómez y cenizas.

Las clases de tamaño de partícula de esta taxonomía representan un compromiso entre las divisiones convencionales de las clasificaciones pedológicas e ingenieriles. Las clasificaciones ingenieriles tienen marcado el límite entre arena y limo en el diámetro de 74 micrones; mientras que las clasificaciones pedológicas lo hacen entre 50

o 20 micrones. Las clasificaciones ingenieriles se basan en porcentajes de tamaño de granos, por peso, en la fracción del suelo menor de 74 mm de diámetro, mientras que las clases texturales en las clasificaciones pedológicas se basan en porcentajes, por peso, en la fracción menor de 2.0 mm de diámetro. En clasificaciones ingenieriles, el separado arena muy fina (con diámetro entre 50 y 100 micrones o entre 0.05 y 0.1 mm) se ha subdividido a 74 micrones. En la definición de las clases de tamaño de partícula para esta taxonomía, se hace una división similar, pero de diferente forma. Los materiales del suelo que tienen una textura de arena fina o arena francosa fina normalmente tienen cantidades apreciables de arena muy fina, que en su mayoría es más gruesa que 74 micrones. Un sedimento limoso, como el loess, puede también contener cantidades apreciables de arena muy fina, que en su mayoría es más fina que 74 micrones. Por lo tanto, en la designación de las clases de tamaño de partícula para esta taxonomía, se ha permitido que la arena muy fina sea “flotante”. Está incluida con la arena, si la textura (fracción de tierra-fina) del suelo es arena, arena francosa fina o más gruesa. Sin embargo, es tratada como limo, si la textura es arena muy fina, arena francosa muy fina, franco arenosa, franco limosa o más fina.

Se considera que valores específicos para las clases de tamaño de partícula no son adecuados para la diferenciación de familias para todas las diferentes clases de suelos. Por lo tanto, esta taxonomía proporciona 2 clases definidas en forma generalizada y 11 clases definidas en forma más estrecha, que permiten distinciones relativamente finas entre familias de suelos para las cuales el tamaño de partícula es importante; aunque al dar agrupaciones amplias para suelos en los cuales las definiciones de las clases de tamaño de partícula son estrechas pueden producir separaciones indeseables. Así, el término “arcillosa” es usado en algunas familias de suelos para indicar un contenido de arcilla de 35 por ciento (30 por ciento en Vertisols) o más en horizontes específicos; mientras que en otras familias, los términos más específicamente definidos como “fina” o “muy-fina” indican que esos horizontes tienen un contenido de arcilla de 35 (30 por ciento en Vertisols) a 60 por ciento o de 60 por ciento o más en su fracción de tierra-fina. La tierra fina se refiere a las partículas menores de 2.0 mm de diámetro. Los fragmentos rocosos son partículas de 2.0 o más mm de diámetro que están fuertemente cementados o más resistentes a la ruptura e incluyen a todas las partículas con dimensiones horizontales más pequeñas que el tamaño de un pedón. Fragmentos cementados de 2.0 mm o más de diámetro que tienen una clase de resistencia a la ruptura que está menos cementada que la clase fuertemente cementada están referidos como fragmentos de para-rocas. Fragmentos de para-roca, es decir, fragmentos semejantes a rocas, incluyen a todas las partículas entre 2.0 mm y una dimensión horizontal

menor que el tamaño de un pedón. La mayoría de los fragmentos de para-rocas se rompen en fragmentos de 2.0 mm o menos de diámetro durante la preparación de las muestras para el análisis de tamaño de partícula en el laboratorio. Por ello, los fragmentos de para-rocas en general se les incluye dentro de la tierra fina para las clases de tamaño de partícula, aunque a las cenizas, pómez y fragmentos semejantes a pómez son considerados como sustitutos para clases, a pesar de su clase de resistencia a la ruptura.

Los sustitutos, para las clases de tamaño de partícula, se usan en los suelos que tienen propiedades ándicas o un alto contenido de vidrio volcánico, pómez o ceniza. Estos materiales no pueden dispersarse fácilmente y el resultado de la dispersión es variable. En consecuencia, las clases normales de tamaño de partícula no caracterizan adecuadamente a estos componentes. Los sustitutos de los nombres de las clases de tamaño de partícula se usan para esas partes de suelo que tienen propiedades ándicas o un alto contenido de vidrio volcánico, pómez o cenizas, como es el caso de los Andisols y muchos subgrupos Andic y Vitrandic de otros órdenes de suelos. Algunos Spodosols, identificados o no como subgrupos Andic, tienen propiedades ándicas en algunos horizontes dentro de la sección de control del tamaño de partícula y por ello, los nombres de las clases sustitutas de tamaño de partícula son usadas para esos horizontes.

Ningún nombre de una clase de tamaño de partícula ni de un sustituto para un nombre de tamaño de partícula es usado para los Psamments, Psammaquents y subgrupos Psammentic que están en una clase de tamaño de partícula arenosa. Estos taxa tienen, por definición, una clase de tamaño de partícula arenosa o su clase sustituta de ceniza. La clase de tamaño de partícula en este caso, sería considerada como redundante en el nombre de la familia. Sin embargo, la clase sustituta ceniza, se puede nombrar si es apropiada en estos taxa.

Los nombres de las clases de tamaño de partícula se aplican, aunque con algunas reservas, a los horizontes espódicos y a otros horizontes que no tienen propiedades ándicas pero que contienen cantidades significativas de alofano, imogolita, ferrihídrita o complejos alumino-húmicos. La clase mineralógica isotica (definida posteriormente) es útil en la identificación de esas clases de tamaño de partícula.

En general, el promedio ponderado de las clases de tamaño de partícula para toda la sección de control del tamaño de partícula (definida posteriormente) determina qué clase de tamaño de partícula es usada como un componente del nombre de familia.

### **Clases de Tamaño de Partícula Fuertemente Contrastantes**

Si la sección de control del tamaño de partícula consiste de dos o más partes con clases o sustitutos fuertemente contrastantes (listadas posteriormente) y si ambas partes tienen 12.5 cm o más de espesor (incluyendo las partes que no están en la sección de control) y si la zona de transición entre ellas es menor de 12.5 cm de espesor, se usan ambos nombres de las clases. Por ejemplo, si la clase de tamaño de partícula de la familia es arenosa sobre arcillosa, todos los siguientes criterios están satisfechos: el suelo cumple con el criterio D (listado posteriormente) debajo de la sección de control para el tamaño

de partícula o de sus sustitutos; cualquier horizonte Ap si es menor de 30 cm de espesor; el promedio ponderado de la clase de tamaño de partícula en los 30 cm superiores del suelo es arenosa; el promedio ponderado de la parte inferior es arcillosa; y la zona de transición es menor de 12.5 cm de espesor. Si el nombre de un sustituto se aplica a una o más partes de la sección de control del tamaño de partícula y las partes no son fuertemente contrastantes, el nombre de la parte más espesa (acumulativa) es el que se usa como nombre de la familia del suelo.

### **Clase Aniso**

Si la sección de control del tamaño de partícula incluye a más de una pareja de clases fuertemente contrastantes, listadas posteriormente, al suelo se le asigna una clase aniso nombrada por las clases adyacentes de la pareja que contrastan más fuertemente. La clase aniso es considerada como parte del nombre de la clase de tamaño de partícula y se indica entre comas después del nombre del tamaño de partícula. Un ejemplo es: arenosa sobre arcillosa, aniso, mezclada, activa, méxico Aridic Haplustoll.

### **Clases de Tamaño de Partícula Generalizadas**

Dos clases generalizadas de tamaño de partícula, francosa y arcillosa, son usadas para clases someras (definidas posteriormente) y para suelos con subgrupos Arenic, Grossarenic y Lithic. La clase arcillosa se usa para todas las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes con más de 35 por ciento de arcilla (30 por ciento en Vertisols). La clase de tamaño de partícula francosa, se usa para clases contrastantes, donde sea apropiado, para caracterizar a la parte inferior de la sección de control del tamaño de partícula. Las clases generalizadas, donde sea apropiado, son también usadas para todas las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes que incluyan a clases sustitutas. Por ejemplo, se usa francosa sobre pomácea o ceniza (y no francosa fina sobre pomácea o ceniza).

Seis clases generalizadas, definidas posteriormente en este capítulo, son empleadas para los subgrupos Terric de Histosols e Histels.

### **Sección de Control para las Clases de Tamaño de Partícula o de sus Sustitutos en Suelos Minerales**

Los nombres de las clases de tamaños de partícula y sustitutos listados posteriormente son aplicables a ciertos horizontes, o para los materiales de suelo dentro de límites específicos de profundidad, los cuales se han designado como la sección de control del tamaño de partícula. El límite inferior de la sección de control puede estar a una profundidad especificada (en centímetros) abajo de la superficie del suelo mineral o abajo del límite superior de una capa orgánica con propiedades ándicas o puede estar arriba del límite de una capa limitativa para las raíces. A menos que otra cosa se indique, en este capítulo las siguientes capas son consideradas como limitativas para raíces: duripán; fragipán; horizontes petrocálcicos, petrogypsicos o plácicos; orstein continuos; y contactos denses, líticos, paralíticos o petroféricos. La

siguiente lista de secciones de control del tamaño de partícula para las clases particulares de suelos minerales se presenta como una clave. Esta clave, como las otras en esta taxonomía, está diseñada en tal forma que el lector pueda clasificar correctamente yendo en forma sistemática a través de la clave, comenzando por el principio y eliminando una por una las clases que incluyan criterios que no satisfacen el suelo en cuestión. El suelo se ubica en la primera clase que satisfaga todos los criterios listados. El límite superior de un horizonte argílico, nátrico o kándico es usado en la siguiente clave. Este límite no siempre es obvio. Si uno de esos horizontes está presente pero el límite superior es irregular o quebrado, como en un horizonte A/B o B/A, la profundidad a la cual la mitad o más del volumen tiene la fábrica de un horizonte argílico, nátrico o kándico, deberá ser considerada como el límite superior.

#### **Clave para la Sección de Control de las Clases de Tamaño de Partícula o sus Sustitutos en Suelos Minerales**

A. Para suelos minerales que tienen una capa limitante para el desarrollo de raíces (listada anteriormente) dentro de los 36 cm de la superficie del suelo mineral o abajo del límite superior de materiales orgánicos de suelo con propiedades ándicas, cualquiera que este más somero: desde la superficie del suelo mineral o el límite superior de materiales orgánicos de suelo con propiedades ándicas cualquiera que este más somero, a la capa limitativa para las raíces; *o*

B. Para Andisols: entre, la superficie del suelo mineral o el límite superior de una capa orgánica con propiedades ándicas, cualquiera que esté más somera y la más superficial de las siguientes: (a) una profundidad de 100 cm abajo del punto de partida o (b) una capa limitante de las raíces; *o*

C. Para aquellos Alfisols, Ultisols y grandes grupos de Aridisols y Mollisols, excluyendo suelos en subgrupos Lamellic, que tienen un horizonte argílico, kándico o nátrico, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral y su límite inferior a una profundidad de 25 cm o más, o aquellos que están en un subgrupo Grossarenic o Arenic, usar de la 1 a la 4 siguientes; para otros suelos pase al punto D.

1. Clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes (definidas y listadas posteriormente) dentro o debajo de un horizonte argílico, nátrico o kándico y dentro de los 100 cm de la superficie del suelo mineral: los 50 cm superiores del horizonte argílico, nátrico o kándico o hasta una profundidad de 100 cm, cualquiera que este más profunda, pero no abajo del límite superior de la capa limitante de las raíces; *o*

2. Todas las partes de un horizonte argílico, nátrico o kándico dentro de o debajo de un fragipán: entre una profundidad de 25 cm de la superficie del suelo mineral y el límite superior del fragipán; *o*

3. Un fragipán a una profundidad de menos de 50 cm abajo del límite superior de un horizonte argílico, nátrico o kándico: entre el límite superior del horizonte argílico, kándico o nátrico y el límite superior del fragipán; *o*

4. Otros suelos que satisfacen el punto C anterior: ya sea todo el horizonte argílico, kándico o nátrico si tiene 50 cm o menos de espesor o los 50 cm superiores si es mayor de 50 cm su espesor.

D. Para aquellos Alfisols, Ultisols y grandes grupos de Aridisols y Mollisols, que están en subgrupos Lamellic o tienen un horizonte argílico, kándico o nátrico, que tiene su límite superior dentro de los 100 cm o más de la superficie del suelo mineral y que no están en un subgrupo Grossarenic o Arenic: entre el límite inferior de un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm de la superficie del suelo mineral, cualquiera que este más profundo, y 100 cm abajo de la superficie del suelo mineral o a la capa limitante a las raíces, cualquiera que sea más somera; *o*

E. Para otros suelos que tienen un horizonte argílico o nátrico que tiene su límite inferior a una profundidad de menos de 25 cm a partir de la superficie del suelo mineral: entre el límite superior del horizonte argílico o nátrico y una profundidad de 100 cm debajo de la superficie del suelo mineral o la capa limitante de las raíces, cualquiera que sea más somera; *o*

F. Todos los otros suelos minerales: entre el límite inferior de un horizonte Ap o una profundidad de 25 cm de la superficie del suelo mineral, cualquiera que este más profundo, y la más somera de las siguientes: (a) una profundidad de 100 cm debajo de la superficie del suelo mineral o (b) una capa limitante a las raíces.

#### **Clave para las Clases de Tamaño de Partícula y Sustitutos de Suelos Minerales**

Esta clave, como las otras en esta taxonomía, está diseñada de tal forma que el lector pueda clasificar correctamente yendo en forma sistemática a través de la clave, comenzando por el principio y eliminando una por una las clases que incluyan criterios que no satisfacen el suelo o la capa en cuestión. El nombre de la clase o sustituto para cada capa dentro de la sección de control deberán determinarse con la clave. Si dos capas cualesquiera reúnen los criterios para clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes (listadas posteriormente), el suelo es nombrado con esa clase fuertemente contrastante. Si más de un par reúnen los criterios de clases fuertemente contrastantes, el suelo es también una clase aniso nombrado por la pareja de clases adyacentes que contrastan más fuertemente. Si el suelo no tiene ninguna clase fuertemente contrastante, el promedio ponderado de los materiales del suelo dentro de la sección de control del tamaño de partícula determina generalmente la clase. Se tienen excepciones para suelos que no son fuertemente contrastantes y que tienen un nombre sustituto de clase para una o más partes de la sección de control. En estos suelos el nombre de la clase o sustituto más espeso (acumulativo) dentro de la sección de control, es el que se usa para determinar el nombre de la familia.

A. Suelos minerales que tienen, en la parte más espesa de la sección de control (si la sección de control no está en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes

listadas posteriormente), *o* en una parte de la sección de control que califica como un elemento en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes listadas posteriormente, *o* en toda la sección de control, un componente de tierra-fina (incluyendo poros medios y finos asociados) con menos de 10 por ciento del volumen total y que satisface uno de los siguientes grupos de criterios de una clase de sustitutos:

1. Tienen, en todo el suelo, más de 60 por ciento (por peso) de ceniza volcánica, ceniza, lapilli, pómez o fragmentos semejantes a pómez<sup>1</sup> y, en la fracción más gruesa de 2.0 mm, dos terceras partes o más (por volumen) de pómez o fragmentos semejantes a pómez.

**Pomácea**

*o*

2. Tienen, en todo el suelo, más de 60 por ciento (por peso) de ceniza volcánica, ceniza, lapilli, pómez o fragmentos semejantes a pómez y, en la fracción más gruesa de 2.0 mm, menos de dos terceras partes (por volumen) de pómez o fragmentos semejantes a pómez.

**Cindery**

*o*

3. Otros suelos minerales que tienen un componente de tierra-fina menor de 10 por ciento (incluyendo poros medios y finos asociados) del volumen total.

**Fragmental**

*o*

B. Otros suelos minerales que tienen un componente de tierra-fina de 10 por ciento o más (incluyendo poros medios y finos asociados) del volumen total y cumplen, en la parte más espesa de la sección de control (si la sección de control no está en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes listadas posteriormente), *o* en una parte de la sección de control que califica como un elemento en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes listadas posteriormente, *o* en toda la sección de control, uno de los siguientes grupos de criterios de una clase de sustitutos:

1. Ellos:
  - a. Tiene propiedades ándicas y tienen un contenido de agua a una tensión de 1500 kPa de menos de 30 por ciento en muestras no secadas y menos de 12 por ciento en muestras secadas; *o*
  - b. No tienen propiedades ándicas, tienen 30 por ciento o más de fracción de tierra-fina en la fracción de 0.02 a 2.0 mm, y tienen un contenido de vidrio volcánico (por conteo de granos) de 30 por ciento o más en la fracción de 0.02 a 2.0 mm; y
  - c. Tienen una de las siguientes:

<sup>1</sup>Semejante a Pómez: materiales piroclásticos vesiculares diferentes de pómez que tienen una gravedad específica aparente (incluyendo vesículas) de menos de 1.0 g/cm<sup>3</sup>.

- (1) Un total de 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca o de para-roca, de los cuales dos terceras partes o más (por volumen) es pómez o fragmentos semejantes a pómez.

**Pomácea-Ceniza**

*o*

- (2) 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca.

**Esquelética-Ceniza**

*o*

- (3) Menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca.

**Ceniza**

*o*

2. Tienen una fracción de tierra-fina que presenta propiedades ándicas y tiene un contenido de agua a una tensión de 1500 kPa de menos de 100 por ciento en muestras no secadas; y

- a. Tienen un total de 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de rocas y para-rocas, de los cuales dos terceras partes o más (por volumen) es pómez o fragmentos semejantes a pómez.

**Pomácea-Media**

*o*

- b. 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca.

**Esquelética-Media**

*o*

- c. Menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca.

**Media**

*o*

3. Tienen una fracción de tierra-fina que presentan propiedades ándicas y tiene un contenido de agua a una tensión de 1500 kPa de 100 por ciento o más en muestras no secadas; y

- a. Tienen un total de 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de rocas y para-rocas, de los cuales dos terceras partes o más (por volumen) es pómez o fragmentos semejantes a pómez.

**Pomácea-Hídrica**

*o*

- b. 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca.

**Esquelética-Hídrica**

*o*

- c. Menos de 35 por ciento (por volumen) de fragmentos de roca.

**Hídrica**

*o*

*Nota:* En las siguientes clases, “arcilla” excluye a carbonatos del tamaño de arcilla. Los carbonatos del tamaño de arcilla son tratados como limos. Si la relación entre el porcentaje de agua a una tensión de 1500 kPa y el porcentaje de arcilla medida, es de 0.25 o menos o 0.6 o más en la mitad o más de la sección de control de tamaño de partícula o en parte de la sección de control del tamaño de partícula en clases fuertemente contrastantes, entonces el porcentaje de arcilla se estima por la siguiente fórmula: %Arcilla = 2.5(% agua retenida a 1500 kPa - % carbono orgánico).

C. Otros suelos minerales que, en la parte más espesa de la sección de control (si parte de la sección de control tiene un sustituto para una clase de tamaño de partícula y no está en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes listadas posteriormente), o en una parte de la sección de control que califica como un elemento en una de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes listadas posteriormente, o en toda la sección de control, cumple uno de los siguientes grupos de criterios de una clase de tamaño de partícula:

1. Tienen 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca o para-roca y una fracción de tierra-fina con una textura arenosa o arena francosa, incluyendo menos de 50 por ciento (por peso) de arena muy fina.

**Esquelética-Arenosa**

o

2. Tienen 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca y menos de 35 por ciento (por peso) de arcilla.

**Esquelética-Francosa**

o

3. Tiene 35 por ciento o más (por volumen) de fragmentos de roca.

**Esquelética-Arcillosa**

o

4. Tienen una textura arenosa o arena francosa, incluyendo menos de 50 por ciento (por peso) de arena muy fina.

**Arenosa**

o

5. Tienen una textura de arena francosa muy fina, arena muy fina o más fina, incluyendo menos de 35 por ciento de arcilla (por peso) en la fracción de tierra-fina (excluyendo Vertisols), y están en una familia somera (definida posteriormente) o en un subgrupo Lithic, Arenic o Grossarenic, o la capa es un elemento en una clase de tamaño de partícula fuertemente contrastante (definidas posteriormente) y la capa es el elemento inferior o el otro elemento es un sustituto de una clase de tamaño de partícula.

**Francosa**

o

6. Tienen, en la fracción menor de 75 mm de diámetro, 15 por ciento o mas (por peso) de partículas con diámetros de 0.1 a 75 mm (arena fina o mas gruesa, incluyendo fragmentos de roca con diámetros mayores a 7.5 cm) y en la fracción de tierra-fina, menos de 18 por ciento de arcilla (por peso).

**Francosa-Gruesa**

o

7. Tienen, en la fracción menor de 75 mm de diámetro, 15 por ciento o mas (por peso) de partículas con diámetros de 0.1 a 75 mm (arena fina o mas gruesa, incluyendo fragmentos de roca con diámetros mayores de 7.5 cm) y en la fracción de tierra-fina, de 18 a 35 por ciento de arcilla (por peso) (los Vertisols están excluidos).

**Francosa-Fina**

o

8. Tienen, en la fracción menor de 75 mm de diámetro, menos de 15 por ciento (por peso) de partículas con diámetros de 0.1 a 75 mm (arena fina o mas gruesa, incluyendo fragmentos de roca con diámetros mayores de 7.5 cm) y en la fracción de tierra-fina, menos de 18 por ciento de arcilla (por peso).

**Limosa-Gruesa**

o

9. Tienen, en la fracción menor de 75 mm de diámetro, menos de 15 por ciento (por peso) de partículas con diámetros de 0.1 a 75 mm (arena fina o mas gruesa, incluyendo fragmentos de roca con diámetros mayores de 7.5 cm) y en la fracción de tierra-fina, de 18 a 35 por ciento de arcilla (por peso) (los Vertisols están excluidos).

**Limosa-Fina**

o

10. Tienen 35 por ciento o mas de arcilla (por peso) (mas de 30 por ciento en Vertisols) y están en una familia somera (definida posteriormente) o en un subgrupo Lithic, Arenic o Grossarenic, o la capa es un elemento de una clase de tamaño de partícula fuertemente contrastante (listadas mas adelante).

**Arcillosa**

o

11. Tienen (por promedio ponderado) menos de 60 por ciento (por peso) de arcilla en la fracción de tierra-fina.

**Fina**

o

12. Tienen 60 por ciento o más de arcilla.

**Muy-Fina**

### Clases de Tamaño de Partícula Fuertemente Contrastantes

El propósito de las clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes es el identificar cambios en la distribución y composición del tamaño de poros que no están definidos en las categorías más altas de suelos y que afectan seriamente el movimiento y la retención de agua y/o nutrimentos.

Las siguientes clases de tamaño de partícula y de sustitutos son considerados fuertemente contrastantes si ambas partes tienen 12.5 cm o más de espesor (incluyendo las partes que no están en la sección de control; sin embargo, los nombres de clases de sustitutos son usados sólo si los materiales de suelos en los que se aplican se extienden 10 cm o más dentro de la parte superior de la sección de control) y si la zona de transición entre las dos partes de la sección de control del tamaño de partícula es menor de 12.5 cm de espesor.

Algunas clases, tales como arenosa y esquelética-arenosa, han sido combinadas en la siguiente lista. En esos casos, el nombre combinado se usa como la clase de familia si parte de la sección de control cumple con los criterios para una u otra clase.

1. Ceniza sobre arcillosa
2. Ceniza sobre esquelética-arcillosa
3. Ceniza sobre esquelética-francosa
4. Ceniza sobre francosa
5. Ceniza sobre esquelética-media
6. Ceniza sobre Media (si el contenido de agua a una tensión de 1500 kPa en muestras secas de la fracción de tierra-fina es 10 por ciento o menos para los materiales de ceniza y 15 por ciento o más para los materiales de la clase media)
7. Ceniza sobre pomácea o cindery
8. Ceniza sobre arenosa o esquelética-arenosa
9. Esquelética-ceniza sobre fragmental o cindery (si el volumen de la fracción de tierra-fina es 35 por ciento o más [absoluto] de la parte esquelética-ceniza que de la parte fragmental o cindery)
10. Esquelética-ceniza sobre esquelética-francosa
  - 1.1 Esquelética-ceniza sobre arenosa o esquelética-arenosa
12. Cindery sobre francosa
13. Cindery sobre esquelética-media
14. Cindery sobre media
15. Arcillosa sobre fragmental
16. Arcillosa sobre francosa (sí existe una diferencia absoluta de 25 por ciento o más entre los porcentajes de arcilla en la fracción de tierra-fina de las dos partes de la sección de control)
17. Arcillosa sobre esquelética-francosa (si existe una diferencia absoluta de 25 por ciento o más entre los porcentajes de arcilla en la fracción de tierra-fina de las dos partes de la sección de control)
18. Arcillosa sobre arenosa o esquelética-arenosa
19. Esquelética-arcillosa sobre arenosa o esquelética-arenosa
20. Francosa-gruesa sobre arcillosa
21. Francosa-gruesa sobre fragmental
22. Francosa-gruesa sobre arenosa o esquelética-arenosa (si el material de la clase francosa-gruesa contiene menos de 50 por ciento de arena fina o más gruesa)
23. Limosa-gruesa sobre arcillosa
24. Limosa-gruesa sobre arenosa o esquelética-arenosa
25. Francosa-fina sobre arcillosa (si existe una diferencia absoluta de 25 por ciento o más entre los porcentajes de arcilla de la fracción de tierra-fina de las dos partes en la sección de control)
26. Francosa-fina sobre fragmental
27. Francosa-fina sobre arenosa o esquelética-arenosa
28. Limosa-fina sobre arcillosa (si existe una diferencia absoluta de 25 por ciento o más entre los porcentajes de arcilla de la fracción de tierra-fina de las dos partes en la sección de control)
29. Limosa-fina sobre fragmental
30. Limosa-fina sobre arenosa o esquelética-arenosa
31. Hídrica sobre esquelética-arcillosa
32. Hídrica sobre arcillosa
33. Hídrica sobre fragmental
34. Hídrica sobre esquelética-francosa
35. Hídrica sobre francosa
36. Hídrica sobre arenosa o esquelética-arenosa
37. Francosa sobre ceniza o esquelética-ceniza
38. Francosa sobre arenosa o esquelética-arenosa (si el material de la clase francosa contiene menos de 50 por ciento de arena fina o arena más gruesa)
39. Francosa sobre pomácea o cindery
40. Esquelética-francosa sobre cindery (si el volumen de la fracción de tierra-fina es 35 por ciento o más [absoluto] alto en la parte esquelética-francosa que en la parte cindery)
41. Esquelética-francosa sobre arcillosa (si existe una diferencia absoluta de 25 por ciento o más entre los porcentajes de arcilla de la fracción de tierra-fina de las dos partes en la sección de control)

42. Esquelética-francosa sobre fragmental (si el volumen de la fracción de tierra-fina es 35 por ciento o más [absoluto] alto en la parte esquelética-francosa que en la parte fragmental)
43. Esquelética-francosa sobre arenosa o esquelética –arenosa (si el material de la clase francosa contiene menos de 50 por ciento de arena fina o arena más gruesa)
44. Media sobre ceniza (si el contenido de agua a una tensión de 1500 kPa en muestras secas de la fracción de tierra-fina es 15 por ciento o más para los materiales de la clase media y 10 por ciento o menos para los materiales de ceniza)
45. Media sobre ceniza-pomácea-ceniza o esquelética-ceniza (si el contenido de agua a una tensión de 1500 kPa en muestras secas de la fracción de tierra-fina es 15 por ciento o más para los materiales de la clase media y 10 por ciento o menos para la parte de ceniza)
46. Media sobre esquelética-arcillosa
47. Media sobre arcillosa
48. Media sobre fragmental
49. Media sobre Hídrica (si el contenido de agua a una tensión de 1500 kPa en muestra no secadas de la fracción de tierra-fina es 75 por ciento o menos para los materiales medios)
50. Media sobre esquelética-francosa
51. Media sobre francosa
52. Media sobre pomácea o cindery
53. Media sobre arenosa o esquelética-arenosa
54. Esquelética-media sobre fragmental o cindery (si el volumen de la fracción de tierra-fina es 35 por ciento o más [absoluto] alto en la parte esquelética-media que en la parte fragmental o cindery)
55. Esquelética-media sobre esquelética-francosa
56. Esquelética-media sobre arenosa o esquelética-arenosa
57. Pomáceo o pomáceo-ceniza sobre francosa
58. Pomáceo o pomáceo-ceniza sobre esquelética-francosa
59. Pomáceo o pomáceo-ceniza sobre esquelética-media
60. Pomáceo o pomáceo-ceniza sobre media
61. Pomáceo o pomáceo-ceniza sobre arenosa o esquelética-arenosa
62. Arenosa sobre arcillosa
63. Arenosa sobre francosa (si el material de la clase francosa contiene menos de 50 por ciento de arena fina o arena más gruesa)
64. Esquelética-arenosa sobre francosa (si el material de la clase francosa contiene menos de 50 por ciento de arena fina o arena más gruesa)

## Clases de Mineralogía

La mineralogía de suelos se conoce que es útil al hacer predicciones del comportamiento de los mismos suelos y sus respuestas al manejo. Algunas clases mineralógicas ocurren o son de cierta importancia sólo en algunas taxa o clases de tamaño de partícula, y otras son importantes en todas las clases de tamaño de partícula. Las siguientes claves para las clases de mineralogía están diseñadas para hacer tales distinciones.

### Sección de Control para Clases de Mineralogía

La sección de control para las clases de mineralogía es la misma que la definida para las clases de tamaño de partícula y sus sustitutos.

### Clave para las Clases de Mineralogía

Esta clave, como las otras en esta taxonomía, está diseñada de tal manera que el lector pueda clasificar correctamente yendo en forma sistemática a través de la clave, comenzando por el principio y eliminando una por una las clases que incluyan criterios que no satisface el suelo en cuestión. El suelo pertenece a la primera clase que satisfaga todos los criterios requeridos. El usuario deberá primero revisar los criterios de la sección A y, si el suelo en cuestión no cumple con los criterios ahí listados, entonces se pasa a la secciones B, C, D y E: hasta que el suelo cumpla con los criterios establecidos. Todos los criterios están basados en promedios ponderados.

Para suelos con clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes, se da la mineralogía para ambos nombres de las clases de tamaño de partícula o de sus sustitutos, a menos que se trate de la misma. Ejemplos son: ceniza sobre arcillosa, mezclada (si ambas partes, ceniza y arcilla están mezcladas), superactiva, méxico Typic Vitraquand y arcillosa sobre arenosa o esquelética-arenosa, esmectítica sobre mezclada, térmico Vertic Haplustept.

A. Oxisols y grandes grupos “kandi” y “kanhap” de Alfisols y Ultisols que en la sección de control de mineralogía tienen:

1. Más de 40 por ciento (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (más de 28 por ciento de Fe), por ditionito citrato, en la fracción de tierra-fina.

**Ferrítica**

o

2. Más de 40 por ciento (por peso) de gibbsita en la fracción de tierra-fina.

**Gibbsítica**

o

3. Ambas:

- a. De 18 a 40 por ciento (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (de 12.6 a 28 por ciento de Fe), por ditionito citrato, en la fracción de tierra-fina; y

b. De 18 a 40 por ciento (por peso) de gibbsita en la fracción de tierra-fina.

**Sésquica**

o

4. De 18 a 40 por ciento (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (de 12.6 a 28 por ciento de Fe), por ditionito citrato, en la fracción de tierra-fina.

**Ferruginosa**

o

5. De 18 a 40 por ciento (por peso) de gibbsita en la fracción de tierra-fina.

**Alítica**

o

6. Más de 50 por ciento (por peso) de kaolinita más haloisita, dickita, nacrita, y otros minerales 1:1 o 2:1 no expandibles y gibbsita y menos de 10 por ciento (por peso) de esmectita en la fracción de un tamaño menor de 0.002 mm; y más kaolinita que haloisita.

**Kaolinitica**

o

7. Más de 50 por ciento (por peso) de haloisita más kaolinita y alofano y menos de 10 por ciento (por peso) de esmectita en la fracción de un tamaño menor de 0.002 mm.

**Haloisítica**

o

8. Las otras propiedades en esta categoría.

**Mezclada**

o

B. Otros horizontes o capas de suelo, en la sección de control de mineralogía, que tienen una clase sustituta que reemplaza a una clase de tamaño de partícula, diferente a la fragmental, y que:

1. Tiene una suma de 8 veces el Si (porcentaje por peso, extraído por oxalato de amonio de la fracción de tierra-fina) más 2 veces el Fe (porcentaje por peso, extraído por oxalato de amonio de la fracción de tierra-fina) de 5 o más, y 8 veces el Si, si es mayor de 2 veces el Fe.

**Amórfica**

o

2. Otros suelos que tiene una suma de 8 veces el Si (porcentaje por peso, extraído por oxalato de amonio de la fracción de tierra-fina) más 2 veces el Fe (porcentaje por peso, extraído por oxalato de amonio de la fracción de tierra-fina) de 5 o más.

**Ferrihidrítica**

o

3. Otros suelos que tienen 30 por ciento o más (por conteo de granos) de vidrio volcánico en la fracción de 0.02 a 2.0 mm.

**Vítrea**

o

4. Todos los otros suelos que tienen una clase sustituta.

**Mezclada**

o

C. Otros horizontes o capas de suelo, en la sección de control de la mineralogía, en los otros órdenes de suelos y en subgrupos Terric de Histosols e Histels que tienen:

1. Cualquier clase de tamaño de partícula y más de 40 por ciento (por peso) de carbonatos (expresados como  $\text{CaCO}_3$ ) mas yeso, con el yeso constituyendo más de 35 por ciento del peso total de los carbonatos mas yeso, ya sea en la fracción de tierra-fina o en la fracción de un tamaño menor de 20 mm, cualquiera que tenga el mayor porcentaje de carbonatos mas yeso.

**Gypsica**

o

2. Cualquier clase de tamaño de partícula y más de 40 por ciento (por peso) de carbonatos (expresados como  $\text{CaCO}_3$ ) mas yeso, ya sea en la fracción de tierra-fina o en la fracción de un tamaño menor de 20 mm, cualquiera que tenga el mayor porcentaje de carbonatos mas yeso.

**Carbonática**

o

3. Cualquier clase de tamaño de partícula, excepto la fragmental, y más de 40 por ciento (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (más de 28 por ciento de Fe), extractable por ditionito citrato, en la fracción de tierra-fina.

**Ferrítica**

o

4. Cualquier clase de tamaño de partícula, excepto la fragmental, y más de 40 por ciento (por peso) de gibbsita y bohemita, en la fracción de tierra-fina.

**Gibbsítica**

o

5. Cualquier clase de tamaño de partícula, excepto la fragmental, y más de 40 por ciento (por peso) de minerales silicatos de magnesio, tales como minerales de la serpentina (antigorita, crisotilo, y lizardita) mas talco, olivinos, piroxenos ricos en Mg, y anfíboles ricos en Mg, en la fracción de tierra-fina.

**Magnésica**

o

6. Cualquier clase de tamaño de partícula, excepto la fragmental, y más de 20 por ciento (por peso) de perdigones de glauconita, en la fracción de tierra-fina.

**Glauconítica**

o

D. Otros horizontes o capas de suelo, en la sección de control de la mineralogía, en los otros órdenes de suelos y en subgrupos Terric de Histosols e Histels, en una clase de tamaño de partícula arcillosa, esquelética-arcillosa, fina o muy fina que:

1. En la fracción de tierra-fina, tienen un porcentaje total (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (por ciento de Fe, por ditionito citrato, por 1.43) más el porcentaje (por peso) de gibbsita de más de 10.

**Parasésquica**

o

2. En la fracción de un tamaño menor de 0.002 mm:

a. Tienen más de 50 por ciento (por peso) de haloisita más kaolinita y alofano y más haloisita que cualquier otro mineral.

**Haloisítica**

o

b. Tienen más de 50 por ciento (por peso) de kaolinita más haloisita, dickita, nacrita, y otros minerales 1:1 o 2:1 no expandibles y gibbsita y menos de 10 por ciento (por peso) de esmectita.

**Kaolinitica**

o

c. Tienen más esmectita (montmorillonita, beidelita y nontronita), por peso, que cualquier otro tipo particular de mineral arcilloso.

**Esmectítica**

o

d. Tienen más de 50 por ciento (por peso) de illita (mica hidratada) y comúnmente más de 4 por ciento de  $\text{K}_2\text{O}$ .

**Illítica**

o

e. Tienen más vermiculita que cualquier otro tipo particular de mineral arcilloso.

**Vermiculítica**

o

f. En más de 50 por ciento del espesor, cumple todos los siguientes:

- (1) No tienen carbonatos libres; y
- (2) El pH de una suspensión de 1 g de suelo en 50 ml de NaF 1M es mayor de 8.4 después de 2 minutos; y
- (3) La relación de agua a 1500 kPa a arcilla medida es de 0.6 o más.

**Isótica**

o

g. Todos los otros suelos en esta categoría.

**Mezclada**

o

E. Todos los otros horizontes y capas de suelos minerales, en la sección de control de mineralogía que tienen:

1. Más de 40 por ciento (por peso) (70 por ciento por conteo de granos) de mica y pseudomorfos de mica estables en la fracción de 0.02 a 0.25 mm.

**Micácea**

o

2. Más de 25 por ciento (por peso) (45 por ciento por conteo de granos) de mica y pseudomorfos de mica estables en la fracción de 0.02 a 0.25 mm.

**Paramicácea**

o

3. Un porcentaje total (por peso) de óxido de hierro como  $\text{Fe}_2\text{O}_3$  (por ciento de Fe, por ditionito citrato, por 1.43) más el porcentaje (por peso) de gibbsita de más de 10 en la fracción de tierra-fina.

**Parasésquica**

o

4. En más de la mitad del espesor, cumple todos los siguientes:

- a. No tienen carbonatos libres; y
- b. El pH de una suspensión de 1 g de suelo en 50 ml de NaF 1M es mayor de 8.4 después de 2 minutos; y
- c. La relación de agua a 1500 kPa a arcilla medida es de 0.6 o más.

**Isótica**

o

5. Mas de 90 por ciento (por peso o conteo de granos) minerales silicios (cuarzo, calcedonia u ópalo) y otros minerales resistentes en la fracción de 0.02 a 2.0 mm.

**Silíceas**

o

6. Todas las otras propiedades,

**Mezclada**

**Clases de Actividad de Intercambio Catiónico**

Las clases de actividad de intercambio catiónico ayudan al hacer interpretaciones de los ensambles mineralógicos y de la capacidad de retención de nutrimentos en los suelos de las clases mineralógicas mezcladas y silíceas para las clases de tamaño de partícula arcillosa, esquelética-arcillosa, francosa-gruesa, limosa-gruesa, fina, francosa-fina, limosa-fina, francosa, esquelética-francosa, y muy fina. Las clases de actividad de intercambio catiónico no están asignadas para Histosols e Histels y tampoco están estipuladas para Oxisols y grandes grupos y subgrupos "kandi" y "kanhap" de Alfisols y Ultisols, debido a que el establecimiento de tales clases resultaría redundante. Las clases de actividad de intercambio catiónico no están dadas para las clases de tamaño de partícula arenosa, esquelética-arenosa y fragmental porque su bajo contenido de arcilla genera clases de actividad de intercambio catiónico que son menos útiles y menos realistas.

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se determina por  $\text{NH}_4\text{OAc}$  a pH 7 en la fracción de tierra-fina. La CIC de la materia orgánica, arena, limo y arcilla está incluida en la determinación. Los criterios para las clases usan relaciones de la CIC con el porcentaje, por peso, de la arcilla silicatada como el promedio ponderado en la sección de control. En las siguientes clases, “arcilla” excluye a carbonatos del tamaño de la arcilla. Si la relación entre el porcentaje de agua retenida a una tensión de 1500 kPa con el porcentaje de arcilla medida es de 0.25 o menos o 0.6 o más en la mitad o más de la sección de control de tamaño de partícula (o parte en clases fuertemente contrastantes), entonces el porcentaje de arcilla se estima con la siguiente fórmula:  $\% \text{Arcilla} = 2.5(\% \text{ agua retenida a 1500 kPa} - \% \text{ carbono orgánico})$ .

### Sección de Control para las Clases de Actividad de Intercambio Catiónico

La sección de control para las clases de actividad de intercambio catiónico son las mismas que para determinar las clases de tamaño de partícula y las clases mineralógicas. Para suelos con clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes, donde ambas partes son nombradas en la sección de control, para la clase de actividad de intercambio catiónico, se nombra la clase de tamaño de partícula asociada a la que tiene la mayor cantidad de arcilla. Por ejemplo, en un pedón con una clasificación de francosa sobre arcillosa, mezclada, activa, calcárea, térmico, Typic Udorthent, la clase de actividad de intercambio catiónico “activa” esta asociada con la parte arcillosa de la sección de control.

### Clave para las Clases de Actividad de Intercambio Catiónico

A. Son suelos que no son Histosols, Histels, u Oxisols, que no tienen grandes grupos o subgrupos “kandi” o “kanhap” de Alfisols o Ultisols, que están en la clase mineralógica mezclada o silícea y no están en la clase de tamaño de partícula fragmental, arenosa o esquelética-arenosa o en ningún sustituto para esas clases de tamaño de partícula y tiene una relación de capacidad de intercambio catiónico (por  $\text{NH}_4\text{OAc}$  a pH 7) a arcilla (por ciento por peso) de:

1. 0.60 o mas.

**Superactiva**

2. 0.40 a 0.60

**Activa**

3. 0.24 a 0.40

**Semiactiva**

4. Menos de 0.24

**Subactiva**

o

B. Todos los otros suelos: Las clases de actividad de intercambio catiónico no se usan.

### Clases de Reacción y Calcáreas de Suelos Minerales

La presencia o ausencia de carbonatos, reacción del suelo, y la presencia de altas concentraciones de aluminio en suelos minerales son tratadas juntas porque están íntimamente relacionadas. Existen cuatro clases – calcárea, ácida, no ácida y álica, las cuales se definen posteriormente, en la clave de clases de reacción y calcáreas. Las clases no son usadas en todos los taxa ni en más de un suelo en el mismo taxa.

### Uso de las Clases de Reacción y Calcáreas

Las clases calcárea, ácida y no ácida son usadas en los nombres de las familias de Entisols, Aquands, y Aquepts, excepciones donde no se usan son las siguientes:

1. Duraquands y Placaquands
2. Sulfaquepts, Fragiaquepts y Petraquepts
3. Familias arenosas, esqueléticas-arenosas, cindery, pomácea o fragmental.
4. Familias con mineralogía carbonática o gypsica.

La clase calcárea, en adición a las mencionadas anteriormente, es usada en los nombres de las familias de Aquolls, excepciones donde no se usan son las siguientes:

1. Calciaquolls, Natraquolls y Argiaquolls
2. Cryaquolls y Duraquolls que tienen un horizonte argílico
3. Familias con mineralogía carbonática y gypsica.

La clase álica es usada solamente con las familias de los Oxisols.

### Sección de Control de las Clases de Reacción y Calcáreas

La sección de control de las clases calcáreas es una de las siguientes:

1. Suelos con una capa limitante a las raíces que está a 25 cm o menos debajo de la superficie del suelo mineral: Una capa de 2.5 cm de espesor directamente encima de la capa limitante a las raíces.
2. Suelos con una capa limitante a las raíces que está de 26 a 50 cm debajo de la superficie del suelo mineral: La capa entre la profundidad de 25 cm debajo de la superficie del suelo mineral y la capa limitante a las raíces.
3. Todos los otros suelos listados: Entre una profundidad de 25 a 50 cm debajo de la superficie del suelo mineral.

La sección de control para las clases ácida, no ácida y álica es la misma que para las clases de tamaño de partícula.

### Clave para las Clases de Reacción y Calcáreas

A. Oxisols que tienen una capa, de 30 cm o más de espesor dentro de la sección de control, que contiene Al-extractable

con KCl en más de 2 cmol(+)/kg de suelo en la fracción de tierra-fina.

#### Álica

B. Otros suelos listados que, en la fracción de tierra-fina, efervescen (en HCl diluido y frío) en todas partes de la sección de control.

#### Calcárea

C. Otros suelos listados con un pH menor de 5.0 en CaCl<sub>2</sub> 0.01 M (1:2) (pH cerca de 5.5 en H<sub>2</sub>O, 1:1) a través de la sección de control.

#### Ácida

D. Otros suelos listados con un pH de 5.0 o más en CaCl<sub>2</sub> 0.01 M (1:2) en alguna o todas las capas de la sección de control.

#### No Ácida

Se deberá hacer notar que un suelo que contiene dolomita es calcáreo y que la efervescencia de la dolomita, cuando es tratado con HCl diluido y frío, es lenta.

Las clases calcárea, ácida, no ácida y álica son listadas en el nombre de la familia cuando sea apropiado, siguiendo las clases de mineralogía y de actividad de intercambio catiónico.

### Clases de Temperatura del Suelo

Las clases de temperatura, como se nombran y definen aquí, son usadas como parte del nombre de familia tanto en suelos minerales como en orgánicos. Los nombres de las clases de temperatura se usan como parte del nombre de familia, a menos que el criterio para un taxon de categorías más altas tenga la misma limitación. Así, frígido está implícito en todos los subórdenes, grandes grupos y subgrupos cryic y sería redundante su uso en los nombres de estas clases.

La escala Celsius (centígrados) es la estándar. Se asume que la temperatura de un suelo es cuando no está siendo irrigado.

#### Sección de Control para la Temperatura del Suelo

La sección de control para la temperatura del suelo está a una profundidad que puede ser 50 cm debajo de la superficie del suelo o está en el límite superior de una capa restrictiva al desarrollo de raíces, cualquiera que sea más somera. Las clases de temperatura del suelo, definidas en términos de la temperatura media anual del suelo y de la diferencia entre las temperaturas medias del verano y del invierno, están determinadas por la siguiente clave.

#### Clave para las Clases de Temperatura del Suelo

A. Gelisols y subórdenes y grandes grupos Gelic que tienen una temperatura media anual del suelo como sigue:

1. -10 °C o más baja

#### Hipergélica

o

2. -4 °C a -10 °C.

#### Pergélica

o

3. +1 °C a -4 °C.

#### Subgélica

o

B. Otros suelos que tienen una diferencia en la temperatura del suelo de 6 °C o más entre la media del verano (Junio, Julio y Agosto en el Hemisferio Norte) y la media del invierno (Diciembre, Enero y Febrero en el Hemisferio Norte) y una temperatura media anual del suelo de:

1. Menor de 8 °C (47 °F).

#### Frígida

o

2. 8 °C (47 °F) a 15 °C (59 °F).

#### Mésica

o

3. 15 °C (59 °F) a 22 °C (72 °F).

#### Térmica

o

4. 22 °C (72 °F) o más alta.

#### Hipertérmica

o

C. Todos los otros suelos que tienen una temperatura media anual del suelo como sigue:

1. Menor de 8 °C (47 °F).

#### Isofrígida

o

2. 8 °C (47 °F) a 15 °C (59 °F).

#### Isomésica

o

3. 15 °C (59 °F) a 22 °C (72 °F).

#### Isotérmica

o

4. 22 °C (72 °F) o más alta.

#### Isohipertérmica

### Clases de Profundidad del Suelo

Las clases de profundidad del suelo son usadas en todas las familias que tienen una capa limitante a las raíces a una profundidad específica a partir de la superficie del suelo mineral, excepto para aquellas familias en los subgrupos Lithic y aquellas con un fragipán. Las capas limitantes a las raíces, incluidas en las clases de profundidad del suelo son: duripanes; horizontes petrocálcicos, petrogypsicos y plácicos; orstein continuos (90 por ciento o más); y contactos denses, líticos, paralíticos y petroféricos. Las clases de profundidad del suelo para Histosols e Histels están dadas posteriormente en este capítulo. Un suelo con un nombre de clase de profundidad "somera", se usa para caracterizar a ciertas familias de suelos minerales que tienen una de las profundidades indicadas en la siguiente clave.

### Clave para Clases de Profundidad del Suelo

A. Oxisols que tienen menos de 100 cm de profundidad (a partir de la superficie del suelo) a la capa limitativa para raíces y no tiene un subgrupo Lithic.

**Somera**

o

B. Suelos en todos los otros ordenes de suelos minerales que tienen menos de 50 cm de profundidad (a partir de la superficie del suelo) a la capa limitativa para raíces y no tiene un subgrupo Lithic.

**Somera**

o

C. Todos los otros suelos minerales: no usan clases de profundidad del suelo.

### Clases de Resistencia a la Ruptura

En esta taxonomía, algunos materiales de suelo parcialmente cementados, tales como los durinoides, sirven como una característica diferenciadora en categorías por arriba del nivel de familia; mientras que otros, como los materiales espódicos parcialmente cementados (orstein), no. Sin embargo, ninguna familia incluye horizontes con o sin una cementación parcial. En Spodosols, un horizonte espódico parcialmente cementado se usa como diferenciador de familias. La siguiente clase de resistencia a la ruptura está definida para familias de Spodosols:

A. Spodosols que tienen un horizonte orstein.

**Orstein**

o

B. Todos los otros suelos: no usan clases de resistencia a la ruptura.

### Clases de Recubrimientos (sobre Arenas)

A pesar del énfasis dado a las clases de tamaño de partícula en la taxonomía, la variabilidad permanece en la clase de tamaño de partícula arenosa, la cual incluye arenas y arenas francosas. Algunas arenas están muy limpias, esto es, casi completamente libres de limos y arcillas; mientras que otras están mezcladas con cantidades apreciables de granos finos. La arcilla es más eficiente para recubrir arenas que a limos. Un promedio ponderado de limo (por peso) más 2 veces el promedio ponderado de arcilla (por peso) de más de 5 hace una división razonable de las arenas a nivel de familia. Dos clases de Quartzipsamments están definidas en términos de su contenido de limo más 2 veces su contenido de arcilla.

### Sección de Control para Clases de Recubrimientos

La sección de control para clases de recubrimientos es la misma que para las clases de tamaño de partícula y sus sustitutos y para la de las clases de mineralogía.

### Clave para Clases de Recubrimientos

A. Quartzipsamments que tienen una suma del promedio ponderado de limo (por peso) mas 2 veces el promedio ponderado de arcilla de más de 5.

**Recubierta**

o

B. Otros Quartzipsamments.

**No Recubierta**

### Clases de Grietas Permanentes

Algunos Hydraquents consolidados o contraídos después de drenarlos se vuelven Fluvaquents o Humaquepts. En el proceso pueden formar poliedros aproximados de 12 a 50 cm de diámetro, dependiendo de su valor de  $n$  y textura. Estos poliedros están separados por grietas que varían en anchura desde 2 mm a más de 1 cm. Los poliedros pueden expandirse o contraerse con los cambios en el contenido de humedad de los suelos, pero las grietas son permanentes y pueden persistir por varios cientos de años, aún si los suelos están cultivados. Las grietas permiten el rápido movimiento del agua a través del suelo, ya sea en forma vertical u horizontal. Tales suelos pueden tener la misma textura, mineralogía y otras propiedades de familias de suelos que no forman grietas o que tienen grietas que se abren y cierran con las estaciones. Los suelos con grietas permanentes son muy raros en los Estados Unidos.

### Sección de Control para las Clases de Grietas Permanentes

La sección de control para las clases de grietas permanentes es de la base de cualquier capa arable o los 25 cm desde la superficie del suelo, cualquiera que sea más profunda, hasta los 100 cm debajo de la superficie del suelo.

### Clave para las Clases de Grietas Permanentes

A. Fluvaquents o Humaquepts que tienen, a través de una capa de 50 cm o más de espesor, grietas continuas, permanentes, laterales y verticales de 2 mm o más de anchura, espaciadas a intervalos laterales promedio de menos de 50 cm.

**Agrietada**

o

B. Todos los otros Fluvaquents y Humaquepts: no usan a las clases de grietas permanentes.

### Diferenciación de Familias de Histosols e Histels

La mayoría de las diferenciaciones que se usan para distinguir a familias de Histosols e Histels ya han sido definidas, ya sea porque se han usado tanto para la diferenciación de suelos minerales como para los Histosols e Histels o porque sus definiciones se usaron en la clasificación de algunos Histosols e Histels en categorías superiores al nivel de familia. En las siguientes descripciones, las diferenciaciones no mencionadas con anterioridad son definidas y las clases donde se usan son indicadas.

El orden en el cual las clases de familias, si es apropiada para una familia en particular, son localizadas en los nombres técnicos de las familias de Histosols e Histels es como sigue:

Clases de tamaño de partícula

Clases de mineralogía, incluyendo la naturaleza de los depósitos límnicos en Histosols

Clases de reacción

Clases de temperatura del suelo

Clases de profundidad del suelo (se usan solamente en Histosols)

### Clase de Tamaño de Partícula

Las clases de tamaño de partícula se usan solamente para los nombres de familia de los subgrupos Terric de Histosols e Histels. Las clases están determinadas por las propiedades de los materiales minerales de suelo en la sección de control a través del uso de las claves para las clases de tamaño de partícula. Las clases están más generalizadas que para los suelos de otros órdenes.

#### Sección de Control para Clases de Tamaño de Partícula

La sección de control del tamaño de partícula corresponde a los 30 cm superiores de la capa mineral o de aquella parte de la capa mineral que está dentro de la sección de control para Histosols e Histels (dada en el capítulo 3), cualquiera que sea más espesa.

#### Clave para las Clases de Tamaño de Partícula de Histosols e Histels

A. Subgrupos Terric de Histosols e Histels que tienen (por promedio ponderado) en la sección de control del tamaño de partícula:

1. Un componente de tierra-fina de menos de 10 por ciento (incluyendo poros medios y más finos asociados) del volumen total.

**Fragmental**

o

2. Una textura (de la tierra-fina) arenosa o arena francosa, incluyendo menos de 50 por ciento (por peso) de arena muy fina en la fracción de tierra-fina.

**Arenosa o esquelética-arenosa**

o

3. Menos de 35 por ciento de arcilla en la fracción de tierra-fina y un contenido de fragmentos rocosos de 35 por ciento o más del volumen total.

**Esquelética-francosa**

o

4. Un contenido de fragmentos rocosos de 35 por ciento o más del volumen total.

**Esquelética-arcillosa**

o

5. Un contenido de arcilla de 35 por ciento o más en la fracción de tierra-fina.

**Arcillosa**

o

6. Todos los otros subgrupos Terric de los Histosols e Histels.

**Francosa**

o

B. Todos los otros Histosols e Histels: no usan clases de tamaño de partícula.

### Clases de Mineralogía

Existen tres diferentes tipos de clases de mineralogía reconocidos para familias en ciertos grandes grupos y subgrupos de Histosols. El primer tipo es el material de suelo ferrihúmico definido posteriormente. En el segundo se consideran tres tipos de materiales límnicos-tierra coprogénica, tierra de diatomeas y margas, definidas en el capítulo 3. El tercero son capas minerales de los subgrupos Terric. La clave para las clases de mineralogía de estas capas minerales es la misma que para los suelos minerales. Los subgrupos Terric de los Histels también tienen las mismas clases de mineralogía que los suelos minerales.

#### Clase de Mineralogía Ferrihúmica

El material ferrihúmico del suelo, es decir, hierro de pantano, es un depósito autígeno (formado en el lugar) que consiste de óxidos de hierro hidratados mezclados con materia orgánica, dispersos y suaves o cementados en grandes agregados, en una capa mineral u orgánica que tiene todas las siguientes características:

1. Saturación con agua por más de 6 meses por año (o con drenaje artificial);
2. 2 por ciento o más (por peso) de concentraciones de hierro que tienen dimensiones laterales que varían de menos de 5 a más de 100 mm y contienen 10 por ciento o más (por peso) de óxido de hierro libre (7 por ciento o más de Fe) y 1 por ciento o más (por peso) de materia orgánica; y
3. Un color rojizo oscuro o parduzco oscuro que cambia poco al secarse.

La clase de mineralogía ferrihúmica se usa en las familias de los Fibrists, Hemists y Saprists, pero no se emplea en los Sphagnofibrists y subgrupos Sphagnic de otros grandes grupos. Si la clase ferrihúmica se usa en el nombre de familia de un Histosol, entonces ninguna otra clase de mineralogía es usada en esa familia, porque la presencia del hierro es por mucho considerada, como la característica mineralógica más importante.

#### Clases de Mineralogía Aplicadas solamente a Subgrupos Limnic

Los materiales límnicos (definidos en el capítulo 3) con un espesor de 5 cm o más, son un criterio para las clases de

mineralogía, si el suelo no tiene mineralogía ferrihúmica. Las clases para familias que son usadas son: coprogénica, diatomácea y marga.

### **Sección de Control para la Clase de Mineralogía Ferrihúmica y para las Clases de Mineralogía Aplicada a Subgrupos Limnic**

La sección de control para la clase mineralógica ferrihúmica y para las clases aplicadas a los subgrupos Limnic es la misma sección de control que para los Histosols.

### **Clases de Mineralogía Aplicadas sólo a Subgrupos Terric**

Para Histosols e Histels en subgrupos Terric, se usa la misma clave de clases de mineralogía que para suelos minerales a menos que el Histosol tenga también la mineralogía ferrihúmica.

### **Sección de Control para las Clases de Mineralogía Aplicadas solo a Subgrupos Terric**

Para los subgrupos Terric de Histosols e Histels, se usa la misma sección de control para las clases de mineralogía y para las clases de tamaño de partícula.

### **Clave para las Clases de Mineralogía**

A. Histosols (excepto para Folists), Sphagnofibrists y subgrupos Sphagnic de otros grandes grupos que tienen materiales ferrihúmicos de suelo dentro de la sección de control para Histosols.

**Ferrihúmica**

*o*

B. Otros Histosols que tienen, dentro de la sección de control para Histosols, materiales límnicos de 5 cm o más de espesor, que consisten de:

1. Tierra coprogénica.

**Coprogénica**

*o*

2. Tierra de diatomeas

**Diatomácea**

*o*

3. Marga

**Marga**

*o*

C. Histels y otros Histosols en subgrupos Terric: usan la clave para clases mineralógicas de suelos minerales.

*o*

D. Todos los otros Histels e Histosols: no usan clases de mineralogía.

### **Clases de Reacción**

Las clases de reacción se usan en todas las familias de Histosols e Histels. Las dos clases reconocidas están definidas en la siguiente clave:

A. Histosols e Histels que tienen un valor de pH, en muestras no secadas, de 4.5 o más (en CaCl<sub>2</sub>, 0.01 M) en una o más capas de materiales orgánicos de suelo dentro de la sección de control para Histosols.

**Euica**

*o*

B. Todos los otros Histosols e Histels.

**Dísica**

### **Clases de Temperatura**

Las clases de temperatura de los Histosols son determinadas usando las mismas claves y definiciones que para los suelos minerales. Los Histels tienen las mismas clases de temperatura que los Gelisols.

### **Clases de Profundidad del Suelo**

Las clases de profundidad del suelo se refieren a la profundidad de una capa limitante a las raíces, a una clase de tamaño de partícula fragmental o a la clase sustituta cindery o pomácea. Las capas limitantes a las raíces incluidas en las clases de profundidad del suelo de Histosols son: duripanes; los horizontes petrocálcicos, petrogypsicos y plácicos; orstein continuos; y contactos denses, líticos, paralíticos y petroféricos. La siguiente clave se usa para las familias de todos los subgrupos de Histosols. La clase somera no se usa en el suborden Folists.

### **Clave para Clases de Profundidad del Suelo**

A. Histosols que tienen menos de 18 cm de profundidad a una capa limitante a raíces, a una clase de tamaño de partícula fragmental o a la clase sustituta cindery o pomácea.

**Micro**

*o*

B. Otros Histosols, excluyendo a los Folists, que tienen una capa limitante a las raíces, a una clase de tamaño de partícula fragmental o a la clase sustituta cindery o pomácea a una profundidad entre 18 y 50 cm a partir de la superficie del suelo.

**Somera**

*o*

C. Todos los otros Histosols: no usan clases de profundidad del suelo.

### **Diferenciación de Series dentro de una Familia**

La función de la serie es pragmática y las diferencias dentro de una familia que afectan el uso de un suelo deberían

ser consideradas en la clasificación de series de suelo. La separación de suelos a nivel de series de esta taxonomía puede estar basada sobre cualquier propiedad que se use como criterio a niveles altos en el sistema. Los criterios más comúnmente empleados incluyen la presencia: de profundidad, de espesor y expresión de horizontes y propiedades de diagnóstico para las categorías más altas y diferencias en textura, mineralogía, humedad del suelo, temperatura del suelo y cantidades de materia orgánica. Los límites de las propiedades usadas como diferenciadoras podrían estar definidos más estrechamente que los límites para familias. Las propiedades usadas, sin embargo, deberían ser observables realmente o ser inferidas de otras propiedades del suelo o a partir de escenarios o de la vegetación.

La diferenciación empleada debería estar dentro de la sección de control de las series. Diferencias en suelos o regolita que están fuera de la sección de control de las series y que no han sido reconocidas como diferenciadoras de series pero que son relevantes para usos potenciales de ciertos suelos son consideradas como una base para la distinción de fases.

### **Sección de Control para la Diferenciación de Series**

La sección de control para las series de suelos es similar a la de familia, pero difiere en algunas consideraciones importantes. Las secciones de control del tamaño de partícula y de mineralogía para familias terminan en el límite superior de un fragipán, duripán o de un horizonte petrocálcico, debido a que esos horizontes tienen pocas raíces. Caso contrario ocurre con la sección de control para series, en relación al espesor de los horizontes que no es tomado en cuenta por las secciones de control de familias. La sección de control de las series incluye a los materiales que comienzan en la superficie del suelo y también a los que están 25 cm debajo de un contacto dénsico, lítico o paralítico, si su límite superior está a menos de 125 cm a partir de la superficie del suelo mineral. Las propiedades de horizontes y capas debajo de la sección de control del tamaño de partícula, a una profundidad entre 100 y 150 cm (o hasta 200 cm si esta un horizonte de diagnóstico) a partir de la superficie del suelo mineral, también son consideradas.

### **Clave para la Sección de Control para la Diferenciación de Series**

La parte de un suelo a ser considerada en la diferenciación de series dentro de una familia es como sigue:

A. Suelos minerales que tienen permafrost dentro de los 150

cm de la superficie del suelo: desde la superficie del suelo hasta lo más somero de los siguientes:

1. Un contacto lítico o petroférico; o
2. Una profundidad de 100 cm si la profundidad del permafrost es menor de 75 cm; o
3. 25 cm debajo del límite superior del permafrost si el límite está a 75 cm o más debajo de la superficie del suelo mineral; o
4. 25 cm debajo de un contacto dénsico o paralítico; o
5. Una profundidad de 150 cm; o

B. Otros suelos minerales: desde la superficie del suelo al más somero de los siguientes:

1. Un contacto lítico o petroférico; o
2. Una profundidad de ya sea 25 cm debajo de un contacto dénsico o paralítico o 150 cm debajo de la superficie del suelo, cualquiera que sea más somero, si existe un contacto dénsico o paralítico dentro de los 150 cm; o
3. Una profundidad de 150 cm si la parte inferior del horizonte de diagnóstico más profundo está a menos de 150 cm de la superficie del suelo; o
4. El límite inferior del horizonte de diagnóstico más profundo o a una profundidad de 200 cm, cualquiera que sea más somera, si el límite inferior del horizonte de diagnóstico más profundo está a 150 cm o más debajo de la superficie del suelo; o

C. Suelos orgánicos (Histosols e Histels): desde la superficie del suelo al más somero de los siguientes:

1. Un contacto lítico o petroférico; o
2. Una profundidad de 25 cm debajo de un contacto dénsico o paralítico; o
3. Una profundidad de 100 cm si la profundidad del permafrost es menor de 75 cm; o
4. 25 cm abajo del límite superior del permafrost, si el límite está entre una profundidad de 75 y 125 cm debajo de la superficie del suelo; o
5. La base de la franja inferior.



## CAPÍTULO 18

### *Designaciones de Horizontes y Capas*

En este capítulo se describen los horizontes genéticos y las capas de suelos. Los horizontes genéticos no son equivalentes a los horizontes de diagnóstico de la Taxonomía de Suelos. Las designaciones de los horizontes genéticos expresan un juicio cualitativo del tipo de cambios que se cree que tomaron lugar en el suelo; mientras que, los horizontes de diagnóstico están definidos cuantitativamente por las características usadas para diferenciar a las taxa. Un horizonte de diagnóstico puede involucrar a varios horizontes genéticos, y los cambios expresados por la designación de los horizontes genéticos no pueden ser suficientes para justificar el reconocimiento de diferentes horizontes de diagnóstico.

#### Horizontes Mayores y Capas

Las letras mayúsculas O, L, A, E, B, C, R, M y W representan a los horizontes mayores y a las capas de los suelos. Estas letras son los símbolos básicos, a los cuales se le añaden otros caracteres para la designación completa. La mayoría de los horizontes y capas tienen como símbolo a una letra mayúscula; aunque algunos requieren dos.

**Horizontes o capas O:** *Capas dominadas por material orgánico. Algunas están saturadas con agua durante largos períodos o estuvieron saturadas pero ahora están artificialmente drenadas; otras nunca han estado saturadas.*

Algunas capas O están constituidas por hojarasca (piso forestal) no descompuesto o parcialmente descompuesto (tales como hojas, agujas, ramas pequeñas, musgos y líquenes), que han sido depositados en la superficie. Pueden estar sobre suelos minerales u orgánicos. Otras capas O consisten de materiales orgánicos que fueron depositados bajo condiciones de saturación y tienen diferentes etapas de descomposición. La fracción mineral de tales materiales constituye sólo un pequeño porcentaje del volumen del material y generalmente es mucho menos de la mitad del peso. Algunos suelos consisten enteramente de material designado como horizontes o capas O.

Una capa O puede estar sobre la superficie de un suelo mineral o a cualquier profundidad bajo la superficie si está enterrada. Un horizonte formado por la iluviación de materia orgánica dentro de un subsuelo mineral no es un horizonte O, aunque algunos horizontes formados de esta manera contengan cantidades considerables de materia orgánica.

**Horizontes y capas L:** *Horizontes o capas límnicos que incluyen tanto a materiales límnicos minerales y orgánicos que fueron: (1) depositados en agua por precipitación o a través de la acción de organismos acuáticos, tales como algas y diatomeas, o (2) derivados de plantas acuáticas submarinas*

*o flotantes y subsecuentemente modificadas por animales acuáticos.*

Los horizontes y capas L incluyen a las tierras coprogénicas (peat sedimentario), a las tierras de diatomeas y a las margas. Se presentan sólo en los Histosols. Tienen únicamente a las siguientes distinciones subordinadas: co, di o ma. No tienen las distinciones subordinadas de otros horizontes mayores y capas.

**Horizontes A:** *Horizontes minerales que han sido formados en la superficie o abajo de un horizonte O, que exhiben la eliminación de toda o gran parte de la estructura<sup>1</sup> original de la roca y muestran una o ambas de las siguientes: (1) una acumulación de materia orgánica humificada íntimamente mezclada con la fracción mineral y no dominados por propiedades características de los horizontes E o B (definidos posteriormente) o; (2) propiedades resultantes de su cultivo, de pastoreo o por tipos de disturbios similares.*

Si un horizonte superficial tiene propiedades tanto del horizonte A como del E pero la característica más enfática es la acumulación de materia orgánica humificada, se le designa como un horizonte A. En algunos lugares, como en climas áridos calientes, el horizonte superficial no disturbado es menos oscuro que el horizonte adyacente inferior y contiene sólo pequeñas cantidades de materia orgánica; tiene una morfología diferente de la capa C, aunque la fracción mineral no esté alterada o sólo ligeramente alterada por el intemperismo. Tal horizonte se designa como A porque está en la superficie; sin embargo, los depósitos aluviales o eólicos recientes que mantienen una estratificación fina no son considerados como horizontes A a menos que estén cultivados.

**Horizontes E:** *Horizontes minerales, en los que el principal rasgo es la pérdida de arcilla silicatada, hierro o aluminio o alguna combinación de estos, permaneciendo una concentración de partículas de arena y limo. Estos horizontes exhiben una eliminación de toda o la mayor parte de la estructura original de la roca.*

Un horizonte E usualmente se diferencia de un horizonte B subyacente en el mismo sequeum porque el color del value es más alto o del chroma más bajo, o ambos, por la textura más gruesa, o por una combinación de esas propiedades. En algunos suelos el color del horizonte E se debe a las partículas de arena y limo, pero en muchos suelos los revestimientos de óxidos de hierro y otros compuestos, enmascaran el color de las partículas primarias. Un horizonte E se diferencia comúnmente del horizonte A suprayacente por su color más claro. Generalmente contiene menos materia orgánica que el horizonte A. Un horizonte E comúnmente está cerca de la

<sup>1</sup> Estructura de la roca incluye la estratificación fina de materiales de suelo no consolidados, así con pseudoformas de minerales intemperizados que retienen su posición relativa, de unos con otros y de los minerales no intemperizados en saprolita.

superficie abajo de un horizonte O, o de un A y encima de un horizonte B, pero los horizontes eluviales que están dentro o entre partes del horizonte B, o los que se extienden a profundidades mayores de las observadas pueden ser designados con la letra E si son pedogenéticos.

**Horizontes B:** *Horizontes que se han formado abajo de un horizonte A, E u O y están dominados por la destrucción de toda o la mayor parte de la estructura original de la roca y muestran una o más de las siguientes:*

1. Concentración iluvial de arcilla silicatada, hierro, aluminio, humus, carbonatos, yeso o sílice, solos o en combinación;
2. Evidencias de remoción o adición de carbonatos;
3. Concentración residual de óxidos;
4. Revestimientos de sesquióxidos que hacen al horizonte conspicuamente menor en el color del value, mayor en el chroma o más rojizo en el hue, sin aparente iluviación de hierro;
5. Alteración que forma arcillas silicatadas o libera óxidos o ambos y que forma una estructura granular, blocosa o prismática si el volumen cambia acompañado de cambios en el contenido de humedad;
6. No quebradizos; o
7. Gleyzación fuerte.

Todos los tipos de horizontes B son o fueron originalmente horizontes subsuperficiales. Se incluyen como horizontes B, a capas contiguas a otros horizontes genéticos que tienen concentración iluvial de carbonatos, yeso o sílice que son el resultado de procesos pedogenéticos (y pueden o no estar cementadas) y capas quebradizas que muestran otras evidencias de alteración, tal como estructura prismática o acumulación iluvial de arcilla.

Ejemplos de capas que no son horizontes B son capas en las que existen recubrimientos de arcilla que están sobre fragmentos de roca o cubren sedimentos finamente estratificados no consolidados, ya sea que los recubrimientos se hayan formado en el lugar o por iluviación; capas dentro de las cuales los carbonatos han sido iluviados pero, que no son continuas a un horizonte genético suprayacente; y capas con gleyzación que no tienen otros cambios pedogenéticos.

**Horizontes o capas C:** *Horizontes o capas, excluyendo a la roca dura, que están poco afectados por procesos pedogenéticos y carecen de las propiedades de los horizontes O, A, E, o B. La mayoría son capas minerales. El material de las capas C puede ser o no común al material que presumiblemente ha dado origen al solum. Un horizonte C puede haber sido modificado aunque no exista evidencia de pedogénesis.*

Se incluyen como capas C a sedimentos, saprolita, lechos rocosos y otros materiales geológicos que no están moderadamente cementados o menos cementados. La dificultad de excavación en estos materiales es baja o moderada. En suelos formados a partir de materiales muy intemperizados, si tales materiales no cumplen con los

requisitos de un horizonte A, E o B se les designa como C. Los cambios que no se consideran pedogenéticos son aquellos que no se relacionan con horizontes suprayacentes. Algunas capas que tienen acumulaciones de sílice, carbonatos o yeso o sales más solubles se incluyen en los horizontes C, aún cuando estén endurecidos. Sin embargo, si una capa cementada está formada por procesos pedogenéticos; se le considera como un horizonte B.

**Capas R.** *Lecho rocoso fuertemente cementado o endurecido.*

El granito, basalto, cuarcita y caliza o arenisca son ejemplos de lechos rocosos designados con la letra R. Su dificultad de excavación comúnmente excede a la categoría alta. La capa R es muy coherente cuando está húmeda para hacer imprácticoimpráctica su excavación con la pala, aunque puede ser desmenuzada o raspada. Algunas capas R se pueden desmoronar con equipo pesado. La roca madre puede tener grietas, pero estas son generalmente tan pocas y tan pequeñas que no permiten penetrar a las raíces. Las grietas pueden estar recubiertas o rellenas con arcilla u otro material.

**Capas M:** *Capas del subsuelo limitantes para el crecimiento de raíces, que consisten de materiales casi continuos, con orientación horizontal y de manufacturación humana.*

Ejemplos de materiales designados con la letra M son los geotextiles, asfalto, concreto, hule y plástico.

**Capas W:** *Agua*

Este símbolo indica capas de agua dentro o abajo del suelo. A la capa de agua se le designa como Wf, si está permanentemente congelada y como W si no lo está. La designación W (o Wf) no se utiliza en aguas someras, hielo o nieve que están encima de la superficie del suelo.

## Horizontes Transicionales y Combinación de Horizontes

*Horizontes dominados por propiedades de un horizonte mayor que tiene propiedades subordinadas de otro.* Se usan dos letras mayúsculas como símbolo para estos horizontes de transición; por ejemplo: AB, EB, BE, o BC. El primero de esos símbolos indica al horizonte mayor cuyas propiedades dominan en el horizonte transicional. Un horizonte AB, por ejemplo, tiene características de ambos, un horizonte suprayacente A y un subyacente B, pero es más parecido al A que al B.

En algunos casos, un horizonte puede ser designado como transicional, aun cuando uno de los horizontes mayores no este presente. Un horizonte BE puede ser reconocido en un suelo trancado si sus propiedades son similares a las de un horizonte BE de un suelo en el que un horizonte suprayacente E no ha sido removido por la erosión. Un horizonte BC puede ser reconocido aunque el horizonte C subyacente no este presente; es un transicional a materiales parentales asumidos.

*Horizontes que tienen dos partes distintivas con propiedades reconocibles de dos horizontes mayores indicados por letras mayúsculas.* - Las dos letras mayúsculas que designan tal combinación de horizontes están separadas por una diagonal (/), como E/B, B/E, B/C. La mayoría de las

partes individuales de uno de los horizontes componentes está rodeada por el otro. La designación se puede usar aún cuando horizontes similares a uno o ambos componentes no estén presentes, si los componentes pueden reconocerse por separado en el horizonte combinado. El primer símbolo corresponde al horizonte que constituye el mayor volumen.

Ningún conjunto simple de designadores de horizontes cubre todas las situaciones; aunque algunas improvisaciones pueden hacerse. Por ejemplo: los Argic Udipsamments tienen lamelas que están separadas una de otra por capas eluviales. Debido a que no es práctico describir cada lamela y la capa eluvial como horizontes separados, los horizontes pueden combinarse pero los componentes se describen por separado. Un horizonte que contiene varias lamelas y capas eluviales, se puede designar como un horizonte "E y Bt". La secuencia completa para este tipo de suelo podría ser: Ap-Bw-E y Bt1-E y Bt2-C.

### Símbolos Sufijos

Se usan letras minúsculas como sufijos para designar tipos específicos de horizontes mayores y capas. El término "acumulación" es utilizado en muchas definiciones para indicar que el horizonte deberá tener más del material en cuestión que el que se presume que ha estado presente en el material parental. Los símbolos de los sufijos y sus significados son como siguen:

a *Material orgánico muy descompuesto*

Este símbolo se usa con O para indicar materiales orgánicos muy descompuestos, los cuales tienen un contenido de fibra menor de 17 por ciento (por volumen) después de molido.

b *Horizonte genético enterrado*

Este símbolo es utilizado en suelos minerales para indicar horizontes enterrados identificables con rasgos genéticos mayores que fueron formados antes de enterrarse. Los horizontes genéticos pueden o no haberse formado de los materiales suprayacentes, los cuales pueden o no ser asumidos como los materiales parentales de los suelos enterrados. Este símbolo no se usa en suelos orgánicos o para separar una capa orgánica de una mineral.

c *Concreciones o nódulos*

Este símbolo indica una acumulación significativa de concreciones o nódulos. La cementación es requerida. El agente cementante es comúnmente hierro, aluminio, manganeso o titanio. No puede ser sílice, dolomita, calcita o sales más solubles.

co *Tierra coprogénica*

Este símbolo es utilizado sólo con L, indica una capa límnica de tierra coprogénica (o peat sedimentario).

d *Restricción física a raíces*

Este símbolo indica capas no cementadas, restrictivas a las raíces con ocurrencia natural o hechas por el hombre, de materiales o sedimentos. Ejemplos son: basaltos densos

trabajados, pisos de arado y otras zonas mecánicamente compactadas.

di *Tierra de diatomeas*

Este símbolo, solamente se usa con L, indica una capa límnica de tierras de diatomeas.

e *Material orgánico de descomposición intermedia*

Este símbolo se usa con O para indicar materiales orgánicos con descomposición intermedia. Su contenido de fibras es de 17 a 40 por ciento (por volumen) después de molidos.

f *Suelo o agua congelados*

Este símbolo indica que el horizonte o capa contiene hielo permanente. El símbolo no se usa para las capas congeladas estacionalmente o para la de permafrost seco.

ff *Permafrost seco*

Este símbolo indica un horizonte o capa que está más fría que 0 °C en forma continua y no contiene suficiente hielo para estar cementada. Este sufijo no se usa para horizontes o capas que tienen un horizonte más caliente de 0 °C en algún tiempo del año.

g *Gleyzación fuerte*

Este símbolo indica que el hierro fue reducido y removido durante la formación del suelo o que la saturación con agua estancada lo ha preservado en un estado reducido. La mayoría de las capas afectadas tienen un chroma de 2 o menos y muchas tienen concentraciones redox. El chroma bajo puede representar el color del hierro reducido o el color de las partículas de arena y limo no recubiertas de las cuales el hierro ha sido removido. El símbolo g no se usa para los materiales del suelo con bajo chroma, que no tienen antecedentes de saturación, tal como los esquistos o los horizontes E. Si g se usa con B, implica cambios pedogenéticos adicionales a la gleyzación. Si ningún otro cambio tiene lugar, el horizonte es designado como Cg.

h *Acumulación iluvial de materia orgánica*

Este símbolo se usa con B para indicar la acumulación de complejos de materia orgánica y sesquióxidos, iluviales, amorfos o dispersables si el componente del sesquióxido está dominado por aluminio pero está presente sólo en pequeñas cantidades. El material órgano-sesquióxido reviste a las partículas de arena y limo. En algunos horizontes, los recubrimientos han unido, rellenado poros y cementado el horizonte. El símbolo h también se usa en combinación con s como "Bhs" si la cantidad del componente del sesquióxido es significativo pero el color del value y del chroma, en húmedo del horizonte, es de 3 o menos.

i *Material orgánico ligeramente descompuesto*

Este símbolo se usa con O para indicar una mínima descomposición de los materiales orgánicos. Su contenido

de fibras es de 40 por ciento o más (por volumen) después de molidos.

j *Acumulación de jarosita*

La jarosita es un mineral de sulfato de potasio o de hierro que comúnmente es producto de la alteración de la piritita cuando ha sido expuesta a ambientes oxidantes. La jarosita tiene un hue de 2.5Y o más amarillento y normalmente un chroma de 6 o más, aún cuando chromas más bajos como 3 o 4 hayan sido reportados.

jj *Evidencias de crioturbación*

Las evidencias de crioturbación incluyen a límites de horizontes irregulares y quebrados, fragmentos rocosos divididos y materiales de suelos orgánicos que ocurren como cuerpos y capas quebradas dentro y/o entre capas de suelos minerales. Los cuerpos orgánicos y las capas son más comunes en el contacto entre la capa activa y el permafrost.

k *Acumulación de carbonatos secundarios*

Este símbolo indica una acumulación de carbonatos de calcio pedogenéticos (menos de 50 por ciento, por volumen). La acumulación de carbonatos ocurre como filamentos de carbonato, recubrimientos, masas, nódulos, carbonato diseminado, o de diseminaciones u otras formas.

kk *Acaparamiento del horizonte por carbonatos secundarios*

Este símbolo indica una acumulación mayor de carbonato de calcio pedogenético. El sufijo kk es utilizado cuando la textura del suelo está saturada con carbonato pedogenético de grano fino (50 por ciento o más, por volumen) que ocurre como un medio esencial continuo. El sufijo corresponde a la etapa III de un horizonte saturado o a la más alta de las etapas de carbonatos morfogenéticos (Gile et al., 1966).

m *Cementación o endurecimiento*

Este símbolo indica una cementación continua o casi continua. Se usa sólo para horizontes que están cementados en más de 90 por ciento, aunque pueden estar fracturados. La capa cementada es físicamente restrictiva a las raíces. El agente cementante predominante (o los dos agentes cementantes dominantes) puede ser indicado por el uso de sufijos, en forma individual o en parejas. El sufijo km de un horizonte, indica una cementación por carbonatos; qm por sílice; sm por hierro; ym por yeso; kqm por carbonato y sílice; zm por sales más solubles que el yeso.

ma *Marga*

Este símbolo, se usa sólo con L, se refiere a una capa límnic con marga.

n *Acumulación de sodio*

Este símbolo indica una acumulación de sodio intercambiable.

o *Acumulación residual de sesquióxidos*

Este símbolo significa la acumulación residual de sesquióxidos.

p *Labranza u otros disturbios*

Este símbolo indica un disturbio en la capa superficial por medios mecánicos, pastoreo u otros usos similares. Un horizonte orgánico disturbado se designa como Op. Un horizonte mineral disturbado, aunque pudiera ser un horizonte E, B o C, se designa como Ap.

q *Acumulación de sílice*

Este símbolo indica una acumulación de sílice secundario.

r *Roca madre interemperizada o suave*

Este símbolo se usa con C para indicar capas cementadas (moderadamente cementadas o menos cementadas). Ejemplos son las rocas ígneas interemperizadas y areniscas, limolitas o esquistos parcialmente consolidados. Su dificultad de excavación es de baja a alta.

s *Acumulación iluvial de sesquióxidos y materia orgánica*

Este símbolo se usa con B para indicar una acumulación de complejos de sesquióxidos - materia orgánica iluvial, amorfa, dispersable si los componentes son significativos y si el color del value o del chroma, en húmedo del horizonte, es de 4 o más. El símbolo también se usa en combinación con h como Bhs, si tanto los componentes de materia orgánica y como los sesquióxidos son significativos y si el color del value y del chroma, en húmedo son de 3 o menos.

ss *Presencia de caras de fricción*

Este símbolo se usa para indicar la presencia de caras de fricción. Las caras de fricción resultan directamente de la expansión de minerales de la arcilla y las fallas de fractura, comúnmente en ángulos de 20 a 60 grados arriba de la horizontal. Son indicadores de otras características vérticas, tales como los agregados en forma de cuña y las grietas superficiales, que pueden estar presentes.

t *Acumulación de arcilla silicatada*

Este símbolo indica una acumulación de arcilla silicatada que pudo haberse formado y subsecuentemente transportado en el horizonte o haber sido movida por iluviación dentro de él, o ambas. Al menos alguna parte del horizonte deberá mostrar evidencias de acumulación de arcilla, ya sea como recubrimientos sobre la superficie de los agregados o en los poros, como lamelas ó como puentes entre los granos minerales.

u *Presencia de materiales de manufacturación humana (artefactos)*

Este símbolo indica la presencia de artefactos manufacturados que han sido creados o modificados por el hombre con un propósito práctico en actividades de vivienda, transformación, excavación o construcción.

Ejemplos de artefactos son productos de madera procesados, productos de petróleo líquido, carbón, productos por combustión, asfalto, fibras y fábricas, ladrillos, bloques de cenizas, concreto, plásticos, vidrios, hules, papel, cartón, hierro y acero, metales y minerales alterados, desechos sanitarios y médicos, basura y rellenos sanitarios.

v *Plintita*

Este símbolo indica la presencia de un material rojizo, rico en hierro, pobre en humus, que es firme o muy firme cuando está húmedo y que el endurecimiento es irreversible cuando se expone a la atmósfera y a repetidos humedecimientos y secados.

w *Desarrollo de color o estructura*

Este símbolo se usa con B para indicar el desarrollo del color o la estructura o ambos, con poca o ninguna acumulación aparente de material iluvial. Este no deberá usarse para indicar a un horizonte transicional.

x *Carácter de fragipán*

Este símbolo indica una capa genéticamente desarrollada que tiene una combinación de firmeza y fragilidad, y con frecuencia una densidad aparente mayor que la de las capas subyacentes. Alguna parte de la capa es físicamente restrictiva a las raíces.

y *Acumulación de yeso*

Este símbolo indica una acumulación de yeso.

z *Acumulación de sales más solubles que el yeso*

Este símbolo indica una acumulación de sales más solubles que el yeso.

## Convenciones para el Uso de Letras Sufijos

Muchos de los horizontes mayores y capas que están simbolizados por una letra mayúscula pueden tener una o más letras minúsculas como sufijos. Se aplican las siguientes reglas:

1. Las letras sufijos deberán seguir inmediatamente a la letra mayúscula.
2. Raramente se usan más de tres sufijos.
3. Si es necesario usar más de un sufijo, las siguientes letras, son escritas en primer lugar: a, d, e, i, h, r, s, t y w. Excepto en la designación de los horizontes Bhs o Cr<sup>2</sup>, debido a que estas letras, no se usan en combinación en un horizonte singular.
4. Si es necesario usar más de un sufijo y el horizonte no está enterrado, los siguientes símbolos, se escriben al final: c, f, g, m, v y x. Algunos ejemplos: Btc, Bkm, y Bsv.

5. Si un horizonte está enterrado, el sufijo b se escribe al final. Es usado solamente para suelos minerales enterrados.

Un horizonte B con una acumulación significativa de arcilla y también mostrando evidencias de desarrollo de color o estructura o ambas se designa como Bt (t tiene preferencia sobre w, s, y h). Un horizonte B que está gleyzado o que tiene acumulaciones de carbonatos, sodio, sílice, yeso, o sales más solubles que el yeso o acumulaciones residuales de sesquióxidos llevan el símbolo apropiado: g, k, n, q, y, z u o. Si la arcilla iluvial también está presente t precede a los otros símbolos: Bto.

A menos que se necesite con fines explicativos, los sufijos h, s y w no se usan con g, k, a, q, y, z u o.

## Subdivisión Vertical

Comúnmente, un horizonte o una capa designada por una sola letra o una combinación de letras, necesita subdividirse. Para este propósito, se adicionan números arábigos a las letras que designan a los horizontes. Estos números se colocan al final de todas las letras. Dentro de un C, por ejemplo, capas sucesivas podrían ser designadas como C1, C2, C3, etc; si la parte inferior está gleyzada y la parte superior no, las designaciones de las capas podrían ser C1-C2-Cg1-Cg2 o C-Cg1-Cg2-R.

Estas convenciones se aplican para las subdivisiones, cualquiera que sea el propósito. En muchos suelos, un horizonte identificado por un conjunto único de letras, es subdividido por la necesidad de reconocer diferencias en rasgos morfológicos, tales como la estructura, el color o la textura. Estas divisiones se enumeran consecutivamente con números arábigos, pero la numeración comienza con el 1 a cualquier nivel en el perfil, cuando cualquier letra que simboliza a un horizonte cambia, por ejemplo se usa Bt1 - Bt2 - Btk1 - Btk2 (y no Bt1 - Bt2 - Btk3 - Btk4). La numeración de las subdivisiones verticales dentro de un horizonte no es interrumpida por una discontinuidad (indicada por un prefijo numérico) si la misma combinación de letras es usada en ambos materiales, por ejemplo, Bs1 - Bs2 - 2Bs3 - 2Bs4 (y no como Bs1 - Bs2 - 2Bs1 2Bs2).

Algunas veces, horizontes espesos de suelo se subdividen durante el muestreo para los análisis de laboratorio, a pesar de que las diferencias morfológicas no sean evidentes en el campo. Estas subdivisiones son identificadas con números arábigos al final de la designación del horizonte. Por ejemplo: cuatro capas de un horizonte Bt muestreado cada 10 cm, serían designadas como Bt1, Bt2, Bt3, y Bt4. Si el horizonte ya ha sido subdividido por diferencias en rasgos morfológicos, el conjunto de números arábigos que identifican las subdivisiones del muestreo adicional seguirán después del primer numeral. Por ejemplo: tres capas de un horizonte Bt2 muestreadas cada 10 cm, se designan Bt21, Bt22 y Bt23. Las descripciones para cada una de las subdivisiones muestreadas puede ser la misma y puede hacerse un comentario adicional, estableciendo que el horizonte ha sido subdividido para propósitos de muestreo solamente.

<sup>2</sup>Indica material parental intemperizado o saprolita con películas arcillosas.

## Discontinuidades

En suelos minerales se usan números arábigos como prefijos de las designaciones de horizontes, para indicar discontinuidades (precediendo a A, E, B, C y R). Esos prefijos son diferentes de los números arábigos usados como sufijos que denotan subdivisiones verticales.

Una discontinuidad identificada por un prefijo numérico es un cambio significativo en la distribución del tamaño de partícula o de mineralogía que indica una diferencia en el material a partir del cual los horizontes se han formado y/o una diferencia significativa en edad, a menos que las diferencias en edad estén indicadas por el sufijo b. Los símbolos para identificar discontinuidades se usan sólo cuando contribuyen sustancialmente al entendimiento de las relaciones entre horizontes. La estratificación común de suelos formados en aluviones no se designa como discontinuidades a menos que la distribución del tamaño de partícula difiera marcadamente de capa a capa (esto es, clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes), aun cuando los horizontes genéticos se hayan formado en capas contrastantes.

Cuando un suelo se ha formado en un solo tipo de material, el prefijo se omite del símbolo; todo el perfil es material 1. Similarmente, el material superior en un perfil que tiene dos o más materiales contrastantes, se sobreentiende que es material 1, pero el número se omite. La numeración inicia con la segunda capa de material contrastante, el cual se designa con 2. Las capas contrastantes subyacentes son numeradas consecutivamente. Aún cuando la capa inferior al material 2 sea similar al material 1, se designada como 3 en la secuencia; los números indican un cambio de materiales, no los tipos de material. Donde dos o más horizontes consecutivos se han formado del mismo tipo de material, el mismo número prefijo es aplicado en todas las designaciones de horizontes: Ap-E-Btl -2Bt2-2Bt3-2BC. Los números sufijos que designan las subdivisiones del horizonte Bt continúan en orden consecutivo a través de la discontinuidad.

Si una capa R está debajo de un suelo que se ha formado en un residuo y si el material de la capa R se juzga que es similar al material a partir del cual el suelo se ha desarrollado, el prefijo numeral arábigo no se usa. El prefijo se usa, si la capa R no produce al material del solum, como en A-Bt-C-2R o A-Bt-2R. Si parte del solum se ha formado de un residuo, al símbolo R se le asigna el prefijo apropiado; Ap-Btl-2Bt2-2Bt3-2C1-2C2 -2R.

Los horizontes enterrados (designados por la letra b) presentan problemas especiales. Es obvio que no pertenecen al mismo depósito de los horizontes suprayacentes. Algunos horizontes enterrados, sin embargo, pueden formarse de materiales litológicos parecidos a los depósitos suprayacentes. No se usa prefijo alguno para distinguir a los materiales de tales horizontes enterrados. Si el material en el cual un horizonte de un suelo enterrado se ha formado es litológicamente diferente al material suprayacente, la discontinuidad se designa por un número prefijo y el símbolo

del horizonte enterrado también se usa: Ap-Btl-Bt2-BC-C-2ABb-2Btbl -2Btb2-2C.

En suelos orgánicos, las discontinuidades entre diferentes tipos de capas no se identifican. En la mayoría de los casos las diferencias se muestran con las designaciones de las letras sufijos, si las diferentes capas son orgánicas, o por los símbolos mayores si las diferentes capas son minerales.

## Uso del Símbolo de la Prima

Si dos o más horizontes del mismo tipo están separados por uno o mas horizontes diferentes en el mismo pedón, pueden usarse símbolos idénticos con letras y números para los horizontes que tienen las mismas características. Por ejemplo: la secuencia A-E-Bt-E-Btx-C identifica a un suelo que tiene dos horizontes E. Para enfatizar esta característica, se usa el símbolo de la prima (') con el horizonte mayor localizado más abajo de los dos que tienen la misma letra de designación, por ejemplo: A-E-Bt-E'-Btx-C. El símbolo de la prima, cuando es apropiado, se aplica a la letra mayúscula y para símbolos con letras minúsculas, como sigue: B't. La prima no se usa a menos que todas las letras de las designaciones de dos diferentes capas sean idénticas. En los casos raros, cuando tres capas tienen símbolos idénticos; se puede emplear una doble prima para la capa mas baja: E''.

El mismo principio es aplicable en las designaciones de capas de suelos orgánicos. La prima se usa solamente para distinguir dos o más horizontes que tienen símbolos idénticos: Oi-C-O'i-C' (cuando el suelo tiene dos capas Oi idénticas) o Oi-C-Oe-C' (cuando dos capas C son del mismo tipo).

## Uso del Signo de Intercalación

El símbolo de "intercalación" (^) se usa como prefijo en la designación de horizontes mayores para indicar capas minerales u orgánicas de material transportado por el hombre. Este material se ha movido horizontalmente sobre un pedón a partir de un área fuente que se localiza fuera del pedón como resultado directo de la actividad humana, siendo usual, con la ayuda de maquinaria. Todos los horizontes y capas formados por materiales transportados por el hombre están indicados por un prefijo de "intercalación" (por ejemplo, ^A-^C-Ab-Btb). Cuando se contribuya sustancialmente a un entendimiento de las relaciones de horizontes o capas, prefijos de números arábigos se pueden usar antes del símbolo de intercalación para indicar la presencia de discontinuidades dentro de los materiales transportados por el hombre o entre los materiales transportados por el hombre y las capas subyacentes (por ejemplo, ^A- ^C1-2^C2-3Bwb).

## Literatura Citada

Gile, L.H., F.F. Peterson, and R.B. Grossman. 1966. Morphological and Genetic Sequences of Carbonate Accumulation in Desert Soils. *Soil Sci.* 101: 347-360.

## Métodos de Laboratorio para la Taxonomía de Suelos

Los métodos estándar de laboratorio sobre las definiciones operacionales en la edición de *Taxonomía de Suelos* están basados y descritos en el *Manual de Métodos de Laboratorio para Levantamientos de Suelos* (USDA, en prensa). Copias de las hojas estándar de datos de laboratorio están incluidas en la tipificación de pedones en los capítulos de órdenes de suelo en la edición de la *Taxonomía de Suelos*. Para información más específica sobre los procedimientos analíticos, de esas hojas de datos se deben verificar y referenciar en el *Manual de Métodos de Laboratorio para Levantamientos de Suelos*. Mucha de la información incluida en este apéndice es derivada de "*los Métodos del Laboratorio de Levantamientos de Suelos para Caracterizar las Propiedades Físicas, Químicas y Mineralógica de Suelos*" (Kimble, Knox, y Holzhey, 1993). También, la información corresponde a un resumen del *Manual de Información de Laboratorio para Levantamientos de Suelos* (USDA, NRCS, 1995).

Los datos que caracterizan a un pedón, o a cualquiera de los datos de un levantamiento de suelos, son más útiles cuando las operaciones para su colección están bien entendidas. Las imágenes mentales y las definiciones conceptuales que ayudan en la visualización de propiedades y procesos a menudo difieren de la información suministrada por un análisis. También, los resultados difieren por el método, aún cuando dos métodos tengan el mismo nombre o el mismo concepto. Existe incertidumbre al comparar un grupo de datos con otro sin el conocimiento de cómo fueron obtenidos. Las definiciones operacionales, son definiciones necesarias que deben estar vinculadas a un método específico. Esta taxonomía de suelos tiene muchos límites de clase (a todos los niveles), en base a propiedades físicas y químicas determinadas en el laboratorio. Uno puede cuestionar un límite dado, pero eso no es el propósito de este apéndice. Este apéndice está escrito para mostrar los procedimientos utilizados para generar los límites de clases. Usando los límites específicos de clase, se llegará a la misma clasificación si se siguen los mismos procedimientos.

Esta taxonomía se basa casi completamente en criterios definidos operacionalmente. Un ejemplo es la definición de las clases de tamaño de partícula. No existe una definición de arcilla tan buena que sea útil para todos los suelos. De ahí, que se necesite una prueba de la validez de la medida de arcilla y un procedimiento alternativo para aquellas situaciones donde la medida de arcilla no resulte válida. El método alternativo está basado en el contenido de humedad a 1500 kPa y en el contenido de carbón orgánico.

## Datos Elementales Usados en la Clasificación de Suelos

Explicaciones detalladas de los métodos de laboratorio están dadas en el *Manual de Métodos de Laboratorio para Levantamientos de Suelos* (Burt, 2004). Cada método está listado por un código en la hoja de datos al comienzo de cada uno de los capítulos que describen a los órdenes de suelo. Sobre las hojas de datos de cada orden, el código del método se muestra para cada determinación realizada. Estas hojas de datos pueden ser consultadas en el *Manual de Métodos de Laboratorio para Levantamientos de Suelos*. Este manual especifica tanto los métodos codificados para el pedón muestreado, como el manejo de la muestra, la selección del sitio, la colección y preparación de la muestra.

Las unidades de medida reportadas en la hoja de datos no son unidades del SI. Las siguientes son conversiones del SI:

$$1 \text{ meq}/100 \text{ g} = 1 \text{ cmol (+)}/\text{kg}$$

$$1 \text{ mmho}/\text{cm} = 1 \text{ dS}/\text{m}$$

$$15 \text{ bar} = 1500 \text{ kPa}$$

$$1/3 \text{ bar} = 33 \text{ kPa}$$

$$1/10 \text{ bar} = 10 \text{ kPa}$$

En esta taxonomía se usan los siguientes términos: (1) análisis de tamaño de partícula (tamaño de separados), (2) textura, y (3) clases de tamaño de partícula. El análisis de tamaño de partícula se requiere para determinar la textura y la clase de tamaño de partícula. La textura difiere de la clase de tamaño de partícula en que la textura incluye sólo a la fracción de tierra-fina (menos de 2 mm); mientras el tamaño de partícula incluye a la fracción menor de 2 mm y a la fracción igual o mayor de 2 mm.

### Análisis Físicos

*Los límites de Atterberg* se determinan en la fracción de un tamaño menor de 0.4 mm. El índice de plasticidad es la diferencia en el contenido de agua entre el límite líquido y el límite plástico. Esto es, el rango del contenido de agua sobre el cual una pasta de suelo puede deformarse sin romperse, pero no incluye al flujo como un líquido bajo las condiciones operacionalmente definidas. El límite líquido es el contenido mínimo de agua con el que la pasta comienza a fluir como líquido. Las muestras que no se deforman o rompen a cualquier contenido de agua son reportadas como NP, no plástica. Las definiciones operacionales están dadas en el Libro Anual de Estándares de la ASTM (ASTM, 1998).

*La densidad aparente* se obtiene por el equilibrio de las fábricas naturales en terrones recubiertos con resina Sarán a presiones diferenciales establecidas. Las densidades aparentes están determinadas a dos o más contenidos de agua. Para

suelos de texturas gruesas a moderadamente gruesas, se determina sobre muestras a una succión de 10 kPa y cuando está secada a la estufa. Para suelos de textura media o fina, las densidades aparentes se determinan cuando la muestra está a una succión de 33 kPa y cuando está secada a la estufa.

La densidad aparente determinada a una succión de 33 kPa se usa para convertir otros resultados analíticos a una base volumétrica (por ejemplo, kg de carbono orgánico por m<sup>3</sup>).

*El coeficiente de extensibilidad lineal (COEL)* es un valor derivado. Se calcula por la diferencia de densidades aparentes de un terrón húmedo y un terrón secado a la estufa. Esta basado en la contracción de un terrón natural de suelo entre el contenido de agua a 33 kPa (10 kPa para suelos muy arenosos) y el secado a la estufa.

*La extensibilidad lineal (LE)* de una capa de suelo es el producto del espesor, en centímetros, por el COEL de la capa en cuestión. La EL de un suelo, es la suma de esos productos para todos los horizontes del suelo. El COEL multiplicado por 100 es llamado porcentaje de extensibilidad lineal (PEL).

*La diferencia de retención de agua (DRA)* se calcula a partir de las retenciones a 33 kPa (10 kPa para suelos muy arenosos) y 1500 kPa de succión. Es convertida a cm de agua por cm de suelo a través del uso de la densidad aparente. El agua a 33 o 10 kPa se determina por desorción de la fábrica natural de los terrones, y el agua a 1500 kPa es determinada por desorción de suelo molido.

## Análisis Químicos

*La saturación de aluminio* es la cantidad de Al extraído con KCl dividido por las bases extractables (extraídas por acetato de amonio) más el Al extraído con KCl. Es expresado en porcentaje. Una regla empírica general es que si existe más de 50 por ciento de saturación de Al, son comunes los problemas de Al en el suelo. Los problemas pueden no estar relacionados con la toxicidad del Al pero sí con las deficiencias de calcio y/o magnesio.

*El aluminio, hierro y sílice, extractables con oxalato de amonio* están determinados por una extracción hecha en la oscuridad con oxalato de amonio 0.2 molar a un pH de 3.5. La cantidad de aluminio, hierro y sílice se mide con absorción atómica y se reporta como un porcentaje del peso seco total de la fracción de tierra-fina. Estos valores son utilizados como criterios para la identificación de suelos en los órdenes de Andisols y Spodosols y en los subgrupos Andic y Spodic en otros órdenes. También se usan para determinar clases de mineralogía ferrihídrica y amórfica. El procedimiento abarca la extracción de hierro, aluminio, y sílice de la materia orgánica y de materiales minerales amorfos. Es usado en conjunción con las extracciones de ditionito-citrato y de pirofosfato para identificar las fuentes de hierro y aluminio en el suelo. El pirofosfato extrae el hierro y aluminio de la materia orgánica. El ditionito-citrato extrae hierro de los óxidos e hidróxidos de hierro, así como de la materia orgánica.

*La saturación de bases* está reportada en las hojas de datos como porcentaje de la CIC. La CIC es reportada como suma de cationes a pH de 8.2 y por acetato de amonio a pH 7. La saturación de bases por acetato de amonio es igual a la

suma de bases extraídas con acetato de amonio, dividida por la CIC (con acetato de amonio), y multiplicadas por 100. Si el calcio extraíble no está reportado en la hoja de datos por la presencia de carbonatos libres o sales de la muestra, entonces se asume que la saturación de bases es de 100 por ciento.

El porcentaje de saturación de bases por suma de cationes es igual a la suma de bases extraíbles por acetato de amonio, dividida por la CIC (por suma de cationes), y multiplicadas por 100. Este valor no se reporta si el calcio extraíble o la acidez extraíble están omitidas.

Las diferencias entre los dos métodos para la determinación de la saturación de bases reflejan la dependencia de la CIC con el pH. Las clases con estas definiciones en esta taxonomía especifican cual método es usado.

La suma de cationes intercambiables se considera igual a la suma de bases extraíbles con acetato de amonio, a menos que estén presentes carbonatos, yeso u otras sales. Cuando esas sales están presentes, la suma de bases extractables con acetato de amonio típicamente excede a 100 por ciento de la CIC. Por lo tanto, la saturación de bases se asume como el 100 por ciento. La cantidad de calcio en los carbonatos es usualmente mucho mayor a la cantidad de magnesio en los carbonatos. El calcio extractable no se muestra en la hoja de datos si se presentan trazas (más de 0.4 por ciento) de carbonatos (reportados como carbonatos de calcio) o si el cálculo de la saturación de bases excede a 110 por ciento, para una CIC obtenida con acetato de amonio a pH 7.

*El carbonato de calcio equivalente* es la cantidad de carbonatos en el suelo medidos al tratar una muestra con HCl. El dióxido de carbono generado es medido manométricamente. La cantidad de carbonato, se calcula como carbonato de calcio equivalente independientemente de la forma del carbonato (dolomita, carbonato de sodio, carbonato de magnesio, etc.) en la muestra. El carbonato de calcio equivalente se reporta como porcentaje del total del peso seco de la muestra. Se puede reportar sobre materiales de un tamaño menor a 2 mm o de menos de 20 mm.

*El sulfato del calcio como yeso* es determinado por extracción con agua y precipitación en acetona. La cantidad de yeso se reporta como porcentaje del peso total de la fracción de tamaño menor de 2 mm y de la fracción menor de 20 mm. La forma estándar de reportar los datos, es cuando se remueve parte del agua de hidratación por el yeso, de suelos secos a secados a la estufa. Varios valores medidos, particularmente valores de retención de agua, pueden ser recalculados para compensar el peso perdido del agua de hidratación durante el secado.

*La capacidad de intercambio catiónico (CIC)* por acetato de amonio (a pH 7), por suma de bases (a pH 8.2), y por bases más aluminio están reportadas en la hoja de datos en los capítulos sobre órdenes de suelos. La CIC depende del método de análisis, así como, de la naturaleza del complejo intercambiable. La CIC por suma de cationes a pH 8.2 se calcula por la adición de la suma de bases con la acidez extractable. La CIC por acetato de amonio es medida a pH 7. La CIC por bases más aluminio, o capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE), se deriva a través de la suma de

bases con el Al extractable con KCl. El aluminio extractable con KCl 1 N es insuficiente, si el pH del extractante se eleva a 5.5. La CICE es entonces igual a las bases extractables. La CIC y la CICE se reportan en la hoja de datos como meq/100 g de suelo.

La CIC reportada puede diferir de la CIC del suelo a su pH natural. Los métodos estándar permiten la comparación de un suelo con otro, aunque el pH del extractante difiera del pH natural del suelo. La capacidad de intercambio catiónico por acetato de amonio y por suma de cationes se aplica a todos los suelos. La CIC a pH 8.2 no se reporta si el suelo contiene carbonatos libres porque también se extraen bases de los carbonatos. La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE) se reporta solamente para suelos ácidos. La CICE no se reporta en aquellos suelos que tienen sales solubles, aunque podría ser calculada restando los componentes solubles de los componentes extractables. La CICE también podría definirse como la suma de bases más aluminio más hidrogeno. Esta es la definición más común para las interpretaciones agronómicas. En esta taxonomía se usa la suma de bases más aluminio.

Generalmente, la CICE es menor que la CIC a pH 7, la cual es en cambio menor que la CIC a pH 8.2. Si el suelo está dominado por coloides de carga positiva (por ejemplo, óxidos de hierro), la tendencia se invierte. La mayoría de los suelos tienen coloides con carga negativa, que causa que la CIC aumente con el incremento del pH. Esta diferencia en la CIC es comúnmente llamada carga variable o pH-dependiente. La CIC para el pH del suelo puede ser estimada entre la gráfica de la CIC del suelo contra el pH del extractante y sobre la gráfica leer la CIC que corresponde al pH del suelo.

Las mediciones de la CIC a otros niveles de pH diferentes a los descritos anteriormente y la derivación de la CIC por el uso de otros cationes producirán resultados diferentes. Es importante conocer el procedimiento, el pH, y los cationes usados antes de evaluar los datos de CIC o comparar datos de diferentes fuentes.

*El fósforo extractable con ácido cítrico (fosfato soluble en ácido)* se usa para diferenciar al epipedón mólico (menos de 1500 mg/kg  $P_2O_5$ ) del epipedón antrópico (igual o mayor de 1500 mg/kg).

*El color del extracto de pirofosfato de sodio* se usa como criterio en la separación de diferentes tipos de materiales orgánicos. Se prepara una solución saturada agregando 1 g de pirofosfato de sodio en 4 ml de agua destilada, y se adiciona una muestra húmeda de materia orgánica a la solución. La muestra se mezcla y se deja reposar toda la noche, después el papel cromatográfico es sumergido en la solución y el color del papel es determinado a través del uso de la carta de colores Munsell.

*La conductividad eléctrica (CE)* es la conductividad del agua del extracto de la pasta a saturación. La CE se usa para determinar el contenido total de sales. Está reportada en mmhos/cm, que es igual a dS/m.

*El calcio y magnesio intercambiables más la acidez intercambiable (a pH 8.2)* son usados como criterio para el horizonte nátrico. La acidez intercambiable es medida a pH 8.2 y el calcio y el magnesio son extraídos a pH 7.0 con

acetato de amonio. Ver los párrafos sobre la acidez intercambiable y bases intercambiables.

*El porcentaje de sodio intercambiable (PSI)* se reporta como porcentaje de la CIC por acetato de amonio a pH 7. El sodio soluble en agua es convertido a meq/100 g de suelo. Este valor es restado del sodio intercambiable, dividido por la CIC (por acetato de amonio), y multiplicado por 100. Un PSI de más de 15 por ciento se usa en esta taxonomía como un criterio para el horizonte nátrico.

*La acidez extractable* es la acidez liberada por el suelo por una solución buffer de cloruro de bario-trietanolamina a pH 8.2. Incluye a toda la acidez generada por el reemplazo de los hidrógenos y aluminios de sus sitios permanentes y de intercambio pH-dependientes. Se reporta en meq/100 g de suelo. Los datos de acidez extractable están reportados en algunas hojas de datos como acidez intercambiable y en otras como  $H^+$  intercambiable.

*El aluminio extractable* es el aluminio intercambiable extraído por KCl 1N. Es un componente mayor sólo en suelos fuertemente ácidos (pH menor de 5.0). El aluminio precipitará si el pH sobrepasa los 4.5 o 5.0 durante el análisis. El extractante de KCl es usual que afecte al pH del suelo en 1 unidad o menos. El aluminio extractable es medido en el NSSL por absorción atómica. Muchos laboratorios miden al aluminio por titulación con una base de fenofteína para el punto final. La titulación mide a la acidez intercambiable así como al aluminio intercambiable. Suelos con pH abajo de 4.0 a 4.5 son los que comúnmente producen valores similares al determinarlos por absorción atómica y por titulación, porque en el complejo de intercambio varía muy poco el hidrógeno. Sin embargo, si hay un porcentaje alto de materia orgánica, algo de hidrógeno puede estar presente. Para algunos suelos es importante conocer cuáles procedimientos fueron utilizados. El aluminio extractable se reporta en meq/100 g de suelo.

*Las bases extractables (calcio, magnesio, sodio y potasio)* son extraídas con acetato de amonio amortiguado a pH 7. Son equilibradas, filtradas en un auto-extractor y medidas en absorción atómica. Están reportadas como meq/100 g de suelo. Las bases son extraídas del complejo de intercambio catiónico por desplazamiento con iones amonio. El término “bases extractables” se utiliza en lugar de “bases intercambiables” porque las sales solubles y algunas bases de carbonatos pueden estar incluidas en el extracto.

La suma de bases es la suma del calcio, magnesio, sodio y potasio descritos en párrafos previos.

*El hierro y aluminio extractables por citrato* son removidos por una extracción singular. Se miden por absorción atómica y están reportados como porcentaje del total del peso seco. El hierro es obtenido primeramente de óxidos férricos (hematita, magnetita) y de oxihidróxidos de hierro (goetita). El aluminio sustituto en estos minerales es extraído simultáneamente. El ditionito reduce al hierro férrico y el citrato estabiliza al hierro por la quelatación. El hierro y el aluminio ligados en la materia orgánica son extraídos, si el citrato es mayor quelatador que las moléculas de materia orgánica. El manganeso extraído por este procedimiento también es registrado. El hierro extraído está relacionado

comúnmente con la distribución de la arcilla dentro de un pedón.

*El Índice Melánico* es utilizado en la identificación del epipedón melánico. El índice se relaciona con la proporción de ácidos húmicos y fúlvicos en la fracción orgánica del suelo (Honna, Yamamoto, y Matusi, 1988). Alrededor de 0.50 gramos de material de suelo secado al aire de un tamaño menor de 2 mm se agitan en 25 ml de una solución de NaOH a 0.5 por ciento en un tubo de centrifuga de 50 ml por 1 hora a temperatura ambiente. Se agrega una gota de agente floculante y la mezcla es centrifugada a 4,000 rpm durante 10 minutos. El índice melánico es la relación de absorbancia de 450 nm sobre la de 520 nm.

*El nitrógeno* en la base de datos del NSSL está reportado como porcentaje del peso seco total. Una muestra de suelo es quemada a alta temperatura con oxígeno para liberar NO<sub>x</sub>, y el N<sub>2</sub> es medido por detección de la conductividad térmica.

*La densidad óptica del extracto de oxalato de amonio (DOEO)* es determinada con el espectrofotómetro usando una longitud de onda de 430 nm. Un incremento en el valor de la DOEO en un horizonte iluvial, en relación con un horizonte eluvial suprayacente, indica una acumulación de materia orgánica traslocada.

*El carbono orgánico* en la base de datos del National Soil Survey Laboratory (NSSL) ha sido determinado comúnmente por digestión húmeda (Walkley, 1935). Por causa de los intereses ambientales sobre los productos de desecho este procedimiento ya no está en gran uso. El único procedimiento que se está utilizando actualmente para determinar el carbono orgánico es un procedimiento de combustión seca que determina el porcentaje de carbono total. El contenido del carbono orgánico se determina restando la cantidad de carbono procedente de los carbonatos de los datos de carbono total. El contenido del carbono orgánico determinado por este cálculo es muy cercano al contenido determinado por el procedimiento de digestión húmeda.

*El pH* es medido en agua y en sales. El pH medido en agua se determina con agua destilada mezclada con el suelo seco en una proporción 1:1. El pH medido en cloruro de potasio se determina en una solución de KCl 1N, mezclada con suelo en una proporción de 1:1. El pH medido en cloruro de calcio se determina en una solución de CaCl<sub>2</sub> 0.1M, mezclada con suelo en una proporción de 2:1.

El pH es medido con un pH-metro en una solución suelo-agua o suelo-sal. La proporción de la dilución se muestra en el encabezado de la hoja de datos. Una proporción de 1:1 significa que se mezcla una parte de suelo seco con una parte de agua, en base a peso.

La medida de pH en una solución salina diluida es común porque tiende a enmascarar las variaciones estacionales en el pH. Las lecturas en CaCl<sub>2</sub> 0.01M, tienden a ser uniformes a pesar de la época del año. Las lecturas con KCl 1N también tienden a ser uniformes. Esta última es más popular en regiones con suelos más ácidos. Si el KCl es utilizado para extraer aluminio intercambiable, el pH que se lee (en KCl) muestra el pH en el cual el aluminio fue extraído.

El pH en fluoruro de sodio (pH en NaF) se mide en una suspensión de 1 gramo de suelo en 50 ml de NaF 1M después de agitar durante 2 minutos. Un pH en NaF de 9.4 o más es un fuerte indicador de minerales de orden de rango corto que dominan en el complejo de intercambio del suelo. Un pH en NaF de 8.4 o más es un criterio para la clase de mineralogía isotópica e indica una composición significativa de minerales de rango corto en el complejo de intercambio. El material del suelo con carbonatos libres tiene también valores altos de pH en NaF. El NaF es tóxico al ingerirse y al contacto con los ojos y moderadamente peligroso al contacto con la piel.

*La retención de fosfato (ret. P)* está referida al porcentaje de fósforo retenido por el suelo después de equilibrarlo con 1,000 mg/kg en una solución de fósforo por 24 horas. Este procedimiento es usado en la clasificación de materiales ácidos de suelo. Con esto se identifica a suelos en los que la fijación de fósforo puede ser un problema que afecte sus usos agronómicos.

*El aluminio extractable con hidróxido de potasio* se determina por espectrofotometría de absorción atómica. Este procedimiento fue usado en el pasado pero no se emplea en esta taxonomía. Los datos se pueden utilizar en campo para estimar la cantidad de aluminio extractable por oxalato de amonio.

*La relación de adsorción de sodio (RAS)* fue desarrollada como una medida de la calidad del agua de irrigación. El sodio soluble en agua es dividido por el calcio y magnesio solubles en agua. La fórmula es  $RAS = Na / [(Ca + Mg)/2]^{0.5}$ . Una RAS de 13 o más se emplea como un criterio alterno del PSI para el horizonte nátrico.

*El hierro y aluminio extractables con pirofosfato de sodio* se determinan con una extracción simple y son medidos por absorción atómica. Los resultados se reportan como porcentaje del peso seco total. Este procedimiento ha sido utilizado ampliamente en la extracción de hierro y aluminio de la materia orgánica. Remueve exitosamente mucho hierro y aluminio de las acumulaciones órgano-metálicas y extrae poco hierro y aluminio de los enlaces inorgánicos en el horizonte espódico.

*Las sales totales* son calculadas a partir de la conductividad eléctrica del extracto de saturación. Son reportadas como el porcentaje total del peso de las sales solubles en el agua del suelo.

*Los cationes y aniones solubles en agua* son determinados en el agua del extracto de la pasta a saturación. Los cationes incluyen al calcio, magnesio, sodio y potasio, y los aniones a los carbonatos, bicarbonatos, sulfatos, cloruros, nitratos, fluoruros, fosfatos, silicatos y boratos. Los cationes y los aniones pueden ser reportados como cmol (+)/l.

*El sulfato soluble en agua* es utilizado en la definición del horizonte sulfúrico. El Sulfato se determina en el extracto de saturación y es reportado como uno de los aniones.

## Análisis Minerales

La mineralogía de las fracciones de arcilla, limo y arena es necesaria para la clasificación de algunas taxa. La

difracción de rayos X (DRX) y los análisis térmicos y petrográficos son visualizados clásicamente como las técnicas de la mineralogía, aunque algunas de las clases mineralógicas (por ejemplo, la ferrítica, amórfica, gypsítica, carbonítica, e isotica) son determinadas por análisis químicos y/o físicos.

La haloisita, ilita, kaolinita, esmectita, vermiculita, y otros minerales de la fracción arcillosa (menor de 0.002 mm) pueden ser identificados por DRX. La posición relativa de picos identifican a los minerales de la arcilla y las intensidades del pico es la base para estimar semicuantitativamente el porcentaje del mineral por peso en la fracción arcillosa. El laboratorio de levantamientos de suelo (SSL) del NRCS reporta las intensidades relativas de los picos de los minerales de la arcilla con DRX en un sistema de cinco clases que corresponde generalmente al porcentaje del peso del mineral (clase 1 = de 0 a 2 por ciento, clase 2 = de 3 a 9 por ciento, clase 3 = de 10 a 29 por ciento, clase 4 = de 30 al 49 por ciento y clase 5 = más de 50 por ciento). Existen interferencias potenciales múltiples en el análisis de las muestras de arcilla (Burt, 2004). Las intensidades de los picos pueden estar atenuadas por una o más interferencias, y la clase reportada puede subestimar a la cantidad verdadera del mineral presente. Así, los porcentajes asignados se dan sólo para un uso informativo y no se deben emplear para cuantificar minerales en la fracción arcillosa. Los minerales arcillosos están reportados en función de su cantidad en orden descendente en la hoja de datos. El DRX se emplea para determinar las clases mineralógicas: esmectítica, vermiculítica, ilitica, kaolinitica o haloisítica en la *Taxonomía de Suelos*. Algunas clases de familias requieren que un mineral de la arcilla sea más de la mitad (por peso) de la fracción arcillosa, lo que corresponde a la clase 5 de DRX. Otras clases mineralógicas requieren que el mineral especificado sea mayor a cualquier otro mineral particular, para corresponder al mineral arcilloso que será listado en primer lugar en la hoja de datos del SSL.

La kaolinita y la gibbsita pueden ser determinadas por análisis térmico. Los resultados de esos análisis son reportados como porcentaje del peso de la fracción arcillosa y son más cuantitativos que los resultados reportados por el difractómetro de rayos X (DRX). El análisis térmico es una técnica en la cual una muestra seca (típicamente de la fracción arcillosa) es calentada en un ambiente controlado. Ciertos minerales experimentan una descomposición a un cierto intervalo de temperatura y el mineral puede ser cuantificado cuando es comparado con estándares de arcillas. Los resultados pueden ser utilizados para determinar las clases mineralógicas de las familias kaolinitica y gibbsítica, complementariamente o en lugar de los datos de DRX.

Los minerales resistentes, minerales intemperizables, vidrio volcánico, minerales con silicatos de magnesio, placas glauconíticas, micas y micas estables de pseudomorfo pueden ser determinados por análisis petrográfico. Los minerales de silicato de magnesio (por ejemplo, minerales de serpentina) y las placas glauconíticas se reportan en por ciento del peso de la fracción de tierra-fina (menos de 2.0 mm). Los minerales resistentes, minerales intemperizables, vidrio volcánico, se

determinan como porcentajes del conteo de granos totales en las fracciones de limo grueso hasta el de arena muy gruesa (0.02 a 2.0 mm), mientras que las micas y las micas estables de pseudomorfo son determinadas en la fracción de 0.02 a 0.25 mm (limo grueso, arena muy fina y arena fina).

Granos de minerales individuales en una fracción específica de un tamaño de partícula son colocados en un portaobjetos, se identifican y se cuentan (por lo menos en relación a 300 granos) bajo un microscopio de luz polarizada. Los datos son reportados como porcentaje de granos contados en la fracción de un tamaño específico. Este porcentaje es considerado generalmente como el equivalente al peso porcentual de minerales esféricos. Técnicas alternativas están disponibles para determinar el peso porcentual de micas y otros granos laminares de los separados del suelo. El protocolo usual del SSL es el contar los granos minerales, ya sea, en la fracción de limo grueso (0.02 - 0.05 mm), arena muy fina (0.05 - 1 mm), o arena fina (0.10 a 0.25 mm), cualquiera que tenga el mayor peso porcentual basado en el análisis del tamaño de partícula. El contenido del mineral o vidrio en la fracción analizada es tomado como un dato representativo del contenido total de la fracción de 0.02 a 2.0 mm o de la fracción de tierra-fina. Puede ser necesario hacer conteos en fracciones adicionales para obtener una estimación realista del contenido de vidrio volcánico en materiales de suelo con una distribución no uniforme en la fracción dominante del tamaño de partícula. Si más de una fracción es contada, el promedio ponderado de las fracciones contadas puede ser calculado para representar el contenido del vidrio en la fracción de 0.02 a 2.0 mm. Para suelos donde se espera tener cantidades significativas de vidrio en fracciones dominantes de arena media, gruesa o muy gruesa, se hace la recomendación de contar granos en las fracciones más grandes.

Dos tipos generales de análisis petrográficos son realizados en el laboratorio de levantamientos de suelos: (a) conteo completo de granos minerales, en la cual todos los minerales en la muestra son identificados y contados, o (b) conteo de vidrio, en el cual el vidrio, agregados vítreos, recubrimientos vítreos de minerales y materiales vítreos son identificados y cuantificados y todos los otros minerales son contados como "otros". Los "granos con recubrimientos vítreos" son granos minerales cristalinos (por ejemplo, cuarzo y feldspatos) en los cuales más de 50 por ciento del grano está cubierto de vidrio. Los "materiales vítreos" son una categoría general para granos que tienen las propiedades ópticas de vidrio pero carecen de características definitivas de vidrio, de granos con revestimientos vítreos o de agregados vítreos. El porcentaje total de minerales resistentes se reporta en las hojas de datos del SSL (La calcita o minerales más solubles están incluidos en las determinaciones del porcentaje de minerales resistentes reportados en la hoja de laboratorio pero estos no están incluidos en los valores usados por esta taxonomía). El porcentaje total de vidrio volcánico, minerales intemperizables, u otros grupos de minerales usados en la clasificación pueden ser calculados por la suma del porcentaje de los minerales individuales incluidos en los grupos. Una lista

completa de los minerales en cada categoría esta en el *Manual de Métodos de Laboratorio para los Levantamientos de Suelos* (Burt, 2004).

### Otra Información útil en la Clasificación de Suelos

En algunos criterios taxonómicos se utilizan cantidades volumétricas de carbono orgánico. Para ello, se emplea el siguiente cálculo: (Dato [en por ciento] por la densidad aparente [a 33 o 10 kPa] por el espesor [cm]) dividido por 10. Este cálculo se usa normalmente para el carbono orgánico, pero puede ser utilizado para algunas otras medidas. Cada horizonte es calculado separadamente, y el producto de los cálculos puede ser sumado a cualquier profundidad deseada, comúnmente 100 cm.

Las relaciones que se pueden desarrollar a partir de los datos son útiles para hacer verificaciones internas de los propios datos, para hacer interpretaciones relacionadas con el manejo, y para contestar preguntas taxonómicas. Algunas de las relaciones son empleadas como criterios en la determinación de los horizontes argílico, kándico u óxico.

La relación de agua a 1500 kPa con la arcilla es utilizada para indicar la relevancia de la determinación del tamaño de partícula. Si la relación es 0.6 o más y el suelo no tiene propiedades ándicas, se asume que la arcilla tiene una dispersión incompleta y la arcilla es estimada con la fórmula siguiente: % Arcilla = 2.5 (% agua retenida a una tensión de 1500 kPa - % de carbono orgánico). Para un suelo típico con arcilla bien dispersada, la relación es de 0.4. Algunos factores relacionados con el suelo que pueden causar la desviación del valor 0.4 son: (1) arcillas de baja actividad (kaolinitas, cloritas, y algunas micas), que tienden a tener una relación de 0.35 o más baja; (2) los óxidos de hierro y arcillas del tamaño de carbonatos, que tienden a disminuir la relación; (3) la materia orgánica, la cual incrementa la relación porque aumenta el contenido de agua a 1500 kPa; (4) los materiales ándicos y espódicos y los materiales con una clase de mineralogía isotica, que incrementan la relación porque no se dispersan bien; (5) grandes cantidades de yeso; y (6) minerales arcillosos dentro de granos de arena y limo. Esos minerales arcillosos retienen agua a 1500 kPa y entonces incrementan la relación. Estos son muy comunes en esquistos y pseudomorfos de minerales primarios en saprolita.

La relación de la CIC por acetato amónico en pH 7 con la arcilla puede ser utilizada para estimar la mineralogía de la arcilla y la dispersión de la arcilla. Si la relación se multiplica por 100, el producto es cmol(+)/kg de arcilla. Las siguientes relaciones son típicas para las siguientes clases de mineralogía de la arcilla: menos de 0.2, kaolinitica; 0.2-0.3, kaolinitica o


mezclada; 0.3-0.5, mezclada o íltica; 0.5-0.7, mezclada o esmectítica; y más de 0.7, esmectítica. Estas relaciones son muy válidas cuando algunos datos detallados de la mineralogía están disponibles. Si la relación de agua a 1500 kPa a la arcilla es de 0.25 o menos o de 0.6 o más, la relación de CIC por acetato amonio a la arcilla no es válida. Las relaciones de agua a 1500 kPa a la arcilla de 0.6 o más son típicas de arcillas pobremente dispersadas, materiales ándicos y espódicos, y de los materiales con una clase de la mineralogía de isotica, y las relaciones de menos de 0.3 son comunes en algunos suelos que contienen cantidades grandes de yeso.

Una relación de CIC en pH 8.2 con el agua a 1500 kPa de más de 1.5 y más acidez intercambiable que la suma de bases más Al extractable con KCl, implica un suelo con una alta carga pH-dependiente. Junto con los datos de densidad aparente, pueden ayudar a distinguir suelos que tienen materiales ándicos y espódicos o a suelos que tienen materiales con una clase de mineralogía isotica a partir de suelos con minerales que son más cristalinos.

### Literatura Citada

- American Society for Testing and Materials. 1998. Annual Book of ASTM Standards. Vol. 4.08, D 4318-95a.
- Burt, R., ed. 2004. Soil Survey Laboratory Methods Manual. Soil Survey Investigations Report 42, Version 4.0. United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service, National Soil Survey Center.
- Honna, T., S. Yamamoto, and K. Matsui. 1988. A Simple Procedure to Determine Melanic Index That Is Useful for Differentiating Melanic from Fulvic Andisols. *Pedol.* 32: 69-78.
- Kimble, J.M., E.G. Knox, and C.S. Holzhey. 1993. Soil Survey Laboratory Methods for Characterizing Physical and Chemical Properties and Mineralogy of Soils. In *Applications of Agriculture Analysis in Environmental Studies*, ASTM Spec. Pub. 1162, K.B. Hodinott and T.A. O'Shay, eds.
- United States Department of Agriculture, Natural Resources Conservation Service. 1995. Soil Survey Laboratory Information Manual. National Soil Survey Center, Soil Survey Laboratory, Soil Survey Investigations Report 45.
- Walkley, A. 1935. An Examination of Methods for Determining Organic Carbon and Nitrogen in Soils. *J. Agr. Sci.* 25: 598-609.

Porcentajes de arcilla (menos de 0.002 mm), limo (0.002 a 0.05 mm), y arena (0.05 a 2.0 mm) en las clases texturales básicas de suelos





**A**

Acraquox .....	235
Acroperox .....	236
Acrotorrox .....	240
Acrudox .....	241
Acrustox .....	245
Alaquods .....	251
Albaqualfs .....	35
Albaqualts .....	262
Albolls .....	192
Alfisols .....	35
Alorthods .....	257
Análisis físicos .....	317
Análisis minerales .....	320
Análisis químicos .....	318
Andisols .....	77
Anhyorthels .....	145
Anhyturbels .....	149
Anthracambids .....	108
Anthrepts .....	159
Años normales .....	26
Aqualfs .....	35
Aquands .....	77
Aquents .....	123
Aquepts .....	159
Aquerts .....	283
Aquicambids .....	108
Aquisalids .....	122
Aquiturbels .....	149
Aquods .....	251
Aquolls .....	193
Aquorthels .....	145
Aquox .....	235
Aquults .....	261
Arents .....	127
Argialbolls .....	192
Argiaquolls .....	193
Argicryids .....	112
Argicryolls .....	197
Argids .....	97
Argidurids .....	115
Argigypsids .....	118
Argiorthels .....	146
Argiudolls .....	202

Argiustolls .....	209
Argixerolls .....	225
Aridisols .....	97

**C**

Calciaquerts .....	284
Calciaquolls .....	193
Calciargids .....	97
Calcicryepts .....	166
Calcicryids .....	113
Calcicryolls .....	198
Calcids .....	105
Calcigypsids .....	119
Calcitorrerts .....	287
Calciudolls .....	204
Calciustepts .....	178
Calciusterts .....	290
Calciustolls .....	213
Calcixerepts .....	184
Calcixererts .....	293
Calcixerolls .....	227
Cambids .....	108
Cambio textural abrupto .....	15
Capa glácica .....	26
Capa limitante a raíces .....	296
Caras de fricción .....	20
Carbonatos secundarios identificables .....	17
Clases de actividad de intercambio catiónico para suelos minerales .....	303
Clases de mineralogía para Histosols e Histels .....	307
Clases de mineralogía para suelos minerales .....	301
Clases de profundidad del suelo para Histosols e Histels .....	308
Clases de profundidad del suelo para suelos minerales .....	305
Clases de reacción y calcáreas .....	304
Clases de reacción para Histosols e Histels .....	308
Clases de resistencia a la ruptura para suelos minerales .....	306
Clases de tamaño de partícula fuertemente contrastantes .....	300
Clases de tamaño de partícula para Histosols e Histels .....	307
Clases de tamaño de partícula para suelos minerales .....	295

Clases de temperatura del suelo para Histosols e Histels .....	308
Clases de temperatura del suelo para suelos minerales .....	305
Claves para órdenes de suelos .....	31
Coefficiente de extensibilidad lineal COEL).....	16
Color del suelo, criterio en base al contenido de agua .....	31
Contacto dénsico .....	25
Contacto lítico .....	26
Contacto paralítico .....	26
Contacto petroférico .....	19
Crioturbación .....	25
Cryalfs .....	44
Cryands .....	81
Cryaqualfs .....	37
Cryaquands .....	78
Cryaquents .....	124
Cryaquepts .....	160
Cryaquods .....	252
Cryaquolls .....	194
Cryepts .....	166
Cryerts .....	287
Cryids .....	112
Cryods .....	253
Cryofibrists .....	153
Cryofluvents .....	128
Cryofolists .....	154
Cryohemists .....	155
Cryolls .....	197
Cryopsamments .....	139
Cryorthents .....	134
Cryosapristis .....	156
Cryrendolls .....	201

## D

Diferenciación de familias para Histosols e Histels .....	306
Diferenciación de familias para suelos minerales .....	295
Diferenciación de series dentro de familias .....	308
Discontinuidades identificadas por designadores de horizontes .....	316
Discontinuidad litológica .....	18
Duraqualfs .....	37
Duraquands .....	78
Duraquerts .....	284
Duraquods .....	252
Duraquolls .....	194
Duricryands .....	81
Duricryods .....	253
Duricryolls .....	198
Durids .....	115
Durihumods .....	256
Durinoides .....	16
Duripan .....	11
Duritorrands .....	85
Durixeralfs .....	71
Durixerepts .....	185

Durixererts .....	293
Durixerolls .....	227
Durorthods .....	257
Durudands .....	86
Durudepts .....	172
Durustalfs .....	60
Durustands .....	92
Durustepts .....	179
Durustolls .....	214
Dystraquerts .....	284
Dystrocryepts .....	166
Dystrogelepts .....	171
Dystroxerepts .....	186
Dystrudepts .....	173
Dystruderts .....	289
Dystrustepts .....	179
Dystrusterts .....	290

## E

Endoaqualfs .....	37
Endoaquands .....	78
Endoaquents .....	124
Endoaquepts .....	161
Endoaquerts .....	285
Endoaquods .....	252
Endoaquolls .....	194
Endoaquults .....	262
Entisols .....	123
Epiaqualfs .....	39
Epiaquands .....	79
Epiaquents .....	125
Epiaquepts .....	162
Epiaquerts .....	286
Epiaquods .....	253
Epiaquolls .....	195
Epiaquults .....	262
Epipedón .....	5
Epipedón antrópico .....	5
Epipedon folístico .....	6
Epipedón hístico .....	6
Epipedón melánico .....	7
Epipedón mólico .....	7
Epipedón órico .....	8
Epipedón plaggen .....	8
Epipedón úmbrico.....	9
Estructura de roca .....	5
Eutraquox .....	235
Eutrogelepts .....	171
Eutroperox .....	237
Eutrotorrox .....	240
Eutrodepts .....	175
Eutrudox .....	242
Eustrustox .....	246
Extensibilidad lineal (EL) .....	18

**F**

Ferrudalfts	49
Fibristels	143
Fibrists	153
Fluvaquents	125
Fluvents	128
Folistels	144
Folists	154
Fragiaqualfts	41
Fragiaquepts	163
Fragiaquods	253
Fragiaquults	263
Fragihumods	256
Fragiorthods	257
Fragipán	11
Fragiudalfts	49
Fragiudepts	177
Fragiudults	268
Fragixeralfs	72
Fragixerepts	187
Fraglossudalfts	49
Fragmentos de roca	295
Franja inferior	23
Franja subsuperficial	23
Franja superficial	23
Fulvicryands	82
Fulvudands	86

**G**

Gelands	84
Gelaquands	79
Gelaquents	126
Gelaquepts	163
Gelepts	171
Gelifluvents	129
Gelisols	143
Gelods	255
Gelolls	200
Gelorthents	134
Glacistels	144
Glossaqualfts	41
Glossocryalfts	44
Glossudalfts	50
Grietas permanentes (clases de) en suelos minerales	306
Gypsiargids	99
Gypsieryids	113
Gypsids	118
Gypsiorrerts	288
Gypsiusterts	291

**H**

Halaquepts	164
Haplanthrepts	159

Haplaquox	236
Haplargids	100
Haplocalcids	105
Haplocambids	109
Haplocryalfts	45
Haplocryands	82
Haplocryepts	168
Haplocryerts	287
Haplocryids	114
Haplocryods	254
Haplocryolls	199
Haplodurids	116
Haplofibrists	154
Haplogelods	255
Haplogelolls	200
Haplogypsids	120
Haplohemists	155
Haplohumods	256
Haplohumults	265
Haploperox	238
Haploorthels	146
Haploorthods	258
Haplosalids	122
Haplosaprists	156
Haplotorrerts	288
Haplotorrox	241
Haploturbels	149
Haploxeralfs	72
Haploxerands	95
Haploxerepts	188
Haploxererts	294
Haploxerolls	229
Haploxerults	280
Hapludalfts	51
Hapludands	87
Hapluderts	289
Hapludolls	205
Hapludox	243
Hapludults	269
Haplustalfts	60
Haplustands	92
Haplustepts	180
Haplusterts	291
Haplustolls	215
Haplustox	247
Haplustults	276
Haprendolls	201
Hemistels	144
Hemists	155
Histels	143
Historthels	146
Histosols	153
Histoturbels	149
Horizonte agrícola	9

Horizonte álbico .....	10
Horizonte argílico .....	10
Horizonte cálcico .....	10
Horizonte cámbico .....	11
Horizonte espódico .....	14
Horizonte glósico .....	12
Horizonte gypsico .....	12
Horizonte kándico .....	12
Horizonte nátrico .....	13
Horizonte óxico .....	13
Horizonte petrocálcico .....	13
Horizonte petrogypsico .....	14
Horizonte plácico .....	14
Horizonte sálico .....	14
Horizonte sómbrico .....	14
Horizonte sulfúrico .....	29
Horizontes de diagnóstico subsuperficiales .....	9
Horizontes de diagnóstico superficiales .....	5
Horizontes o capas .....	311
Horizontes A .....	311
Horizontes B .....	312
Horizontes o capas C .....	312
Horizontes E .....	311
Horizonte o capas L .....	311
Capas M .....	312
Horizontes o capas O .....	311
Capas R .....	312
Capas W .....	312
Horizontes transicionales y combinaciones .....	312
Humaquepts .....	164
Humicryepts .....	169
Humicryerts .....	287
Humicryods .....	254
Humigelods .....	255
Humods .....	256
Humults .....	265
Hydraquepts .....	126
Hydrocryands .....	83
Hydrudands .....	89

**I**

Inceptisols .....	159
Interdigitaciones de materiales álbicos .....	17

**K**

Kandiaqualfs .....	42
Kandiaquults .....	263
Kandihumults .....	266
Kandiperox .....	239
Kandiudalfs .....	55
Kandiudox .....	244
Kandiudults .....	270
Kandiustalfs .....	63

Kandiustox .....	248
Kandiustults .....	277
Kanhaplaquults .....	263
Kanhaplohumults .....	267
Kanhapludalfs .....	56
Kanhapludults .....	272
Kanhaplustalfs .....	64
Kanhaplustults .....	278

**L**

Lamelas .....	17
Luvihemists .....	156

**M**

Material mineral de suelo .....	3
Material orgánico de suelo .....	3
Fibras .....	21
Materiales fibrícos de suelo .....	21
Materiales hémicos de suelo .....	21
Materiales humilúvicos de suelo .....	22
Materiales límnicos .....	22
Tierra coprogénica .....	22
Tierra de diatomeas .....	22
Marga .....	23
Materiales sápricos de suelo .....	21
Materiales álbicos .....	15
Materiales densesicos .....	25
Materiales espódicos .....	20
Materiales gélicos .....	25
Materiales paralíticos .....	26
Materiales sulfídicos .....	29
Melanaquands .....	79
Melanocryands .....	83
Melanoxerands .....	96
Melanudands .....	90
Minerales intemperizables .....	21
Minerales resistentes .....	20
Mollisols .....	191
Molliturbels .....	150
Mollorthels .....	147

**N**

Natralbolls .....	193
Natraqualfs .....	43
Natraquerts .....	286
Natraquolls .....	196
Natrargids .....	102
Natricryolls .....	200
Natridurids .....	117
Natrigypsids .....	120
Natrixeralfs .....	74
Natrixerolls .....	232

Natrudalfts .....	56
Natrudolls .....	207
Natrustalfts .....	65
Natrustolls .....	220

**O**

Orthels .....	144
Orthents .....	133
Orthods .....	256
Orstein .....	13
Oxisols .....	235

**P**

Paleaquults .....	264
Paleargids .....	104
Palecryalfts .....	47
Palecryolls .....	200
Palehumults .....	267
Paleudalfts .....	57
Paleudolls .....	208
Paleudults .....	273
Paleustalfts .....	67
Paleustolls .....	222
Paleustults .....	279
Palexeralfts .....	74
Palexerolls .....	232
Palexerults .....	280
Permafrost .....	26
Perox .....	236
Petraquepts .....	165
Petroargids .....	105
Petrocalcids .....	107
Petrocambids .....	111
Petrocryids .....	114
Petrogyptsids .....	121
Placaquands .....	80
Placaquods .....	253
Placocryods .....	255
Placohumods .....	256
Placorthods .....	259
Placudands .....	92
Plagganthrepts .....	159
Plinthaqualfts .....	43
Plinthaquox .....	236
Plinthaquults .....	265
Plinthohumults .....	268
Plinthoxeralfts .....	76
Plinthudults .....	275
Plinthustalfts .....	70
Plinthustults .....	279
Plintita .....	19
Propiedades ándicas de suelo .....	15
Propiedades frágicas de suelo .....	17
Psammaquents .....	126

Psamments .....	139
Psammorthels .....	147
Psammoturbels .....	150

**Q**

Quartzipsamments .....	139
------------------------	-----

**R**

Regímenes de humedad del suelo .....	26
Ácuico .....	27
Árido y tórrido .....	27
Údico .....	28
Ústico .....	28
Xérico .....	28
Regímenes de temperatura del suelo .....	28
Crylco .....	28
Frígido .....	29
Hipertérmico .....	29
Isofrígido .....	29
Isohipertérmico .....	29
Isomésico .....	29
Isotérmico .....	29
Mésico .....	29
Térmico .....	29
Relación, agua a 1500 kPa a arcilla .....	299
Relación, CIC a arcilla .....	304
Rendolls .....	201
Recubrimientos (clases de) sobre arenas .....	306
Rhodoxeralfts .....	76
Rhodudalfts .....	59
Rhodudults .....	275
Rhodustalfts .....	70
Rhodustults .....	279

**S**

Salaquerts .....	286
Salicyrids .....	115
Salids .....	122
Salitorrerts .....	288
Salusterts .....	292
Sapristels .....	144
Sapristis .....	156
Sección de control de Histosols e Histels .....	23
Sección de control de series .....	309
Símbolo de intercalación en designadores de horizontes .....	316
Símbolo prima en designadores de horizontes .....	316
Símbolos sufijos en designadores de horizontes .....	313
Convenciones para el uso de letras sufijos .....	315
Subdivisiones verticales .....	315
Sombrihumults .....	268
Sombriperox .....	240
Sombriudox .....	245

Sombriustox .....	249
Sphagnofibrists .....	154
Spodosols .....	251
Suelo .....	1
Suelos enterrados .....	2
Suelos minerales .....	4
Suelos orgánicos .....	4
Sulfaquents .....	127
Sulfaquepts .....	165
Sulfaquerts .....	287
Sulfihemists .....	156
Sulfisaprists .....	157
Sulfohemists .....	156
Sulfosaprists .....	157
Sulfudepts .....	177

**T**

Torrands .....	84
Torrerts .....	287
Torriarents .....	127
Torrifluvents .....	129
Torrifolists .....	155
Torriorthents .....	134
Torripsamments .....	140
Torrox .....	240
Turbels .....	148

**U**

Udalfs .....	47
Udands .....	85
Udarents .....	127
Udepts .....	172
Uderts .....	289
Udifluvents .....	130
Udifolists .....	155
Udipsamments .....	141
Udivitrands .....	94
Udolls .....	201
Udorthents .....	136
Udox .....	241
Udults .....	268
Ultisols .....	261
Umbracquits .....	265

Umbríturbels .....	150
Umbrorthels .....	148
Ustalfs .....	59
Ustands .....	92
Ustarents .....	127
Ustepts .....	177
Usterts .....	290
Ustifluvents .....	131
Ustifolists .....	155
Ustipsamments .....	141
Ustivitrands .....	94
Ustolls .....	209
Ustorthents .....	136
Ustox .....	245
Ustults .....	276

**V**

Valor <i>n</i> .....	19
Vermaqualfs .....	43
Vermaquepts .....	165
Vermudolls .....	208
Vermustolls .....	224
Vertisols .....	283
Vidrio volcánico .....	20
Vitrands .....	93
Vitraquands .....	80
Vitricryands .....	83
Vitrigelands .....	84
Vitritorrands .....	85
Vitrixerands .....	96

**X**

Xeralfs .....	71
Xerands .....	95
Xerarents .....	128
Xerepts .....	184
Xererts .....	293
Xerofluvents .....	132
Xerolls .....	224
Xeropsamments .....	142
Xerorthents .....	138
Xerults .....	279

## Declaración de Accesibilidad a la NRCS

---

El Servicio de Conservación de los Recursos Naturales (NRCS) tiene el compromiso de hacer accesible su información a todos sus usuarios y empleados. Si usted experimenta problemas de accesibilidad y necesita ayuda, por favor contáctenos al teléfono 1-800-457-3642 o al correo electrónico [ServiceDesk-FTC@ftc.usda.gov](mailto:ServiceDesk-FTC@ftc.usda.gov). Si también desea ayuda para publicaciones que contengan información en forma de mapas, gráfica o similar, puede contactarnos a nuestro Estado u Oficina Local. Se puede localizar la oficina y el número telefónico correcto en la página <http://offices.sc.egov.usda.gov/locator/app>.